A 56951 1

Digitized by Google

PROPERTY OF
University of
Michigan
Libraries
1817
ARTES SCIENTIA VERITAS

Digitized by Google

Ignaz Willenbücher

Digitized by Google

Digitized by Google

# Analytische

# STUDIEN

von

**Dr. Oskar Schlömilch**

ausserordentlichem Professor an der Universität zu Jena.

---

## Erste Abtheilung

enthaltend

Theorie und Tafel der Gammafunktionen nebst deren wichtigsten Anwendungen.

---

*Leipzig.*

Verlag von Wilhelm Engelmann.

1848.

Digitized by Google

Math. Econ.
Library
QA
351
.35

Digitized by Google

51-16615
Math

# Theorie

der

# Gammafunktionen.

Digitized by Google

# Theorie der Gammafunktionen.

Unter der unendlichen Menge von Integralen, welche sich nicht durch die gewöhnlichen logarithmischen, trigonometrischen und cyklometrischen Funktionen ausdrücken lassen, findet sich eine grosse Reihe von solchen, deren Reduktion in letzter Instanz auf das bestimmte Integral

$$\int_0^1 (l\tfrac{1}{x})^{\mu-1} dx$$

führt, in welchem $\mu$ eine ganz beliebige Grösse bezeichnet. Da auch dieses Integral in vielen Fällen nicht anders als durch eine unendliche Reihe dargestellt werden kann, so bildet dasselbe eine eigne transscendente Funktion der Grösse $\mu$, welche als ein neuer Grundpfeiler der Integralrechnung anzusehen ist. Soll aber die Einführung desselben von Nutzen sein, so wird es vor allen Dingen nöthig, die Eigenschaften jener Funktion in ihrem ganzen Umfange zu erforschen und die an derselben sich darbietenden Aufgaben zu lösen, mit einem Wort: es muss eine Theorie jener Transscendenten gegeben werden, zu welcher dann noch die Tafel ihrer Werthe für den praktischen Gebrauch hinzukommt. In dieser Weise hat zuerst Légendre *) die Sache aufgefasst und eine Lösung der angedeuteten Probleme versucht, aber soviel Scharfsinn er auch darauf verwendete, so ist es ihm doch nicht geglückt, seiner Arbeit das Siegel der Vollendung aufzudrücken und einen durchweg direkten Gedankengang zu entdecken. Seit jener Zeit ist nun von mehreren tüchtigen Analytikern so Vieles für die Erweiterung und bessere

*) Légendre: *Traité des fonctions elliptiques et des Intégrales Eulériennes tome II.*



Digitized by Google

Begründung der fraglichen Theorie gethan worden, dass eine neue Bearbeitung derselben ein Erforderniss des jetzigen Zustandes der Wissenschaft zu sein scheint.

---

## Cap. I.

### *Die Fundamentaleigenschaften der Gammafunktionen.*

### §. 1.

Die Definition der Gammafunktion liegt in der Gleichung

$$\int_0^1 (l\tfrac{1}{x})^{\mu-1} dx = \Gamma(\mu) \qquad (1)$$

wobei rechts das Zeichen $\Gamma$ die Stelle eines Funktionszeichens vertritt, statt deren man öfter auch eine andere, von dieser wesentlich nicht verschiedene giebt, welche man dadurch erhält, dass man in dem bestimmten Integrale $x = e^{-z}$ setzt. Durch diese Substitution wird

$$l\tfrac{1}{x} = z\,,\quad dx = -e^{-z}dz$$

und wenn $x$ die Werthe 1 und 0 angenommen hat, ist $z = 0$ und $z = \infty$ geworden, mithin

$$\int_0^1 (l\tfrac{1}{x})^{\mu-1} dx = -\int_\infty^0 z^{\mu-1}e^{-z}dz = +\int_0^\infty z^{\mu-1}e^{-z}dz$$

oder, wenn man in dem bestimmten Integrale rechts $x$ für $z$ und für die linke Seite ihren Werth aus (1) setzt

$$\Gamma(\mu) = \int_0^\infty x^{\mu-1}e^{-x}dx\,. \qquad (2)$$

Diese zweite Form der Definition unserer Transscendenten ist für manche Zwecke bequemer als die zuerst aufgestellte, namentlich kann man aus ihr mit der grössten Leichtigkeit eine Relation ableiten, welche zwischen $\Gamma(\mu)$ und $\Gamma(\mu+1)$ statt findet.

Man hat nämlich, $\mu+1$ für $\mu$ gesetzt,

$$\Gamma(\mu+1) = \int_0^\infty x^{\mu}e^{-x}dx\,. \qquad (3)$$

Digitized by Google

Andererseits ist aber nach der bekannten Reduktionsformel

$$\int uvdx = u \int vdx - \int du \int vdx$$

für $u = x^{\mu}$, $v = e^{-x}$,

$$\int x^{\mu} e^{-x} dx = x^{\mu} \int e^{-x} dx - \int \mu x^{\mu-1} dx \int e^{-x} dx$$

$$= -x^{\mu} e^{-x} + \mu \int x^{\mu-1} e^{-x} dx + Const.$$

folglich wenn wir zu den Gränzen für wachsende und abnehmende $x$ übergehen

$$\int_0^{\infty} x^{\mu} e^{-x} dx = -\underset{(x=\infty)}{Lim.}(x^{\mu} e^{-x}) + \underset{(x=0)}{Lim.}(x^{\mu} e^{-x}) + \mu \int_0^{\infty} x^{\mu-1} e^{-x} dx \qquad (4)$$

wobei sich das erste Gränzzeichen auf unendlich wachsende, das zweite auf unendlich abnehmende $x$ bezieht. Zur Bestimmung der gesuchten Gränzen dienen nun folgende sehr einfache Betrachtungen.

Wenn $n$ eine beliebige positive ganze Zahl bedeutet, so ist immer, wie man leicht aus der Reihe für $e^x$ findet

$$e^x > \frac{x^n}{1.2.3....n}$$

folglich

$$\frac{e^x}{x^{\mu}} > \frac{x^{n-\mu}}{1.2.3....n}$$

und

$$\frac{x^{\mu}}{e^x} = x^{\mu} e^{-x} < \frac{1.2.3....n}{x^{n-\mu}}.$$

Da hier die Zahl $n$ beliebig gelassen ist, so können wir dieselbe immer grösser als die Zahl $\mu$ nehmen, so dass $n-\mu$ positiv bleibt.

Wächst nun $x$ beständig so nimmt der Quotient $\frac{1.2.3...n}{x^{n-\mu}}$ unaufhörlich bis zur Gränze Null ab, folglich nimmt auch $x^{\mu} e^{-x}$ ins Unendliche ab. Da aber dieser Ausdruck nicht negativ werden

Digitized by Google

kann, da $x$ nur positive Werthe bekommt, so folgt, dass für unendlich wachsende $x$

$$Lim.\ (x^{\mu-x}) = 0$$

sein müsse, und hiermit ist der Werth der ersten Limes in (3) bestimmt.

Setzen wir ferner voraus, dass $\mu$ eine positive Grösse bedeutet, so erhellt augenblicklich, dass für abnehmende $x$

$$Lim.\ (x^{\mu-x}) = 0$$

sein müsse. Durch Substitution dieser Werthe geht die Gleichung (3) in die folgende über:

$$\int_0^\infty x^{\mu-x} dx = \mu \int_0^\infty x^{\mu-1-x} dx$$

oder nach (1) und (2)

$$\Gamma(\mu+1) = \mu\,\Gamma(\mu), \qquad (5)$$

welche Relation aber nur für positive $\mu$ gilt.

Multiplicirt man beiderseits mit $\mu+1$ und wendet links die Relation (5) selbst wieder für $\mu+1$ statt $\mu$ an, so wird

$$\Gamma(\mu+2) = (\mu+1)\,\mu\,\Gamma(\mu).$$

Durch Multiplikation mit $\mu+2$ erhält man hieraus

$$\Gamma(\mu+3) = (\mu+2)(\mu+1)\,\mu\,\Gamma(\mu).$$

Setzt man dieses Verfahren der successiven Multiplikation unbestimmt weit fort, so erhält man leicht, wenn $n$ eine positive ganze Zahl bedeutet

$$\Gamma(\mu+n) = (\mu+n-1)(\mu+n-2)\ldots(\mu+1)\,\mu\,\Gamma(\mu). \qquad (6)$$

Diese Gleichung enthält eines der wichtigsten Theoreme für die Gammafunktionen. Sehen wir sie nämlich als eine Reduktionsformel an, so geht aus ihr hervor, dass man die Werthe der Funktion $\Gamma$ überhaupt nur von $\mu=0$ bis $\mu=1$ zu kennen braucht, weil sich alle die Werthe der Funktion in den Fällen, wo die Veränderliche ein unächter Bruch ist, leicht auf die Werthe solcher Funktionen reduziren lassen, in denen die Veränderliche ächt gebrochen ist. So wäre z. B. für $\mu=\frac{1}{2}$

$$\Gamma(\mu+\tfrac{1}{2}) = \frac{2n-1}{2}\cdot\frac{2n-3}{2}\cdot\ldots\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\,\Gamma(\tfrac{1}{2}). \qquad (7)$$

Digitized by Google

Eine Tafel für die Gammafunktion braucht also nur die Werthe zu umfassen, welche dem Intervalle $\mu = 0$ bis $\mu = 1$ entsprechen.

Bei der Wichtigkeit des obigen Theoremes dürfte es wohl nicht überflüssig sein, noch einen zweiten, auf ganz andern Prinzipien beruhenden Beweis desselben zu geben. Setzt man in der Gleichung (3) $x = rz$, wobei $r$ eine Constante, $z$ die neue Veränderliche bedeutet, so wird $dx = rdz$, die Gränzen für $z$ werden $\frac{\infty}{r}$ und $\frac{0}{r}$ d. h. wieder $\infty$ und 0, mithin ist:

$$\int_0^\infty (rz)^{\mu-1} e^{-rz} r\, dz = \Gamma(\mu)$$

oder nach Division mit $r^\mu$,

$$\int_0^\infty z^{\mu-1} e^{-rz}\, dz = \frac{\Gamma(\mu)}{r^\mu}. \tag{8}$$

Aus dieser Gleichung folgt durch $n$malige partielle Differenziation nach $r$, *)

---

*) Die Differenziation unter dem Integralzeichen oder wie man sie auch nennt, die Variation der arbiträren Constanten eines bestimmten Integrales bildet überhaupt eines der vorzüglichsten Mittel um aus einem bestimmten Integrale andere Integrale abzuleiten und beruht auf folgenden Schlüssen. Sei

$$\int_a^b f(r, z)\, dz = \varphi(r) \tag{A}$$

so ist auch, wenn $\delta$ ein völlig willkührliches Inkrement des $r$ bezeichnet und die Integrationsgränzen nicht von $r$ abhängen

$$\int_a^b f(r+\delta, z)\, dz = \varphi(r+\delta).$$

Dividirt man die Differenz beider Gleichungen durch $\delta$, was als constant für die Integration gilt, so wird

$$\int_a^b \frac{f(r+\delta, z) - f(r, z)}{\delta} dz = \frac{\varphi(r+\delta) - \varphi(r)}{\delta}$$

und hier kann man auf der linken Seite statt des Quotienten unter dem Integralzeichen auch $f'_r(r, z) + \varepsilon$ setzen, wobei $f'_r(r, z)$ den partiell nach $r$ genommenen Differenzialquotienten und $\varepsilon$ eine Grösse bezeichnet, welche so von $\delta$ abhängt, dass sie mit $\delta$ gleichzeitig bis zur Gränze Null abnimmt. Es wird dann

$$\int_a^b f'_r(r, z)\, dz + \int_a^b \varepsilon\, dz = \frac{\varphi(r+\delta) - \varphi(r)}{\delta}.$$

Digitized by Google

$$\int_0^\infty z^{\mu-1}\frac{d^n(e^{-rz})}{dr^n}dz = \Gamma(\mu)\frac{d^n(r^{-\mu})}{dr^n}$$

---

Findet nun der Fall statt, dass für unendlich klein werdende $\delta$ nicht nur $Lim.\ \varepsilon=0$ sondern auch $Lim.\int_a^b \varepsilon\,dz=0$ ist (was aus jener Eigenschaft des $\varepsilon$ gar nicht folgt), so erhält man durch Uebergang zur Gränze für ein gegen die Null convergirendes $\delta$

$$\int_a^b f_r'(r,z)\,dz = \varphi'(r) \text{ oder } \int_a^b\left[\frac{df(r,z)}{dr}\right]dz = \frac{d\varphi(r)}{dr} \qquad (B)$$

wobei die Klammern in der zweiten Form den Differenzialquotienten als einen partiellen bezeichnen. Die Differenziation der Gleichung (1) geschieht also auf der linken Seite unter dem Integralzeichen, wenn die vorhin ausgesprochene Bedingung erfüllt ist. — Dass übrigens zwar $Lim.\ \varepsilon=0$, dagegen aber $Lim.\int_a^b \varepsilon\,dz$ von Null verschieden oder überhaupt gar nicht angebbar sein kann, sieht man leicht an Beispielen. Das einfachste der Art bietet der Fall dar, in welchem $\varepsilon$ kein $z$ enthält und $b=\infty$ ist; es wird dann jenes Integral $=\varepsilon(\infty-a)$ folglich sein Gränzwerth $=0\cdot\infty$ und hiervon lässt sich der wahre Werth gar nicht angeben, oder er ist völlig willkührlich, weil der abnehmende Faktor $\varepsilon$ und der zunehmende $b$ von einander **unabhängig** sind. Das fragliche Produkt erhält erst dann eine bestimmte, mit Hülfe der Differenzialrechnung angebbare Bedeutung, wenn man $\varepsilon$ und $b$ als Funktionen einer dritten Grösse ansieht. Ein anderes Beispiel wäre etwa $f(r,z)=\frac{\sin rz}{z}$ mithin

$$\varphi(r)=\int_0^\infty \frac{\sin rz}{z}dz$$

woraus man nicht

$$\varphi'(r)=\int_0^\infty \cos rz\,dz$$

folgern darf. Nach dem Taylorschen Satze ist nämlich

$$F(r+x)=F(r)+\frac{x}{1}F'(r)+\frac{x^2}{1\cdot 2}F''(r+\lambda x)$$

wobei $\lambda$ zwischen 0 und 1 liegt. Diess giebt in unserem Falle

$$\varepsilon=-\frac{\delta z}{2}\sin(rz+\lambda\delta z)$$

$$\int_0^\infty \varepsilon\,dz=-\frac{\delta}{2}\int_0^\infty z\sin(rz+\lambda\delta z)\,dz$$

und da das Integral rechts unendlich gross wird, so darf man die Variation nach $r$ nicht ausführen wollen. — In der vorliegenden Schrift sind übrigens die Ausnahmefälle bemerkt, da sonst die Anwendung des bis zum zweiten Gliede genommenen Taylorschen Satzes hinreicht, um sich von der Rechtmässigkeit der Differenziation zu überzeugen.

Digitized by Google

oder

$$\int_0^\infty (-z)^n z^{\mu-1} e^{-rz} dz = \frac{(-1)^n \mu(\mu+1)\ldots(\mu+n1)}{r^{\mu+n}} \Gamma(\mu)$$

oder

$$\int_0^\infty z^{\mu+n-1} e^{-rz} dz = \frac{\mu(\mu+1)\ldots(\mu+n-1)}{r^{\mu+n}} \Gamma(\mu). \qquad (9)$$

Nach (8) ist aber $\mu+n$ für $\mu$ gesetzt

$$\int_0^\infty z^{\mu+n-1} e^{-rz} dz = \frac{\Gamma(\mu+n)}{r^{\mu+n}}.$$

Vergleichen wir Diess mit dem Vorigen, so ergiebt sich sofort

$$\Gamma(\mu+n) = \mu(\mu+1)(\mu+2)\ldots(\mu+n-1)\Gamma(\mu) \qquad (10)$$

und Diess ist das Nämliche wie die Gleichung (6).

Als spezieller Fall ist noch der Werth $\mu=1$ von Interesse. Man hat dann

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-x} dx = -e^{-\infty} + e^0 = 1$$

folglich

$$\Gamma(n+1) = 1.2.3\ldots.n$$

oder

$$\Gamma(n) = 1.2.3\ldots.(n-1) \qquad (11)$$

und nach (8)

$$\int_0^\infty z^{n-1} e^{-rz} dz = \frac{1.2.3\ldots.(n-1)}{r^n}. \qquad (12)$$

Man kann die Gleichungen (10) und (11) noch von einem anderen Gesichtspunkte aus betrachten, als es bisher geschah. Unter den verschiedenen Funktionen nämlich, welche man in den Kreis der Analysis gezogen hat, befindet sich auch die sogenannte Faktorielle oder Fakultät. Es ist diess eine Funktion zweier Veränderlichen, deren Definition durch die Gleichung

$$f(\mu, n) = \mu(\mu+1)(\mu+2)\ldots(\mu+n-1)$$

gegeben ist, wobei man $\mu$ die Grundzahl oder Wurzel, $n$ den

Digitized by Google

Grad oder Exponenten der Fakultät nennen kann. Vergleichen wir die obige Definition mit der Gleichung (10), so folgt

$$f(\mu, n) = \frac{\Gamma(\mu + n)}{\Gamma(\mu)}.$$

Man sieht hieraus, dass durch eine Theorie der Gammafunktionen zugleich auch die Theorie der Fakultäten gegeben ist, indem beide mit einander auf das Innigste zusammenhängen.

## §. 2.

Eine zweite, nicht minder wichtige Eigenschaft der Gammafunktionen ergiebt sich durch folgende Rechnung. Es ist, wenn wir in der Gleichung (8) $1+r$ für $r$ und $\mu = p+q$ setzen

$$\int_0^\infty z^{p+q-1} e^{-(1+r)z} dz = \frac{\Gamma(p+q)}{(1+r)^{p+q}}$$

mithin durch beiderseitige Multiplikation mit $r^{p-1}dr$ und Integration nach $r$ zwischen den Gränzen $r=0$ und $r=\infty$,

$$\int_0^\infty r^{p-1} dr \int_0^\infty z^{p+q-1} e^{-(1+r)z} dz = \Gamma(p+q) \int_0^\infty \frac{r^{p-1} dr}{(1+r)^{p+q}}. \quad (1)$$

Auf der linken Seite lässt sich aber die Ordnung der beiden Integrationen umkehren *); integriren wir daher zuerst nach $r$, so ergiebt sich für die linke Seite

$$\int_0^\infty z^{p+q-1} e^{-z} dz \int_0^\infty r^{p-1} e^{-rz} dr = \int_0^\infty z^{p+q-1} e^{-z} dz \cdot \frac{\Gamma(p)}{z^p}$$

$$= \Gamma(p) \int_0^\infty z^{q-1} e^{-z} dz = \Gamma(p)\,\Gamma(q).$$

---

*) Die Befugniss dazu beruht auf folgenden Schlüssen.

Setzt man in der Gleichung (B) der vorigen Note für $\varphi(r)$ seinen Werth aus (A) so ist

$$\frac{d \int_a^b f(r, z)\, dz}{dr} = \int_a^b \frac{df(r, z)}{dr} dz$$

Digitized by Google

Wir haben mithin nach (1)

$$\Gamma(p)\,\Gamma(q) = \Gamma(p+q)\int_0^\infty \frac{r^{p-1}dr}{(1+r)^{p+q}} \tag{2}$$

---

folglich durch Multiplikation mit $dr$ und Integration nach $r$ zwischen den Gränzen $r=\alpha$, $r=\beta$

$$\int_a^b dz\,[f(\beta,z)-f(\alpha,z)] = \int_\alpha^\beta dr \int_a^b \frac{df(r,z)}{dr}dz. \tag{A}$$

Setzen wir

$$\frac{df(r,z)}{dr} = \varphi(r,z) \tag{B}$$

so wird

$$f(r,z) = \int \varphi(r,z)\,dr + Const.$$

folglich

$$f(\beta,z)-f(\alpha,z) = \int_\alpha^\beta \varphi(r,z)\,dr \tag{C}$$

Substituiren wir die Gleichungen (B) und (C) in (A) so wird

$$\int_a^b dz \int_\alpha^\beta \varphi(r,z)\,dr = \int_\alpha^\beta dr \int_a^b \varphi(r,z)\,dz$$

womit bewiesen ist, dass sich in einem bestimmten Doppelintegral die Ordnung der Integrationen umkehren lässt. Man darf jedoch nicht vergessen, dass hier die Gültigkeit der Differenziation nach $r$ postulirt, also das Stattfinden der Gleichung

$$Lim. \int_a^b \varepsilon\,dz = 0 \tag{D}$$

vorausgesetzt worden ist, wobei

$$\varepsilon = \frac{f(r+\delta,z)-f(r,z)}{\delta} - f_r'(r,z)$$

war. Nach dem Taylorschen Satze kann man dafür auch

$$\frac{\delta}{2} f_r''(r+\lambda\delta,z)$$

oder wegen (B)

$$\varepsilon = \frac{\delta}{2}\varphi_r'(r+\lambda\delta,z)$$

schreiben. Die Bedingung (D) geht dann in die folgende über

$$Lim.\ \delta \int_a^b \varphi_r'(r+\lambda\delta,z)\,dz = 0$$

über, deren Stattfinden oder Nichtstattfinden meistens leicht zu entscheiden ist.



Digitized by Google

oder

$$\int_0^\infty \frac{r^{p-1}dr}{(1+r)^{p+q}} = \frac{\Gamma(p)\,\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} \tag{3}$$

eine sehr bemerkenswerthe Relation.

Das Integral auf der linken Seite lässt sich noch in eine andere Form bringen, wenn man es unter folgender Gestalt darstellt

$$\int_0^\infty \left(\frac{r}{1+r}\right)^{p-1} \frac{1}{(1+r)^{q-1}} \cdot \frac{dr}{(1+r)^2}$$

und nun $\frac{r}{1+r} = x$ setzt. Es folgt daraus $\frac{1}{1+r} = 1-x$ und $dx = \frac{dr}{(1+r)^2}$; wenn ferner $r=\infty$ und $r=0$ geworden ist, hat $x$ die Werthe 1 und 0 angenommen, folglich geht das Integral über in

$$\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx$$

und es ist nach (3) auch

$$\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx = \frac{\Gamma(p)\,\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}. \tag{4}$$

Légendre nennt Integrale von der Form des vorstehenden Euler'sche Integrale erster Art, die Gammafunktionen dagegen Euler'sche Integrale zweiter Art; die obige Gleichung giebt also eine Reduktionsformel, durch welche die Integrale erster Art auf die der zweiten zurückgeführt werden, so dass es nur darauf ankommt, eine Theorie der letzteren zu entwickeln, wenn man die der ersten erhalten will *).

---

*) In seinen *Leçons de calcul différentiel et de calcul intégral tome II page* 82 sagt Moigno: »M. Légendre a désigné sous le nom d'intégrale Eulérienne de seconde espèce, et M. Binet a proposé de répresenter par la notation $B(a, b)$ l'intégrale définie $\int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1}dx$. Il existe une rélation remarquable entre cette intégrale et l'intégrale Eulérienne de première espèce $\Gamma(a) = \int_0^\infty x^{a-1}e^{-x}dx$. etc.« Hier verwechselt Moigno die beiden Arten mit einander; so wenig er indessen historisch Recht hat, so praktisch scheint seine

Digitized by Google

Aus der Gleichung (3) ist ersichtlich, dass man eine Relation zwischen drei Gammafunktionen erhalten könnte, wenn man für irgend welche Werthe von $p$ und $q$ im Stande wäre, den Werth des links stehenden Integrales unabhängig von der Theorie der Gammafunktionen selbst zu entwickeln. In der That ist diess in einem Falle möglich, wenn nämlich $p$ und $q$ sich zur Einheit ergänzen, wenn also etwa $p=\mu$, $q=1-\mu$ mithin $\Gamma(p+q)=\Gamma(1)=1$ ist. Man hat dann

$$\Gamma(\mu)\,\Gamma(1-\mu)=\int_0^\infty \frac{x^{\mu-1}dx}{1+x} \tag{5}$$

und hier lässt sich der Werth des rechts stehenden Integrales auf folgende Weise finden.

Es ist zunächst:

$$\int_0^\infty \frac{x^{\mu-1}dx}{1+x}=\int_0^1 \frac{x^{\mu-1}dx}{1+x}+\int_1^\infty \frac{x^{\mu-1}dx}{1+x}.$$

Setzt man im ersten Integrale $x=z$, im zweiten $x=\frac{1}{z}$, so ändert sich das erste nicht, im zweiten dagegen ist $dx=-\frac{dz}{z^2}$ und $z=\frac{1}{x}$; wenn daher $x$ die Werthe $x=\infty$ und $x=1$ angenommen hat, ist entsprechend $z=0$ und $z=1$ geworden. Es wird daher

$$\int_0^\infty \frac{x^{\mu-1}dx}{1+x}=\int_0^1 \frac{z^{\mu-1}dz}{1+z}-\int_1^0 \frac{dz}{z^{\mu-1}\left(1+\frac{1}{z}\right)z^2}$$

$$=\int_0^1 \frac{z^{\mu-1}dz}{1+z}+\int_0^1 \frac{z^{-\mu}dz}{1+z}.$$

Nun besteht aber bekanntlich die identische Gleichung:

$$\frac{1}{1+z}=1-z+z^2-z^3+\ldots\ldots+(-1)^{n-1}z^{n-1}+\frac{(-1)^n z^n}{1+z}.$$

---

Terminologie zu sein; man steigt dabei vom Einfacheren zum Zusammengesetzteren auf und da es viele Fälle giebt, in welchen sich $B(a, b)$ durch elliptische Funktionen ausdrücken lässt, so gewinnt man auch von dieser Seite her, einen zwar untergeordneten, aber doch natürlichen Eingang in das Gebiet jener Transcendenten.

Digitized by Google

Substituiren wir dieselbe in jedem unserer Integrale, so erhalten wir leicht:

$$\int_0^\infty \frac{x^{\mu-1}dx}{1+x}$$

$$= \int_0^1 \left[1 - z + z^2 - z^3 + \ldots\ldots + (-1)^{n-1} z^{n-1}\right] z^{\mu-1} dz + (-1)^n \int_0^1 \frac{z^{n+\mu-1}}{1+z} dz$$

$$+ \int_0^1 \left[1 - z + z^2 - z^3 + \ldots\ldots + (-1)^{n-1} z^{n-1}\right] z^{-\mu} dz + (-1)^n \int_0^1 \frac{z^{n-\mu}}{1+z} dz$$

Ist nun $\mu$ ein positiver ächter Bruch, so findet sich hieraus

$$\int_0^\infty \frac{x^{\mu-1}dx}{1+x}$$

$$= \frac{1}{\mu} - \frac{1}{1+\mu} + \frac{1}{2+\mu} - \ldots\ldots + \frac{(-1)^{n-1}}{n-1+\mu}$$

$$+ \frac{1}{1-\mu} - \frac{1}{2-\mu} + \ldots\ldots + \frac{(-1)^{n-2}}{n-1-\mu}$$

$$+ \frac{(-1)^{n-1}}{n-\mu} + (-1)^n \int_0^1 \frac{z^{n+\mu-1}}{1+z} dz + (-1)^n \int_0^1 \frac{z^{n-\mu}}{1+z} dz$$

oder wenn man je zwei unter einander stehende Glieder vereinigt

$$\left.\begin{aligned} &\int_0^\infty \frac{x^{\mu-1}dx}{1+x} \\ &= \frac{1}{\mu} + \frac{2\mu}{1^2-\mu^2} - \frac{2\mu}{2^2-\mu^2} + \frac{2\mu}{3^2-\mu^2} - \ldots + \frac{(-1)^{n-2} 2\mu}{(n-1)^2-\mu^2} \\ &+ \frac{(-1)^{n-1}}{n-\mu} + (-1)^n \int_0^1 \frac{z^{n+\mu-1}}{1+z} dz + (-1)^n \int_0^1 \frac{z^{n-\mu}}{1+z} dz. \end{aligned}\right\} (6)$$

Da man hier die positive ganze Zahl $n$ so gross nehmen darf, als man will, so kann man sie immer so nehmen, dass sie $> \mu$ also $n-\mu$,

Digitized by Google

folglich ebenso $n+\mu-1$ positiv ist, wozu nur gehört, dass man $n$ wenigstens $=1$ nehme. Dann stehen die beiden letzten Integrale unter der gemeinschaftlichen Form:

$$\int_0^1 \frac{z^m dz}{1+z}$$

worin $m$ eine positive Grösse bezeichnet. Es ist nicht schwer, den Werth dieses Integrales in zwei Gränzen einzuschliessen, welche nicht mehr unter der Form von Integralen erscheinen. Wenn nämlich $z$ das Intervall 0 bis 1 durchläuft, wie es durch die obige bestimmte Integration geboten wird, so nimmt der Bruch $\frac{1}{1+z}$ von $\frac{1}{1+0}$ an bis zu $\frac{1}{1+1}$ beständig ab und hat den Werth 1 zum Maximum dagegen den Werth $\frac{1}{2}$ zum Minimum. Es ist daher für das ganze Intervall der Integration

$$1-\frac{1}{1+z} \text{ positiv}, \quad \frac{1}{2}-\frac{1}{1+z} \text{ negativ}.$$

Mithin ist auch

$$\int_0^1 \left(1-\frac{1}{1+z}\right) z^m dz \text{ positiv}, \quad \int_0^1 \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{1+z}\right) z^m dz \text{ negativ}$$

woraus man findet

$$\int_0^1 z^m dz > \int_0^1 \frac{z^m dz}{1+z}, \quad \int_0^1 \frac{1}{2} z^m dz < \int_0^1 \frac{z^m dz}{1+z}$$

oder

$$\frac{1}{m+1} > \int_0^1 \frac{z^m dz}{1+z} > \frac{1}{2(m+1)}.$$

Hieraus ist u. A. ersichtlich, dass das Integral in der Mitte für unbegränzt wachsende $m$ sich der Null nähert, weil diess mit den beiden Grössen selbst der Fall ist, zwischen denen sein Werth liegt.

Dieses Resultat können wir für die Gleichung (6) benutzen, wenn wir in derselben die Zahl $n$, welche zugleich die Gliederanzahl der dort vorkommenden Reihe ist, ins Unendliche wachsen lassen wollen. Setzen wir nämlich erst $n+\mu-1$ und dann $n-\mu=m$, so ist in jedem Falle $m$ eine Grösse, welche gleichzeitig mit $n$ ins Unendliche wächst,

Digitized by Google

und nach dem vorigen Satze nähern sich nun beide auf der rechten Seite in (6) vorkommende Integrale bei nendlich wachsenden $n$ der Gränze Null. Ausserdem ist noch

$$Lim.\ \frac{1}{n-\mu}=0$$

und die endliche $n$gliedrige Reihe wird jetzt zur unendlichen.

Wir erhalten mithin aus (6)

$$\int_0^\infty \frac{x^{\mu-1}dx}{1+x}$$
$$=\frac{1}{\mu}+\frac{2\mu}{1^2-\mu^2}-\frac{2\mu}{2^2-\mu^2}+\frac{2\mu}{3^2-\mu^2}-\ldots\ldots\ in\ inf.$$

Nach einem bekannten Satze ist aber die Summe der vorstehenden Reihe $=\pi\ Cosec\,\mu\,\pi$, mithin haben wir

$$\int_0^\infty \frac{x^{\mu-1}dx}{1+x}=\frac{\pi}{\sin\mu\,\pi},\ 1>\mu>0, \tag{7}$$

und folglich nach (5)

$$\Gamma(\mu)\,\Gamma(1-\mu)=\frac{\pi}{\sin\mu\,\pi},\ 1>\mu>0. \tag{8}$$

Der Satz, welcher hierin ausgesprochen liegt, dass nämlich das Produkt zweier Gammafunktionen, deren Veränderliche sich zur Einheit ergänzen, durch eine trigonometrische Funktion ausgedrückt werden kann, ist einer der wichtigsten in unserer Theorie und reich an Folgerungen, von denen die folgenden unter die bemerkenswerthesten gehören.

Für $\mu=\frac{1}{2}$ ergiebt sich aus (8)

$$[\Gamma(\tfrac{1}{2})]^2=\pi\ \text{mithin}\ \Gamma(\tfrac{1}{2})=\sqrt{\pi} \tag{9}$$

und nach (7)

$$\Gamma(n+\tfrac{1}{2})=\frac{1.3.5\ldots\ldots(2n-1)}{2^n}\sqrt{\pi}. \tag{10}$$

Hiervon lassen sich sogleich Anwendungen machen. Setzt man z. B. in der Gleichung (4) $p=n+\frac{1}{2}$, $q=\frac{1}{2}$, so wird

Digitized by Google

$$\int_0^1 \frac{x^{n+\frac{1}{2}-1}}{\sqrt{1-x}}\,dx = \frac{\Gamma(n+\frac{1}{2})\,\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(n+1)} = \frac{1.3.5.....(2n-1)\sqrt{\pi}}{2^n.1.2.3.....n}\sqrt{\pi}$$

oder wenn man links $x = z^2$ setzt und mit 2 beiderseits dividirt

$$\int_0^1 \frac{z^{2n}dz}{\sqrt{1-z^2}} = \frac{1.3.5.....(2n-1)}{2.4.6....(2n)} \cdot \frac{\pi}{2}. \qquad (11)$$

Setzt man dagegen in (4) $p = n+1$, $q = \frac{1}{2}$, so wird

$$\int_0^1 \frac{x^n dx}{\sqrt{1-x}} = \frac{\Gamma(n+1)\,\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(n+1+\frac{1}{2})} = \frac{2^{n+1}.1.2.3...n.\sqrt{\pi}}{1.3.5.....(2n+1)\sqrt{\pi}}$$

und wenn man wieder $x = z^2$ setzt und mit 2 dividirt

$$\int_0^1 \frac{z^{2n+1}dz}{\sqrt{1-z^2}} = \frac{2.4.6.....(2n)}{3.5.7....(2n+1)}. \qquad (12)$$

Die zwei auf diese Weise erhaltenen Formeln (11) und (12) lassen sich übrigens auch auf anderem Wege, namentlich durch Reduktionsformeln entwickeln.

## §. 3.

Aus der Gleichung (6) kann man noch durch folgenden Kunstgriff eine interessante Eigenschaft der Gammafunktionen ableiten. Man setze der Reihe nach für $\mu$ die Brüche $\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \frac{3}{n}, \ldots \frac{n-1}{n}$, in denen $n$ eine positive ganze Zahl bedeutet, so ist:

$$\Gamma(\tfrac{1}{n})\,\Gamma(\tfrac{n-1}{n}) = \frac{\pi}{\sin\frac{1}{n}\pi}$$

$$\Gamma(\tfrac{2}{n})\,\Gamma(\tfrac{n-2}{n}) = \frac{\pi}{\sin\frac{2}{n}\pi}$$

Digitized by Google

$$\Gamma\left(\frac{3}{n}\right)\Gamma\left(\frac{n-3}{n}\right)=\frac{\pi}{\sin\frac{3}{n}\pi}$$

. . . . . .

$$\Gamma\left(\frac{n-2}{n}\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)=\frac{\pi}{\sin\frac{n-2}{n}\pi}$$

$$\Gamma\left(\frac{n-1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{\pi}{\sin\frac{n-1}{n}\pi}.$$

Multiplizirt man alle diese Gleichungen mit einander, so ergiebt sich leicht durch die Bemerkung, dass die zweite Vertikalreihe links dieselbe ist wie die erste, nur in umgekehrter Ordnung geschrieben,

$$\left.\begin{aligned}&\left[\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)\Gamma\left(\frac{3}{n}\right)\ldots\ldots\Gamma\left(\frac{n-2}{n}\right)\Gamma\left(\frac{n-1}{n}\right)\right]^2\\&=\frac{\pi^{n-1}}{\sin\frac{1}{n}\pi\,\sin\frac{2}{n}\pi\,\sin\frac{3}{n}\pi\,\ldots\ldots\,\sin\frac{n-2}{n}\pi\,\sin\frac{n-1}{n}\pi}\end{aligned}\right\}(1)$$

Es ist aber nicht schwer den Werth des im Nenner stehenden Produkts unabhängig von der Theorie der Gammafunktionen aufzufinden. Hierzu dient folgende Betrachtung.

Zuvörderst ist überhaupt

$$\sin\frac{m}{n}\pi=2\sin\frac{m}{2n}\pi\,\cos\frac{m}{2n}\pi=2\sin\frac{m}{2n}\pi\,\sin\frac{n-m}{2n}\pi.$$

Wenden wir diesen Satz für $m=1, 2, 3, \ldots n-1$ an und multipliziren alle so entstehenden Gleichungen, so wird

$$\begin{aligned}&\sin\frac{1}{n}\pi\,\sin\frac{2}{n}\pi\,\sin\frac{3}{n}\pi\,\ldots\ldots\,\sin\frac{n-2}{n}\pi\,\sin\frac{n-1}{n}\pi\\&=2^{n-1}\sin\frac{1}{2n}\pi\,\sin\frac{2}{2n}\pi\,\sin\frac{3}{2n}\pi\,\ldots\,\sin\frac{n-2}{2n}\pi\,\sin\frac{n-1}{2n}\pi\\&\times\sin\frac{n-1}{2n}\pi\,\sin\frac{n-2}{2n}\pi\,\sin\frac{n-3}{2n}\pi\,\ldots\,\sin\frac{2}{n}\pi\,\sin\frac{1}{n}\pi\end{aligned}$$

Digitized by Google

d. i.

$$\left.\begin{aligned} &\sin\frac{1}{n}\pi\ \sin\frac{2}{n}\pi\ \sin\frac{3}{n}\pi\ \ldots\ \sin\frac{n-2}{n}\pi\ \sin\frac{n-1}{n}\pi \\ &= 2^{n-1}\left(\sin\frac{1}{2n}\pi\ \sin\frac{2}{2n}\pi\ \sin\frac{3}{2n}\pi\ \ldots\ \sin\frac{n-2}{2n}\pi\ \sin\frac{n-1}{2n}\pi\right)^2 \end{aligned}\right\} (2)$$

Es kommt also blos darauf an, den Werth des zweiten Produktes aufzufinden.

Nun hat man aber für jedes positive ganze und gerade $m$

$$\begin{aligned} &\sin m x \\ &= \cos x\left\{\frac{m}{1}\sin x - \frac{m(m^2-2^2)}{1.2.3}\sin^3 x + \frac{m(m^2-2^2)(m^2-4^2)}{1.2.3.4.5}\sin^5 x - \ldots\right. \\ &\left. \ldots + (-1)^{\frac{m}{2}+1}\frac{m(m^2-2^2)(m^2-4^2)\ldots(m^2-\overline{m-2}^2)}{1.2.3\ldots(m-1)}\sin^{m-1}x\right\} \end{aligned}$$

oder durch Multiplikation mit $\frac{(-1)^{\frac{m}{2}+1}}{\sin x\cos x}$ und umgekehrte Anordnung der Reihe

$$\begin{aligned} &\frac{(-1)^{\frac{m}{2}+1}\sin m x}{\sin x\cos x} \\ &= \frac{m(m^2-2^2)(m^2-4^2)\ldots(m^2-\overline{m-2}^2)}{1.2.3\ldots(m-1)}\sin^{m-2}x - \ldots \\ &\ldots + (-1)^{\frac{m}{2}+2}\frac{m(m^2-2^2)}{1.2.3}\sin^2 x + (-1)^{\frac{m}{2}+1}m. \end{aligned}$$

Es ist ferner durch Zerlegung

$$\begin{aligned} &\frac{m(m^2-2^2)(m^2-4^2)\ldots(m^2-\overline{m-2}^2)}{1.2.3\ldots(m-1)} \\ &= \frac{m(m-2)(m+2)(m-4)(m+4)\ldots(m-\overline{m-2})(m+\overline{m-2})}{1.2.3\ldots(m-1)} \\ &= \frac{(m-2)(m-4)(m-6)\ldots 4.2.m(m+2)(m+4)(m+6)\ldots(2m-2)}{1.2.3.\ldots(m-1)} \\ &= \frac{2.4.6\ldots(m-2)m(m+2)\ldots(2m-2)}{1.2.3\ldots(m-1)} = 2^{m-1} \end{aligned}$$



Digitized by Google

und diess ist der Coeffizient von $sin^{m-2}x$ in der obigen Gleichung. Durch Division mit demselben geht sie in die folgende über

$$sin^{m-2}x - A_{m-4}sin^{m-4}x + A_{m-6}sin^{m-6}x - \ldots$$

$$\ldots + (-1)^{\frac{m}{2}+2}A_2 sin^2 x + \frac{(-1)^{\frac{m}{2}+1}m}{2^{m-1}}$$

$$= \frac{(-1)^{\frac{m}{2}+1}sin\, m\, x}{2^{m-1}sin\, x\, cos\, x},$$

worin $A_{m-4}$, $A_{m-6}$, .... $A_2$ zur Abkürzung für die Coeffizienten gebraucht worden sind. Die vorstehende Gleichung lässt sich aber auch als eine algebraische ansehen, in welcher $m-2$ der Grad und $sin\, x$ die Unbekannte ist, wenn man nämlich die rechte Seite gleich Null setzt. Diess geschieht z. B. durch die Werthe

$$x = \frac{2\pi}{2m}, \frac{4\pi}{2m}, \frac{6\pi}{2m}, \ldots\ldots \frac{\overline{m-2}\,\pi}{2m}$$

$$-\frac{2\pi}{2m}, -\frac{4\pi}{2m}, -\frac{6\pi}{2m}, \ldots. -\frac{\overline{m-2}\,\pi}{2m}$$

deren Anzahl $m-2$ beträgt. Für alle diese ist

$$sin^{m-2}x - A_{m-4}sin^{m-4}x + \ldots. + \frac{(-1)^{\frac{m}{2}+1}m}{2^{m-1}} = 0 \qquad (3)$$

und folglich sind mit anderen Worten die $m-2$ Grössen

$$sin\frac{2\pi}{2m}, sin\frac{4\pi}{2m}, \ldots\ldots sin\frac{\overline{m-2}\,\pi}{2m},$$

$$-sin\frac{2\pi}{2m}, -sin\frac{4\pi}{2m}, \ldots\ldots -sin\frac{\overline{m-2}\,\pi}{2m}$$

die $m-2$ Wurzeln der algebraischen Gleichung (3). Nach einem bekannten Satze von den Gleichungen ist nun das letzte Glied in (3)

Digitized by Google

das Produkt aller Wurzeln, mithin weil rechts $\frac{m-2}{2}$ Faktoren negativ sind

$$\frac{(-1)^{\frac{m}{2}+1} m}{2^{m-1}}$$

$$= (-1)^{\frac{m-2}{2}} \left[\sin\frac{2\pi}{2m} \sin\frac{4\pi}{2m} \sin\frac{6\pi}{2m} \ldots\ldots \sin\frac{\overline{m-2}\,\pi}{2m}\right]^2.$$

Setzt man die gerade Zahl $m=2n$ und bemerkt, dass $(-1)^{n+1} = (-1)^{n-1}$ ist, so ergiebt sich

$$\left[\sin\frac{1}{2n}\pi \sin\frac{2}{2n}\pi \sin\frac{3}{2n}\pi \ldots\ldots \sin\frac{n-2}{2n}\pi\right]^2 = \frac{n}{2^{2n-2}}$$

womit das fragliche Produkt in (2) gefunden ist. Man hat jetzt nach (2)

$$\sin\frac{1}{n}\pi \sin\frac{2}{n}\pi \sin\frac{3}{n}\pi \ldots\ldots \sin\frac{n-1}{n}\pi = \frac{n}{2^{n-1}}$$

und durch Substitution dieses Werthes in (1)

$$\Gamma\left(\frac{1}{n}\right) \Gamma\left(\frac{2}{n}\right) \Gamma\left(\frac{3}{n}\right) \ldots\ldots \Gamma\left(\frac{n-1}{n}\right) = \sqrt{\frac{(2\pi)^{n-1}}{n}} \qquad (4)$$

ein zuerst von Euler entdecktes Resultat.

---

## Cap. III.

### *Die Addition und Multiplikation der Gammafunktionen.*

### §. 4.

Wenn eine Funktion ihrer Natur nach gegeben ist, so lässt sich immer folgende allgemeine Aufgabe stellen: es sei in $f(x)$ einmal $x=a$ und dann $x=b$, wie muss man nun die Grösse $c$ wählen, damit

Digitized by Google

$f(c) = f(a) + f(b)$ werde? Diese Aufgabe, welche man die der Addition gegebener Funktionen nennt, kann bei manchen Funktionen auf grosse Schwierigkeiten führen, in so fern zur Bestimmung der Unbekannten $c$ vielleicht höhere algebraische oder transscendente Gleichungen etc. aufgelöst werden müssen. Dagegen glückt es häufig, die gestellte Forderung zu erfüllen, wenn unter den gegebenen Grössen $a$, $b$, oder wie viel ihrer sonst sein mögen, eine bekannte Relation oder eine Rekursionsskale statt findet, und wenn ausserdem noch die Grössen $f(a)$, $f(b)$ etc. vor ihrer Addition mit gewissen constanten Coeffizienten multiplizirt werden. Das Binomialtheorem giebt hiervon einen einfachen Fall. Bezeichnen wir nämlich $x^{\mu}$ mit $f(x, \mu)$, so ist im Allgemeinen die Summe der Reihe

$$A f(x, a) + B f(x, b) + C f(x, c) + \ldots + N f(x, n)$$

nicht wieder durch die Funktion $f$ darstellbar, so dass dieselbe etwa $= f(\xi, \alpha)$ wäre, worin $\xi$ und $\alpha$ aus $x$ und $a$, $b$, ... $n$ zu bestimmen wären; in dem Falle aber, wo $a = 0$, $b = 1$, $c = 2$, ... $n = n$, $A = 1$, $B = \frac{n}{1}$, $C = \frac{n(n-1)}{1.2}$ etc. ist, hat man nach dem Binomialtheorem

$$f(1 + x, n) = f(x, 0) + \frac{n}{1} f(x, 1) + \frac{n(n-1)}{1.2} f(x, 2) + \ldots + f(x, n).$$

Es wäre nun zu versuchen, ob man nicht vielleicht in dieser Weise das Problem der Addition der Gammafunktionen lösen und für dieselben einen Satz aufstellen könnte, der hier den Platz ausfüllte, welchen in der Potenzentheorie das Binomialtheorem einnimmt. Es soll Diess durch die folgenden Untersuchungen geschehen.

Nach einem bekannten Satze ist für jeden beliebigen Bogen $u$ und ein ungerades $n$

$$\cos nu = \cos u \left(1 - \frac{n^2 - 1^2}{1.2} \sin^2 u + \frac{(n^2 - 1^2)(n^2 - 3^2)}{1.2.3.4} \sin^4 u - \ldots\ldots\right)$$

wobei die Reihe so weit fortgesetzt wird, bis sie von selbst abbricht. Nimmt man $u = \sqrt{-1}\, lx$, so wird

Digitized by Google

$$\cos n u = \frac{1}{2}\left[e^{nlx} + e^{-nlx}\right] = \frac{1}{2}\left[x^n + \frac{1}{x^n}\right]$$

$$\cos u = \frac{1}{2}\left[e^{lx} + e^{-lx}\right] = \frac{1}{2}\left[x + \frac{1}{x}\right]$$

$$\sin u = \frac{\sqrt{-1}}{2}\left[e^{lx} - e^{-lx}\right] = \frac{\sqrt{-1}}{2}\left[x - \frac{1}{x}\right].$$

Führt man diese Werthe ein und zerlegt zugleich die Differenzen $n^2 - 1^2$, $n^2 - 3^2$, etc. in Produkte, so ergiebt sich:

$$x^n + \frac{1}{x^n}$$

$$= \left(x + \frac{1}{x}\right)\left[1 + \frac{(n+1)(n-1)}{2.4}\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + \frac{(n+3)(n+1)(n-1)(n-3)}{2.4.6.8}\left(x - \frac{1}{x}\right)^4 + \ldots\right].$$

Setzt man die ungerade Zahl $n = 2m + 1$ und dividirt beiderseits mit $x$, so wird noch

$$x^{2m} + \frac{1}{x^{2m+2}}$$

$$= \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)\left[1 + \frac{(m+1)m}{1.2}\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + \frac{(m+2)(m+1)m(m+1)}{1.2.3.4}\left(x - \frac{1}{x}\right)^4 + \ldots\right]$$

wo nun $m$ jede beliebige positive Zahl bedeuten kann. Zugleich wollen wir zur Abkürzung:

$$M_0 = 1,\ M_2 = \frac{(m+1)m}{1.2},\ M_4 = \frac{(m+2)(m+1)m(m-1)}{1.2.3.4} \text{ etc.} \qquad (1)$$

setzen, so dass

$$\left.\begin{aligned} &x^{2m} + \frac{1}{x^{2m+2}} \\ &= \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)\left[M_0 + M_2\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + M_4\left(x - \frac{1}{x}\right)^4 + \ldots\ldots\right] \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

ist. Diese Gleichung giebt, wenn man sie mit

Digitized by Google

$$\frac{dx}{\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^{\mu+\frac{1}{2}}}$$

multiplizirt und zwischen den Gränzen $x=0$ und $x=1$ integrirt:

$$\int_0^1 \frac{x^{2m}dx}{\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^{\mu+\frac{1}{2}}} + \int_0^1 \frac{dx}{x^{2m+2}\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^{\mu+\frac{1}{2}}}$$

$$= M_0 \int_0^1 \frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx}{\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^{\mu+\frac{1}{2}}} + M_2 \int_0^1 \frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx}{\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^{\mu+\frac{1}{2}}}\left(x-\frac{1}{x}\right)^2 \quad (3)$$

$$+ M_4 \int_0^1 \frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx}{\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^{\mu+\frac{1}{2}}}\left(x-\frac{1}{x}\right)^4 + M_6 \int_0^1 \frac{\left(1-\frac{1}{x^2}\right)dx}{\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^{\mu+\frac{1}{2}}}\left(x-\frac{1}{x}\right)^6 + \ldots.$$

Hier lassen sich nun die Werthe sämmtlicher Integrale nach einigen kleinen Reduktionen mit Hülfe der Gammafunktionen ausdrücken.

I. Setzt man in dem ersten Integrale links $x=y$, im zweiten $x=\frac{1}{y}$, so ändert sich das erste der Form nach nicht, für das zweite wird $dx=-\frac{dy}{y^2}$ folglich $\frac{dx}{x^{2m+2}}=-y^{2m}dy$; wenn ferner $x$ die Werthe 0 und 1 angenommen hat, ist $y=\frac{1}{x}$ in $\infty$ und 1 übergegangen. Die linke Seite von (3) ist also

$$= \int_0^1 \frac{y^{2m}\,dy}{\left(y^2+\frac{1}{y^2}\right)^{\mu+\frac{1}{2}}} - \int_\infty^1 \frac{y^{2m}\,dy}{\left(\frac{1}{y^2}+y^2\right)^{\mu+\frac{1}{2}}}$$

$$= \int_0^1 \frac{y^{2m}\,dy}{\left(y^2+\frac{1}{y^2}\right)^{\mu+\frac{1}{2}}} + \int_1^\infty \frac{y^{2m}\,dy}{\left(y^2+\frac{1}{y^2}\right)^{\mu+\frac{1}{2}}}$$

Digitized by Google

Da hier beide Integrale die nämliche Differenzialformel enthalten und nur in den Gränzen verschieden sind, so kann man sie nach dem Satze

$$\int_a^b f(y)\,dy + \int_b^c f(y)\,dy = \int_a^c f(y)\,dy$$

in ein einziges zusammenziehen, nämlich in das folgende:

$$\int_0^\infty \frac{y^{2m}\,dy}{\left(y^2+\frac{1}{y^2}\right)^{\mu+\frac{1}{2}}} = \int_0^\infty \frac{y^{2\mu+2m+1}\,dy}{\left(y^4+1\right)^{\mu+\frac{1}{2}}}$$

$$= \frac{1}{4}\int_0^\infty \frac{y^{2\mu+2m-2}\,4y^3\,dy}{\left(1+y^4\right)^{\mu+\frac{1}{2}}}.$$

Setzen wir noch $y^4 = r$, also $4y^3\,dy = dr$ und $y = r^{\frac{1}{4}}$, so geht unser Integral über in

$$\frac{1}{4}\int_0^\infty \frac{r^{\frac{1}{2}(\mu+m-1)}\,dr}{(1+r)^{\mu+\frac{1}{2}}}$$

dessen Werth sich nach Formel (3) §. 2 ermitteln lässt, wenn man dort $p-1 = \frac{1}{2}(\mu+m-1)$, $p+q = \mu+\frac{1}{2}$ folglich $p = \frac{\mu+m+1}{2}$ und $q = \frac{\mu-m}{2}$ setzt. Man erhält so:

$$\frac{1}{4}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{\mu+m+1}{2}\right)\,\Gamma\left(\frac{\mu-m}{2}\right)}{\Gamma\left(\mu+\frac{1}{2}\right)} \qquad (4)$$

als Werth der linken Seite in (3).

II. Die Integrale auf der rechten Seite in (3) stehen sämmtlich unter der folgenden allgemeinen Form:

Digitized by Google

$$\int_0^1 \frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx}{\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^{\mu+\frac{1}{2}}}\left(x-\frac{1}{x}\right)^{2n} = \int_0^1 \frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx}{\left[2+\left(\frac{1}{x}-x\right)^2\right]^{\mu+\frac{1}{2}}}\left(\frac{1}{x}-x\right)^{2n}.$$

aus welcher man sie erhält, wenn man der Reihe nach $n=0, 1, 2, 3$ etc. setzt. Nimmt man noch $\frac{1}{x}-x=z$, so wird $-\frac{dx}{x^2}-dx=dz$ oder $\left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx=-dz$; wenn ferner $x$ die Werthe 1 und 0 angenommen hat, ist entsprechend $z=0$ und $z=\infty$ geworden. Durch diese Substitutionen nimmt unser Integral die folgende Form an:

$$-\int_\infty^0 \frac{dz}{(2+z^2)^{\mu+\frac{1}{2}}}z^{2n} = +\int_0^\infty \frac{z^{2n}dz}{(2+z^2)^{\mu+\frac{1}{2}}}$$

aus welcher für $z=\sqrt{2r}$ entspringt

$$\frac{2^n}{2^{\mu+1}}\int_0^\infty \frac{r^{n-\frac{1}{2}}dr}{(1+r)^{\mu+\frac{1}{2}}}$$

d. i. nach Formel (3) §. 2 für $p-1=n-\frac{1}{2}$, $p+q=\mu+\frac{1}{2}$ also $p=n+\frac{1}{2}$ und $q=\mu-n$

$$\frac{2^n}{2^{\mu+1}}\cdot\frac{\Gamma(n+\frac{1}{2})\,\Gamma(\mu-n)}{\Gamma(\mu+\frac{1}{2})}.$$

Nehmen wir hierin $n=0, 1, 2, 3$ ..... etc. so erhalten wir die Werthe der einzelnen in (3) auf der rechten Seite vorkommenden Integrale; setzen wir auch für die linke Seite ihren unter Nr. (4) gefundenen Werth, so ist jetzt nach beiderseitiger Hebung mit $\Gamma(\mu+\frac{1}{2})$,

$$\frac{1}{4}\;\Gamma\left(\frac{\mu+m+1}{2}\right)\;\Gamma\left(\frac{\mu-m}{2}\right)$$

$$=\frac{1}{2^{\mu+1}}\left\{M_0\,\Gamma(\tfrac{1}{2})\,\Gamma(\mu)+M_2\,2^1\,\Gamma(\tfrac{3}{2})\,\Gamma(\mu-1)+M_4\,2^2\,\Gamma(\tfrac{5}{2})\,\Gamma(\mu-2)+\ldots\right\}$$

Digitized by Google

Führt man die Werthe von $M_0$, $M_2$, $M_4$ etc. aus der Gleichung (1) wieder ein und erinnert sich, dass

$$\Gamma(\tfrac{1}{2}) = \sqrt{\pi},\ \Gamma(\tfrac{3}{2}) = \tfrac{1}{2}\sqrt{\pi},\ \Gamma(\tfrac{5}{2}) = \frac{1.3}{2^2}\sqrt{\pi} \text{ etc.}$$

ist, so erhält man nach beiderseitiger Multiplikation mit $\frac{2^{\mu+1}}{\sqrt{\pi}}$ das Resultat in folgender Gestalt:

$$\left.\begin{aligned} &\frac{2^{\mu-1}}{\sqrt{\pi}}\,\Gamma\left(\frac{\mu+m+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{\mu-m}{2}\right) \\ &= \Gamma(\mu) + \frac{(m+1)m}{2}\Gamma(\mu-1) + \frac{(m+2)(m+1)m(m-1)}{2.4}\Gamma(\mu-2) + \ldots \end{aligned}\right\} \quad (5)$$

Will man Gammafunktionen ausschliessen, deren Veränderliche negativ ist, so muss man $\mu > m$ nehmen. Es wird dann auch auf der rechten Seite keine der Grössen $\mu-1$, $\mu-2$, .... etc. negativ, weil die Reihe mit dem Gliede

$$\frac{(m+m)(m+m-1)\ldots.(m-\overline{m-1})}{2.4.6\ldots.(2m)}\,\Gamma(\mu-m)$$

abbricht, indem die darauf folgenden den Faktor $m-m<0$ enthalten.

Als spezieller Fall ist der Werth $m=0$ von Interesse. Man findet nämlich

$$\frac{2^{\mu-1}}{\sqrt{\pi}}\,\Gamma\left(\frac{\mu+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{\mu}{2}\right) = \Gamma(\mu)$$

oder $2\mu$ für $\mu$ gesetzt

$$\Gamma(\mu)\,\Gamma(\mu+\tfrac{1}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{\mu-1}}\,\Gamma(2\mu). \quad (6)$$

Dividirt man mit beiden Seiten in $\overline{\Gamma(\mu)}^2$ so erhält man noch

$$\frac{\Gamma(\mu)}{\Gamma(\mu+\frac{1}{2})} = \frac{2^{\mu-1}}{\sqrt{\pi}}\cdot\frac{\overline{\Gamma(\mu)}^2}{\Gamma(2\mu)} \quad (7)$$

wovon wir nachher Gebrauch machen werden.



Digitized by Google

## §. 5.

Es lässt sich durch ein Verfahren, das mit dem im vorigen Paragraphen benutzten viel Aehnlichkeit hat, leicht noch ein zweites Theorem über die Gammafunktionen ableiten, welches im Allgemeinen von der Form des in Nr. (5) ist, nur mit dem Unterschiede, dass rechts statt der einzelnen Funktionen $\Gamma(\mu)$, $\Gamma(\mu-1)$ etc. die Quotienten je zweier Funktionen stehen, in denen die Veränderlichen jedesmal um den Bruch $\frac{1}{2}$ differiren.

Man hat bekanntlich für jede ungerade Zahl $n$ und einen beliebigen Bogen $u$ die Gleichung:

$$(-1)^{\frac{n-1}{2}} \cos nu$$
$$= \frac{n}{1}\cos u - \frac{n(n^2-1^2)}{1.2.3}\cos^3 u + \frac{n(n^2-1^2)(n^2-3^2)}{1.2.3.4.5}\cos^5 u - \ldots.$$

oder

$$\frac{(-1)^{\frac{n-1}{2}}}{n}\cos nu$$
$$= \cos u - \frac{(n+1)(n-1)}{2.3}\cos^3 u + \frac{(n+3)(n+1)(n-1)(n-3)}{2.3.4.5}\cos^5 u - \ldots$$

Setzt man hierin $u = \sqrt{-1}\,lx$ und $n = 2m+1$, wo nun $m$ jede beliebige positive ganze Zahl bedeuten kann, so erhält man leicht

$$\frac{(-1)^m}{2m+1}\left(x^{2m+1} + \frac{1}{x^{2m+1}}\right)$$
$$= \left(x+\frac{1}{x}\right) - \frac{(m+1)m}{2.3}\left(x+\frac{1}{x}\right)^3 + \frac{(m+2)(m+1)m(m-1)}{2.3.4.5}\left(x+\frac{1}{x}\right)^5 - \ldots.$$

Setzen wir noch zur Abkürzung

$$M_1 = 1,\ M_3 = \frac{(m+1)m}{2.3},\ M_5 = \frac{(m+2)(m+1)m(m-1)}{2.3.4.5},\ \ldots. \quad (1)$$

und dividiren in jener Gleichung durchgängig mit $x$, so erhalten wir Folgendes:

Digitized by Google

$$\frac{(-1)^m}{2m+1}\left(x^{2m}+\frac{1}{x^{2m+2}}\right)$$

$$=\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\left[M_1-M_3\left(x+\frac{1}{x}\right)^2+M_5\left(x+\frac{1}{x}\right)^4-\ldots\ldots\right].$$

Diese Gleichung werde nun mit

$$\frac{dx}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^{2\mu+1}}$$

multiplizirt und darauf zwischen den Gränzen $x=0$ und $x=1$ integrirt. Es ist dann

$$\left.\begin{aligned}&\frac{(-1)^m}{2m+1}\left[\int_0^1\frac{x^{2m}dx}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^{2\mu+1}}+\int_0^1\frac{dx}{x^{2m+2}\left(x+\frac{1}{x}\right)^{2\mu+1}}\right]\\&=M_1\int_0^1\frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^{2\mu+1}}-M_3\int_0^1\frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^{2\mu+1}}\left(x+\frac{1}{x}\right)^2\\&+M_5\int_0^1\frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^{2\mu+1}}\left(x+\frac{1}{x}\right)^4-M_7\int_0^1\frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^{2\mu+1}}\left(x+\frac{1}{x}\right)^6+\ldots\end{aligned}\right\}(2)$$

und hierin lassen sich die Werthe sämmtlicher Integrale nach einigen Reduktionen mit Hülfe der Gammafunktionen angeben.

I. Setzt man in dem ersten Integrale links $x=y$, im zweiten $x=\frac{1}{y}$, so ändert jenes seine Form nicht, dagegen wird für dieses $dx=-\frac{dy}{y^2}$ und wenn $x$ die Werthe 0 und 1 angenommen hat, ist $y=\frac{1}{x}$ in $\infty$ und 1 übergegangen. Die beiden in Parenthese stehenden Integrale sind demnach:

Digitized by Google

$$= \int_0^1 \frac{y^{2m}\,dy}{\left(y+\frac{1}{y}\right)^{2\mu+1}} - \int_\infty^1 \frac{y^{2m}\,dy}{\left(\frac{1}{y}+y\right)^{2\mu+1}}$$

$$= \int_0^1 \frac{y^{2m}\,dy}{\left(y+\frac{1}{y}\right)^{2\mu+1}} + \int_1^\infty \frac{y^{2m}\,dy}{\left(y+\frac{1}{y}\right)^{2\mu+1}}$$

oder wenn man beide Integrale in ein einziges zusammenzieht

$$= \int_0^\infty \frac{y^{2m}\,dy}{\left(y+\frac{1}{y}\right)^{2\mu+1}} = \int_0^\infty \frac{y^{2\mu+2m+1}\,dy}{\left(y^2+1\right)^{2\mu+1}}$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{y^{2\mu+2m}\,2y\,dy}{\left(1+y^2\right)^{2\mu+1}}.$$

Setzt man noch $y^2 = r$, wodurch sich die Gränzen nicht ändern und $2y\,dy = r$ wird, so geht das Integral über in

$$\frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{r^{\mu+m}\,dr}{(1+r)^{2\mu+1}} = \frac{1}{2}\cdot\frac{\Gamma(\mu+m+1)\,\Gamma(\mu-m)}{\Gamma(2\mu+1)}$$

wie man leicht aus der Gleichung (3) in §. 2 für $p-1=\mu+m$ und $p+q=2\mu+1$ findet. Die linke Seite der Gleichung (2) hat demnach den Werth:

$$\frac{(-1)^m}{2m+1}\cdot\frac{1}{2}\,\frac{\Gamma(\mu+m+1)\,\Gamma(\mu-m)}{\Gamma(2\mu+1)}. \qquad (3)$$

II. Die Integrale auf der rechten Seite der Gleichung (2) stehen unter der gemeinschaftlichen Form:

$$\int_0^1 \frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^{2\mu+1}}\left(x+\frac{1}{x}\right)^{2n} = \int_0^1 \frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^{2\mu-2n+1}}$$

Digitized by Google

aus welcher sie der Reihe nach für $n=0, 1, 2, ..$ hervorgehen. Bemerkt man noch, dass $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2 = 4 + \left(x-\frac{1}{x}\right)^2$ mithin $x+\frac{1}{x} = \left[4+\left(x-\frac{1}{x}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$ ist, so kann man das obige Integral auch in folgender Form darstellen:

$$\int_0^1 \frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx}{\left[4+\left(x-\frac{1}{x}\right)^2\right]^{\mu-n+\frac{1}{2}}}.$$

Setzt man hier $\frac{1}{x}-x=z$, so wird $\left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx = -dz$, und wenn $x$ die Werthe 1 und 0 angenommen hat, ist entsprechend $z=0$ und $z=\infty$ geworden. Durch diese Substitution geht das Integral über in:

$$-\int_\infty^0 \frac{dz}{(4+z^2)^{\mu-n+\frac{1}{2}}} = \int_0^\infty \frac{dz}{(4+z^2)^{\mu-n+\frac{1}{2}}}$$

woraus sich für $z=2\sqrt{r}$ ergiebt

$$\frac{1}{4^{\mu-n+\frac{1}{2}}}\int_0^\infty \frac{r^{\frac{1}{2}-1}dr}{(1+r)^{\mu-n+\frac{1}{2}}} = \frac{2^{2n}}{2^{2\mu+1}}\cdot\frac{\Gamma(\frac{1}{2})\,\Gamma(\mu-n)}{\Gamma(\mu-n+\frac{1}{2})}. \quad (4)$$

Setzt man nun für die linke Seite in (2) ihren Werth aus (3) und in dem vorliegenden Integrale der Reihe nach $n=0, 1, 2, 3, \ldots$ so hat man

$$\frac{(-1)^m}{2m+1}\cdot\frac{1}{2}\,\frac{\Gamma(\mu+m+1)\,\Gamma(\mu-m)}{\Gamma(2\mu+1)}$$

$$= \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2\mu+1}}\left[M_1\frac{\Gamma(\mu)}{\Gamma(\mu+\frac{1}{2})} - M_2\frac{2^2\,\Gamma(\mu-1)}{\Gamma(\mu-1+\frac{1}{2})} + M_3\frac{2^4\,\Gamma(\mu-2)}{\Gamma(\mu-2+\frac{1}{2})} - \ldots\ldots\right]$$

Digitized by Google

oder vermöge der Werthe von $M_1$, $M_2$, $M_3$ ... etc. in (1)

$$\left.\begin{aligned} &\frac{(-1)^m 2^{2\mu}}{(2m+1)\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\Gamma(\mu+m+1)\,\Gamma(\mu-m)}{\Gamma(2\mu+1)} \\ &= \frac{\Gamma(\mu)}{\Gamma(\mu+\frac{1}{2})} - \frac{(m+1)\,m}{2\,.\,3} \cdot \frac{2^2\,\Gamma(\mu-1)}{\Gamma(\mu-1+\frac{1}{2})} \\ &\quad + \frac{(m+2)(m+1)m(m-1)}{2\,.\,3\,.\,4\,.\,5} \cdot \frac{2^4\,\Gamma(\mu-2)}{\Gamma(\mu-2+\frac{1}{2})} - \ldots. \end{aligned}\right\} (5)$$

wobei noch $\mu > m$ sein muss, wenn man solche Gammafunktionen ausschliessen will, deren Veränderliche negativ sind. Man kann diesem Theoreme auch noch eine andere Gestalt geben. Nach Nr. (7) im vorigen Paragraphen ist nämlich wenn man $\mu - n$ für $\mu$ setzt

$$\frac{\Gamma(\mu-n)}{\Gamma(\mu-n+\frac{1}{2})} = \frac{2^{2\mu-1}}{2^{2n}\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\Gamma(\mu-n)^2}{\Gamma(2\mu-2n)}$$

und hiernach erhält man nach (4)

$$\frac{2^{2n}\Gamma(\frac{1}{2})\,\Gamma(\mu-n)}{2^{2\mu+1}\,\Gamma(\mu-n+\frac{1}{2})} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\Gamma(\mu-n)^2}{\Gamma(2\mu-2n)}$$

und dies ist jetzt der Werth der Form, unter welcher alle Integrale in (2) stehen. Es wird daher für $n = 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \ldots$ aus der Gleichung (2)

$$\frac{(-1)^m}{2m+1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\Gamma(\mu+m+1)\,\Gamma(\mu-m)}{\Gamma(2\mu+1)}$$

$$= \frac{1}{4}\left[M_1 \frac{\Gamma(\mu)^2}{\Gamma(2\mu)} - M_2 \frac{\Gamma(\mu-1)^2}{\Gamma(2\mu-2)} + M_3 \frac{\Gamma(\mu-2)^2}{\Gamma(2\mu-4)} - \ldots\ldots\right]$$

oder

$$\left.\begin{aligned} &\frac{(-1)^m 2}{2m+1} \cdot \frac{\Gamma(\mu+m+1)\,\Gamma(\mu-m)}{\Gamma(2\mu+1)} \\ &= \frac{\Gamma(\mu)^2}{\Gamma(2\mu)} - \frac{(m+1)m}{2\,.\,3} \cdot \frac{\Gamma(\mu-1)^2}{\Gamma(2\mu-2)} + \frac{(m+2)(m+1)m(m-1)}{2\,.\,3\,.\,4\,.\,5} \cdot \frac{\Gamma(\mu-2)^2}{\Gamma(2\mu-4)} - \ldots. \end{aligned}\right\} (6)$$

Digitized by Google

wo wieder $\mu > m$ sein muss, wenn keine der Grössen $\mu - 1$, $\mu - 2$, $\mu - 3$ etc. negativ werden soll.

## §. 6.

In ähnlicher Weise, wie wir das Problem der Addition der Gammafunktionen gestellt hatten, können wir auch die Multiplikation derselben verlangen. Wir haben in der That schon eine Relation kennen gelernt, welche zeigte, wie das Produkt einer Partie von Gammafunktionen wieder durch eine Gammafunktion ausgedrückt werden kann, vorausgesetzt, dass unter den Veränderlichen in den Faktoren eine gewisse Rekursion stattfindet. Es war diess die Gleichung (4) in §. 3. Dieselbe bildet aber nur einen speziellen Fall eines allgemeineren Theoremes, wonach das Produkt

$$\Gamma(\mu)\,\Gamma(\mu+\frac{1}{n})\,\Gamma(\mu+\frac{2}{n})\,\ldots\,\Gamma(\mu+\frac{n-1}{n})$$

worin $\mu$ beliebig, $n$ eine positive ganze Zahl ist, durch eine einzige Gammafunktion dargestellt werden kann. Bevor wir aber die Ableitung desselben geben, müssen wir erst noch einige andere Betrachtungen anstellen, welche die Verwandlung von $\frac{d l\Gamma(\mu)}{d\mu}$ in ein bestimmtes Integral zum Zwecke haben.

Wenn man die Gleichung

$$\int_0^\infty e^{-ut}dt = \frac{1}{u}$$

mit $du$ multiplizirt und zwischen den Gränzen $u = \alpha$, $u = \beta$ integrirt, so ist

$$\int_\alpha^\beta du \int_0^\infty e^{-ut}dt = \int_\alpha^\beta \frac{du}{u} = l(\frac{\beta}{\alpha}) \qquad (1)$$

kehrt man aber links die Ordnung der Integration um, so ist das Doppelintegral auch gleich

$$\int_0^\infty dt \int_\alpha^\beta e^{-tu}du = \int_0^\infty dt\,\frac{e^{-t\alpha} - e^{-t\beta}}{t}. \qquad (2)$$

Digitized by Google

und mithin haben wir durch Vergleichung von (1) und (2)

$$\int_0^\infty (e^{-\alpha t} - e^{-\beta t}) \frac{dt}{t} = l\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)$$

also z. B. für $\beta = x$, $\alpha = 1$

$$\int_0^\infty (e^{-t} - e^{-xt}) \frac{dt}{t} = lx \,. \tag{3}$$

wovon wir sogleich Gebrauch machen werden.

Differenziirt man die Gleichung

$$\int_0^\infty x^{\mu-1} e^{-x} dx = \Gamma(\mu)$$

nach $\mu$ und bezeichnet $\frac{d\Gamma(\mu)}{d\mu}$ kurz mit $\Gamma'(\mu)$, so ist

$$\int_0^\infty x^{\mu-1} e^{-x} dx \, lx = \Gamma'(\mu)$$

und wenn man darin die Gleichung (3) substituirt

$$\Gamma'(\mu) = \int_0^\infty x^{\mu-1} e^{-x} dx \int_0^\infty (e^{-t} - e^{-xt}) \frac{dt}{t}$$

oder durch Integration der einzelnen Glieder

$$\Gamma'(\mu) = \int_0^\infty x^{\mu-1} e^{-x} dx \int_0^\infty \frac{dt}{t} e^{-t} - \int_0^\infty x^{\mu-1} e^{-x} dx \int_0^\infty \frac{dt}{t} e^{-xt}. \tag{4}$$

In dem ersten Doppelintegrale kommt bei der Integration nach $t$ kein $x$ vor; das Doppelintegral verwandelt sich daher in ein bloses Produkt zweier Integrale und ist

$$= \Gamma(\mu) \int_0^\infty \frac{dt}{t} e^{-t}.$$

Im zweiten Doppelintegrale lässt sich die Integrationsordnung umkehren, so dass man zuerst nach $x$ integrirt, wodurch man erhält

$$\int_0^\infty \frac{dt}{t} \int_0^\infty x^{\mu-1} e^{-x} e^{-tx} dx = \Gamma(\mu) \int_0^\infty \frac{dt}{t} \cdot \frac{1}{(1+t)^\mu} \cdot$$

Digitized by Google

Hierdurch geht die Gleichung (4) in die folgende über

$$\Gamma'(\mu) = \Gamma(\mu)\int_0^\infty \frac{dt}{t}e^{-t} - \Gamma(\mu)\int_0^\infty \frac{dt}{t(1+t)^\mu}$$

woraus sich unter der Bemerkung, dass $\frac{\Gamma'(\mu)}{\Gamma(\mu)} = \frac{d\,l\,\Gamma(\mu)}{d\mu}$ ist, leicht die Formel ergiebt:

$$\frac{d\,l\,\Gamma(\mu)}{d\mu} = \int_0^\infty \frac{dt}{t}e^{-t} - \int_0^\infty \frac{dt}{t(1+t)^\mu}. \qquad (5)$$

Diese Gleichung ist noch einer bemerkenswerthen Transformation fähig. Man kann nämlich identisch setzen

$$\left.\begin{aligned}\frac{d\,l\,\Gamma(\mu)}{d\mu} &= \int_0^\infty \frac{dt}{t}e^{-t} - \int_0^\infty \frac{dt}{t(1+t)} + \int_0^\infty \left[\frac{1}{1+t} - \frac{1}{(1+t)^\mu}\right]\frac{dt}{t}\end{aligned}\right\} (6)$$

indem sich das zweite Integral gegen das erste aus der Parenthese entspringende hebt. Hierbei sind die zwei ersten Integrale von $\mu$ frei, bilden also eine Constante, deren Werth sich leicht dadurch bestimmen lässt, dass man die Integrale selbst als die Gränzen betrachtet, denen sich die Ausdrücke

$$\int_0^n \frac{dt}{t}e^{-t} \quad \text{und} \quad \int_0^n \frac{dt}{t(1+t)}$$

für wachsende $n$ nähern. Nun ist aber, wenn man für $e^{-t}$ die gleichgeltende immer convergente Reihe setzt und $\frac{1}{t(1+t)}$ in $\frac{1}{t} - \frac{1}{1+t}$ zerlegt,

$$\int_0^n \frac{dt}{t}e^{-t} - \int_0^n \frac{dt}{t(1+t)}$$

$$= \int_0^n \left[\frac{1}{t} - \frac{1}{1} + \frac{t}{1.2} - \frac{t^2}{1.2.3} + \frac{t^3}{1.2.3.4} - \ldots\right] dt$$

$$- \int_0^n \frac{dt}{t} + \int_0^n \frac{dt}{1+t}.$$



Digitized by Google

Hierbei hebt sich das Integral $\int_0^n \frac{dt}{t}$ und es bleibt rechts nach geschehener Integration noch übrig

$$-\frac{1}{1}\cdot\frac{n}{1}+\frac{1}{2}\cdot\frac{n^2}{1.2}-\frac{1}{3}\cdot\frac{n^3}{1.2.3}+\ldots\ldots+l(n+1)$$

$$=ln-\frac{1}{1}\cdot\frac{n}{1}+\frac{1}{2}\cdot\frac{n^2}{1.2}-\frac{1}{3}\cdot\frac{n^3}{1.2.3}+\ldots.+l\left(1+\frac{1}{n}\right)\cdot$$

Nun hat man aber bekanntlich folgende unter allen Umständen convergirende Reihe für den Integrallogarithmus

$$li\,a=\frac{1}{2}\,l[(la)^2]+\frac{1}{1}\cdot\frac{la}{1}+\frac{1}{2}\cdot\frac{(la)^2}{1.2}+\frac{1}{3}\cdot\frac{(la)^3}{1.2.3}+\ldots+C$$

wo die Constante $C=0{,}577\,2156$ ist. Setzt man hierin $a=e^{-n}$ so findet man

$$ln-\frac{1}{1}\cdot\frac{n}{1}+\frac{1}{2}\cdot\frac{n^2}{1.2}-\frac{1}{3}\cdot\frac{n^3}{1.2.3}+\ldots.=li(e^{-n})-C$$

folglich nach dem Vorhergehenden

$$\int_0^n\frac{dt}{t}e^{-t}-\int_0^n\frac{dt}{t(1+t)}=li(e^{-n})-C+l\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

und für unbegränzt wachsende $n$

$$\int_0^\infty\frac{dt}{t}e^{-t}-\int_0^\infty\frac{dt}{t(1+t)}=li(0)-C.$$

Da aber

$$li\,a=\int_0^a\frac{dx}{lx}$$

ist, so folgt $li(0)=0$ mithin

$$\int_0^\infty\frac{dt}{t}e^{-t}-\int_0^\infty\frac{dt}{t(1+t)}=-C. \qquad (6^*)$$

Digitized by Google

Hierdurch geht die Gleichung (6) in die folgende über

$$\frac{d\,l\,\Gamma(\mu)}{d\mu} = -C + \int_0^\infty \left[\frac{1}{1+t} - \frac{1}{(1+t)^\mu}\right]\frac{dt}{t} \qquad (7)$$

welche sich noch eleganter gestaltet, wenn man $\frac{1}{1+t} = x$ setzt, woraus $t = \frac{1+x}{x}$ und $dt = -\frac{dx}{x^2}$ folgt; ist ferner $t = \infty$ und $t = 0$ geworden, so hat jetzt $x$ die Werthe $x = 0$ und $x = 1$ angenommen und daher ist auch

$$\frac{d\,l\,\Gamma(\mu)}{d\mu} = -C - \int_1^0 \left[x - x^\mu\right]\frac{dx}{x^2 \cdot \frac{1-x}{x}}$$

oder

$$\frac{d\,l\,\Gamma(\mu)}{d\mu} = -C + \int_0^1 \frac{1-x^{\mu-1}}{1-x}\,dx, \quad [C = 0{,}5772156\ldots.]. \qquad (8)$$

Diese Gleichung bildet die Basis für alle unsere ferneren Untersuchungen.

## §. 7.

Mit Hülfe des soeben gefundenen Satzes kann man nun ohne Schwierigkeit das Theorem entwickeln, welches im Anfang des vorigen Paragraphen erwähnt wurde.

Setzt man in der Gleichung (8) $\mu + \frac{m}{n}$ für $\mu$ so ist auch

$$\frac{d\,l\,\Gamma(\mu+\frac{m}{n})}{d\mu} = -C + \int_0^1 \frac{1-x^{\mu+\frac{m}{n}-1}}{1-x}\,dx$$

oder, wenn man rechts $x = z^n$ nimmt

$$\frac{d\,l\,\Gamma(\mu+\frac{m}{n})}{d\mu} = -C + n\int_0^1 \frac{z^{n-1} - z^{n\mu+m-1}}{1-z^n}\,dz.$$

Digitized by Google

Denkt man sich in dieser Gleichung für $m$ der Reihe nach $0, 1, 2, \ldots n-1$ geschrieben und addirt alle so entstehenden $n$ Gleichungen, so erhält man

$$\frac{dl\Gamma(\mu)}{d\mu}+\frac{dl\Gamma\left(\mu+\frac{1}{n}\right)}{d\mu}+\frac{dl\Gamma\left(\mu+\frac{2}{n}\right)}{d\mu}+\ldots\ldots+\frac{dl\Gamma\left(\mu+\frac{n-1}{n}\right)}{d\mu}$$

$$=-nC+n\int_0^1\frac{nz^{n-1}-z^{n\mu-1}\left(1+z+z^2+\ldots\ldots+z^{n-1}\right)}{1-z^n}\,dz$$

woraus sich unter der Bemerkung, dass

$$1+z+z^2+\ldots\ldots+z^{n-1}=\frac{1-z^n}{1-z}$$

ist, ergiebt

$$\frac{dl\left[\Gamma(\mu)\,\Gamma\left(\mu+\frac{1}{n}\right)\,\Gamma\left(\mu+\frac{2}{n}\right)\ldots\ldots\,\Gamma\left(\mu+\frac{n-1}{n}\right)\right]}{d\mu}$$

$$=-nC+n\int_0^1\left[\frac{nz^{n-1}}{1-z^n}-\frac{z^{n\mu-1}}{1-z}\right]dz\,.$$

Setzt man ferner in der Gleichung (8) $n\mu$ für $\mu$, wodurch $n\,d\mu$ an die Stelle von $d\mu$ kommt, multiplizirt darauf beiderseits mit $n$ und schreibt $z$ für $x$, so ist

$$\frac{dl\Gamma(n\mu)}{d\mu}=-nC+n\int_0^1\frac{1-z^{n\mu-1}}{1-z}\,dz\,.$$

Durch Subtraktion dieser Gleichung von der vorigen ergiebt sich

$$\left.\begin{aligned}\frac{d}{d\mu}\,l\left\{\frac{\Gamma(\mu)\,\Gamma\left(\mu+\frac{1}{n}\right)\,\Gamma\left(\mu+\frac{2}{n}\right)\ldots\ldots\,\Gamma\left(\mu+\frac{n-1}{n}\right)}{\Gamma(n\mu)}\right\}\\ =n\int_0^1\left[\frac{nz^{n-1}}{1-z^n}-\frac{1}{1-z}\right]dz\,.\end{aligned}\right\}\quad(1)$$

Digitized by Google

Der Werth des Integrales auf der rechten Seite ist sehr leicht zu finden. Man hat nämlich

$$\int \left[\frac{nz^{n-1}}{1-z^n} - \frac{1}{1-z}\right] dz = -l(1-z^n) + l(1-z)$$

$$= -l\left(\frac{1-z^n}{1-z}\right) = -l(1+z+z^2+\ldots+z^{n-1})$$

folglich

$$\int_0^1 \left[\frac{nz^{n-1}}{1-z^n} - \frac{1}{1-z}\right] dz = -ln\,.$$

Demnach ist vermöge der Gleichung (1)

$$\frac{d}{d\mu} l\left\{\frac{\Gamma(\mu)\,\Gamma\left(\mu+\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\mu+\frac{2}{n}\right)\ldots\Gamma\left(\mu+\frac{n-1}{n}\right)}{\Gamma(n\mu)}\right\}$$

$$= -nln = l\left(\frac{1}{\mu^n}\right)$$

wobei die rechte Seite in Bezug auf $\mu$ constant ist.

Multiplizirt man beiderseits mit $d\mu$, integrirt hierauf und bezeichnet die Constante der Integration mit $lk$, so ist

$$l\left\{\frac{\Gamma(\mu)\,\Gamma\left(\mu+\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\mu+\frac{2}{n}\right)\ldots\Gamma\left(\mu+\frac{n-1}{n}\right)}{\Gamma(n\mu)}\right\}$$

$$= \mu l\left(\frac{1}{n^n}\right) + lk = l(n^{-n\mu}k)$$

woraus sofort folgt

$$\Gamma(\mu)\,\Gamma\left(\mu+\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\mu+\frac{2}{n}\right)\ldots\Gamma\left(\mu+\frac{n-1}{n}\right) = n^{-n\mu}k\,\Gamma(n\mu)\,. \qquad (2)$$

Um noch die Constante $k$ zu bestimmen, nehmen wir $\mu = \frac{1}{n}$; es wird dann:

Digitized by Google

$$\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)\Gamma\left(\frac{3}{n}\right)\ldots\ldots\Gamma\left(\frac{n-1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{n}{n}\right)=n^{-1}k$$

oder weil $\Gamma\left(\frac{n}{n}\right)=\Gamma(1)=1$ ist

$$k=n\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)\Gamma\left(\frac{3}{n}\right)\ldots\ldots\Gamma\left(\frac{n-1}{n}\right).$$

Nach Formel (4) §. 3 ist aber

$$\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)\Gamma\left(\frac{3}{n}\right)\ldots\ldots\Gamma\left(\frac{n-1}{n}\right)=(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}n^{-\frac{1}{2}}$$

folglich wird jetzt

$$k=(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}n^{\frac{1}{2}}.$$

Durch Substitution dieses Werthes in die Gleichung (2) erhalten wir jetzt das schöne Theorem:

$$\left.\begin{aligned}\Gamma(\mu)\,\Gamma\left(\mu+\frac{1}{n}\right)\,\Gamma\left(\mu+\frac{2}{n}\right)\ldots\ldots\Gamma\left(\mu+\frac{n-1}{n}\right)\\ =n^{\frac{1}{2}-n\mu}(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}\Gamma(n\mu)\end{aligned}\right\}\quad(3)$$

das zuerst von Legendre bewiesen worden ist *).

---

*) Der sinnreiche Gedanke, diesen Satz mittelst eines bestimmten Integrales für $\frac{d\,l\Gamma(\mu)}{d\mu}$ abzuleiten, was offenbar der direkteste Weg ist, rührt von Lejeune Dirichlet her, worüber man Crelle's *Journal für Mathematik Bd.* 15, *S.* 258 nachsehen kann. Daselbst wird die Gleichung (5) §. 6 unmittelbar benutzt, was aber einige Unbequemlichkeiten verursacht. Ich habe es daher vorgezogen den Beweis des Legendre'schen Theoremes unter Anwendung der Gleichung (8) §. 6 zu führen, wodurch die Rechnung an Einfachheit und Eleganz gewonnen haben dürfte.

Digitized by Google

## Cap. III.

## *Reihen und Produkte zur Berechnung der Gammafunktionen.*

### §. 8.

Die Formel (8) in §. 6 dient uns als Ausgangspunkt für das Problem, die Gammafunktionen in Reihen und Produkte zu verwandeln. Es ist vermöge derselben

$$\frac{d\,l\Gamma(1+\mu)}{d\mu} = -C + \int_0^1 \frac{1-x^\mu}{1-x}\,dx\,. \qquad (1)$$

Andererseits hat man

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \ldots\ldots + x^{n-1} + \frac{x^n}{1-x}$$

folglich

$$\frac{d\,l\Gamma(1+\mu)}{d\mu}$$

$$= -C + \int_0^1 \left[1 + x + x^2 + \ldots\ldots + x^{n-1}\right](1-x^\mu)\,dx$$

$$+ \int_0^1 \frac{x^n}{1-x}(1-x^\mu)\,dx$$

und durch Integration der einzelnen Reihenglieder

$$\frac{d\,l\Gamma(1+\mu)}{d\mu} = -C + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots\ldots + \frac{1}{n}$$

$$- \left[\frac{1}{1+\mu} + \frac{1}{2+\mu} + \frac{1}{3+\mu} + \ldots\ldots + \frac{1}{n+\mu}\right]$$

$$+ \int_0^1 \frac{1-x^\mu}{1-x}\,x^n\,dx$$

woraus sich nach Vereinigung je zweier entsprechender Glieder in den unter einander stehenden Reihen ergiebt:

Digitized by Google

$$\left.\begin{aligned} &\frac{d l \Gamma(1+\mu)}{d\mu} \\ &= -C + \frac{1}{1}\cdot\frac{\mu}{1+\mu} + \frac{1}{2}\cdot\frac{\mu}{2+\mu} + \frac{1}{3}\cdot\frac{\mu}{3-\mu} + \ldots + \frac{1}{n}\cdot\frac{\mu}{n+\mu} \\ &\quad + \int_0^1 \frac{1-x^\mu}{1-x}\, x^n dx . \end{aligned}\right\} (2)$$

Es liegt nun der Gedanke sehr nahe, die Zahl $n$, welche die Gliedermenge unserer Reihe angiebt, ins Unendliche wachsen zu lassen und hierdurch die endliche Reihe zu einer unendlichen zu machen. Zur Ausführung dieser Idee ist aber nöthig, dass wir die Gränze bestimmen, der sich das Integral

$$\int_0^1 \frac{1-x^\mu}{1-x}\, x^n dx ,$$

welches den Rest der Reihe bildet, für unbegränzt wachsende $n$ nähert. Diess lässt sich durch folgende Betrachtungen erreichen.

1) Setzen wir erstlich $\mu$ als positiv voraus, so können wir behaupten, dass die Funktion

$$\frac{1-x^\mu}{1-x}$$

nicht unendlich werden kann, sobald $x$ das Intervall 0 bis 1 durchläuft. In der That könnte der fragliche Bruch nur dann unendlich werden, wenn sein Nenner $1-x$ in Null, also $x$ in 1 überginge; dann wird aber wegen des positiven $\mu$ auch der Zähler $=0$ und der Bruch stellt sich unbestimmte Form $\frac{0}{0}$, deren wahrer Werth in diesem Falle $=\mu$ ist, wie man mittelst der Differenzialrechnung leicht findet. Da also die genannte Funktion nicht unendlich wird, wenn $x$ von 0 bis 1 geht, so müssen das Maximum und Minimum, welche sie bei der erwähnten successiven Aenderung des $x$ gewiss einmal bekommt, endliche Grössen sein. Bezeichnen wir sie mit $A$ und $B$, so ist für das ganze Intervall $x=0$ bis $x=1$

$$A - \frac{1-x^\mu}{1-x} \text{ positiv und } B - \frac{1-x^\mu}{1-x} \text{ negativ}$$

Digitized by Google

folglich weil $x^n$ innerhalb jenes Intervalles immer positiv bleibt

$$\left(A-\frac{1-x^\mu}{1-x}\right)x^n \text{ positiv, } \left(B-\frac{1-x^\mu}{1-x}\right)x^n \text{ negativ}$$

und auch

$$\int_0^1\left(A-\frac{1-x^\mu}{1-x}\right)x^n dx \text{ positiv, } \int_0^1\left(B-\frac{1-x^\mu}{1-x}\right)x^n \text{ negativ}$$

woraus sich ergiebt:

$$\int_0^1 Ax^n dx > \int_0^1 \frac{1-x^\mu}{1-x}x^n dx$$

und

$$\int_0^1 Bx^n dx < \int_0^1 \frac{1-x^\mu}{1-x}x^n dx$$

oder

$$\frac{A}{n+1} > \int_0^1 \frac{1-x^\mu}{1-x}x^n dx > \frac{B}{n+1}.$$

Da nun $A$ und $B$ endliche bestimmte Grössen sind, so nehmen die beiden Gränzen, zwischen denen der Werth unseres Integrales liegt, bei unendlich wachsenden $n$ beständig ab, und es ist folglich für positive $\mu$

$$Lim. \int_0^1 \frac{1-x^\mu}{1-x}x^n dx = 0.$$

2) Wäre $\mu$ negativ, also das betrachtete Integral der Gestalt

$$\int_0^1 \frac{1-x^{-\mu}}{1-x}x^n dx$$

so ist die vorige Betrachtung zwar nicht mehr direkt, aber doch mit einer kleinen Modifikation anwendbar. Schreibt man nämlich dasselbe in der Form

$$\int_0^1 \frac{x^\mu-1}{1-x}x^{n-\mu}dx$$



Digitized by Google

so gelten jetzt für die Funktion $\frac{x^\mu - 1}{1-x}$ ganz dieselben Bemerkungen, wie für die frühere $\frac{1-x^\mu}{1-x}$. Ihr Maximum $A'$ und ihr Minimum $B'$ sind nämlich endliche Grössen und man erhält nun durch den nämlichen Gedankengang wie vorher

$$\frac{A'}{n-\mu+1} > \int_0^1 \frac{x^\mu - 1}{1-x} x^{n-\mu} dx > \frac{B'}{n-\mu+1}.$$

Da hier die beliebige Zahl $n > \mu$ genommen werden darf, so folgt jetzt für unendlich wachsende $n$

$$Lim. \int_0^1 \frac{x^\mu - 1}{1-x} x^{n-\mu} dx = Lim. \int_0^1 \frac{1-x^{-\mu}}{1-x} x^n dx = 0.$$

Es nähert sich also das in Nr. (2) den Rest bildende Integral für jedes $\mu$ bei unendlich wachsenden $n$ der Gränze Null. Zugleich wird die Reihe eine unendliche und es entsteht die Gleichung:

$$\left.\begin{aligned} &\frac{d l \Gamma(1+\mu)}{d\mu} \\ &= -C + \frac{1}{1} \cdot \frac{\mu}{1+\mu} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu}{2+\mu} + \frac{1}{3} \cdot \frac{\mu}{3+\mu} + \ldots \text{ in inf.} \end{aligned}\right\} \quad (3)$$

aus welcher verschiedene Folgerungen gezogen werden können.

Unter der Voraussetzung, dass der absolute Werth von $\mu$ ein ächter Bruch ist, lässt sich die Reihe auf der rechten Seite in eine andere umsetzen, welche nach Potenzen von $\mu$ fortschreitet. Man kann nämlich der obigen Gleichung folgende Gestalt geben

$$\frac{d l \Gamma(1+\mu)}{d\mu}$$

$$= -C + \frac{1}{1} \cdot \frac{\frac{\mu}{1}}{1+\frac{\mu}{1}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{\mu}{2}}{1+\frac{\mu}{2}} + \frac{1}{3} \cdot \frac{\frac{\mu}{3}}{1+\frac{\mu}{3}} + \ldots.$$

Digitized by Google

und nun jedes einzelne Glied nach dem Satze

$$\frac{u}{1+u} = u - u^2 + u^3 - u^4 + \ldots \text{ in inf.}, \quad +1 > u > -1,$$

in eine unendliche Reihe verwandeln, sobald die Bedingungen

$$1 > \frac{\mu}{1} > -1, \quad 1 > \frac{\mu}{2} > -1, \quad 1 > \frac{\mu}{3} > -1, \ldots.$$

erfüllt sind, welche sich sämmtlich auf die erste reduziren. Man hat demnach für $1 > \mu > -1$,

$$\begin{aligned} &\frac{dl\Gamma(1+\mu)}{d\mu} \\ &= -C + \frac{1}{1}\left[\frac{\mu}{1} - \left(\frac{\mu}{1}\right)^2 + \left(\frac{\mu}{1}\right)^3 - \left(\frac{\mu}{1}\right)^4 + \ldots.\right] \\ &\quad + \frac{1}{2}\left[\frac{\mu}{2} - \left(\frac{\mu}{2}\right)^2 + \left(\frac{\mu}{2}\right)^3 - \left(\frac{\mu}{2}\right)^4 + \ldots.\right] \\ &\quad + \frac{1}{3}\left[\frac{\mu}{3} - \left(\frac{\mu}{3}\right)^2 + \left(\frac{\mu}{3}\right)^3 - \left(\frac{\mu}{3}\right)^4 + \ldots.\right] \\ &\quad + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \end{aligned}$$

Nimmt man diese Reihen in vertikaler Richtung zusammen und bezeichnet zur Abkürzung die Summe der convergenten Reihe

$$\frac{1}{1^n} + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n} + \frac{1}{4^n} + \ldots$$

mit $S_n$ so ergiebt sich:

$$\left.\begin{aligned} \frac{dl\Gamma(1+\mu)}{d\mu} = &-C + S_2\mu - S_3\mu^2 + S_4\mu^3 - \ldots\ldots \\ &+1 > \mu > -1. \end{aligned}\right\} \quad (4)$$

Durch Multiplikation mit $d\mu$ und Integration entspringt hieraus die wichtige Gleichung *):

*) Légendre schlägt gerade den umgekehrten Weg ein; er leitet zuerst die obige Gleichung aus einer Formel ab; die wir in §. 10 kennen lernen werden, und reduzirt darauf die Formel (3).

Digitized by Google

$$l\Gamma(1+\mu) = -C\mu + \tfrac{1}{2}S_2\mu^2 - \tfrac{1}{3}S_3\mu^3 + \tfrac{1}{4}S_4\mu^4 - \ldots\ldots \\ +1 > \mu > -1. \quad (5)$$

Eine Integrationsconstante ist nicht beizufügen, weil für $\mu = 0$, $l\Gamma(1) = l1 = 0$ wird und die rechte Seite sich gleichzeitig annullirt. Für negative $\mu$ hat man noch

$$l\Gamma(1-\mu) = C\mu + \tfrac{1}{2}S_2\mu^2 + \tfrac{1}{3}S_3\mu^3 + \tfrac{1}{4}S_4\mu^4 + \ldots. \\ +1 > \mu > -1. \quad (6)$$

Wüsste man den Werth der Constanten $C$ nicht, so könnte man ihn aus diesen Gleichungen selbst finden, indem man $\mu$ nur so zu wählen braucht, dass man entweder $\Gamma(1+\mu)$ oder $\Gamma(1-\mu)$ anderweit kennt. Diess ist der Fall für $\mu = \frac{1}{2}$; woraus sich ergiebt

$$\tfrac{1}{2}C = -l(\tfrac{1}{2}\sqrt{\pi}) + \tfrac{1}{2}(\tfrac{1}{2})^2 S_2 - \tfrac{1}{3}(\tfrac{1}{2})^3 S_3 + \tfrac{1}{4}(\tfrac{1}{2})^4 S_4 - \ldots.$$

und

$$\tfrac{1}{2}C = l(\sqrt{\pi}) - \tfrac{1}{2}(\tfrac{1}{2})^2 S_2 - \tfrac{1}{3}(\tfrac{1}{2})^3 S_3 - \tfrac{1}{4}(\tfrac{1}{2})^4 S_4 - \ldots.$$

Addirt man die Gleichungen (5) und (6) und bemerkt, dass auf der linken Seite

$$l\Gamma(1+\mu) + l\Gamma(1-\mu) = l\big[\Gamma(1+\mu)\,\Gamma(1-\mu)\big] = l\big[\mu\,\Gamma(\mu)\,\Gamma(1-\mu)\big] \\ = l\frac{\mu\pi}{\sin\mu\pi}$$

ist, so findet man

$$\tfrac{1}{2}l\frac{\mu\pi}{\sin\mu\pi} = \tfrac{1}{2}S_2\mu^2 + \tfrac{1}{4}S_4\mu^4 + \tfrac{1}{6}S_6\mu^6 + \ldots.$$

ein schon anderweit bekanntes Resultat, durch dessen Substitution sich die Gleichungen (5) und (6) vereinfachen und in die folgenden zur numerischen Berechnung vortheilhafteren übergehen:

$$l\Gamma(1+\mu) = \tfrac{1}{2}l\frac{\mu\pi}{\sin\mu\pi} - C\mu - \tfrac{1}{3}S_3\mu^3 - \tfrac{1}{5}S_5\mu^5 - \tfrac{1}{7}S_7\mu^7 - \ldots. \quad (7)$$

$$l\Gamma(1-\mu) = \tfrac{1}{2}l\frac{\mu\pi}{\sin\mu\pi} + C\mu + \tfrac{1}{3}S_3\mu^3 + \tfrac{1}{5}S_5\mu^5 + \tfrac{1}{7}S_7\mu^7 + \ldots. \quad (8)$$

wobei immer $1 > \mu > -1$ sein muss.

Digitized by Google

Diese Relationen reichen zur Berechnung einer Tafel der Gammafunktionen völlig aus, da eine solche nach der in §. 1 gemachten Bemerkung nur das Intervall $\mu = 0$ bis $\mu = 1$ zu umfassen braucht.

## §. 9.

Die Formel (3) kann auch dazu dienen, die Funktion $\Gamma(1+\mu)$ in ein unendliches Produkt zu verwandeln. Multiplizirt man nämlich dieselbe mit $d\mu$ und integrirt unter der Bemerkung, dass

$$\frac{1}{n}\int\frac{\mu\,d\mu}{n+\mu} = \frac{1}{n}\mu - l(1+\frac{1}{n}\mu) + \textit{Const.}$$

$$= l\Big(\frac{e^{\frac{1}{n}\mu}}{1+\frac{1}{n}\mu}\Big) + \textit{Const.}$$

ist, so erhält man leicht

$$l\Gamma(1+\mu)$$

$$= -C\mu + l\Big(\frac{e^{\mu}}{1+\mu}\Big) + l\Big(\frac{e^{\frac{1}{2}\mu}}{1+\frac{1}{2}\mu}\Big) + l\Big(\frac{e^{\frac{1}{3}\mu}}{1+\frac{1}{3}\mu}\Big) + \ldots + \textit{Const.}$$

Die Constante bestimmt sich durch den speziellen Fall $\mu = 0$, für welchen sich Alles annullirt, so dass folgt $\textit{Const.} = 0$.

Schreibt man noch $l(e^{-C\mu})$ für $-C\mu$ und geht nun von den Logarithmen zu den Zahlen selbst über, so ergiebt sich:

$$e^{C\mu}\Gamma(1+\mu) = \frac{e^{\mu}}{1+\mu}\cdot\frac{e^{\frac{1}{2}\mu}}{1+\frac{1}{2}\mu}\cdot\frac{e^{\frac{1}{3}\mu}}{1+\frac{1}{3}\mu}\cdot\frac{e^{\frac{1}{4}\mu}}{1+\frac{1}{4}\mu}\cdots\cdots \qquad (1)$$

wobei $C$ wie bisher den Werth 0,5772156.. hat. Man könnte diesen selbst aus der vorstehenden Gleichung finden; denn es wird für $\mu = 1$

$$e^{C} = \frac{1.e}{2}\cdot\frac{2e^{\frac{1}{2}}}{3}\cdot\frac{3e^{\frac{1}{3}}}{4}\cdot\frac{4e^{\frac{1}{4}}}{5}\cdots\cdots \qquad (2)$$

oder

$$C = l(\tfrac{1}{2}e) + l(\tfrac{2}{3}e^{\frac{1}{2}}) + l(\tfrac{3}{4}e^{\frac{1}{3}}) + \ldots\ldots \qquad (3)$$

Digitized by Google

In dieser Form ist die Reihe wegen ihrer geringen Convergenz zur praktischen Berechnung von $C$ untauglich; durch eine kleine Umwandlung erhält man aus ihr eine andere Relation, welche viel brauchbarer ist und besonders durch ihre Form interessirt. Sehen wir nämlich die unendliche Reihe (3) als die Gränze der $n$gliederigen:

$$l(\tfrac{1}{2}e) + l(\tfrac{2}{3}e^{\frac{1}{2}}) + l(\tfrac{3}{4}e^{\frac{1}{3}}) + \ldots + l\left(\frac{n}{n+1}e^{\frac{1}{n}}\right)$$

an, indem wir hier $n$ ins Unendliche wachsen lassen, so ist

$$C = Lim. \left\{ \begin{array}{l} le + l(e^{\frac{1}{2}}) + l(e^{\frac{1}{3}}) + \ldots + l(e^{\frac{1}{n}}) \\ + l(\tfrac{1}{2}) + l(\tfrac{2}{3}) + l(\tfrac{3}{4}) + \ldots + l\left(\frac{n}{n+1}\right) \end{array} \right\}$$

$$= Lim. \left\{ \begin{array}{l} 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots\ldots + \frac{1}{n} \\ + l\,\tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{2}{3}\cdot\tfrac{3}{4}\ldots\ldots\frac{n}{n+1}) \end{array} \right\}$$

d. i.

$$C = Lim. \left\{1 + \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{n} - l(n+1)\right\}. \qquad (4)$$

Diese merkwürdige Eigenschaft der Constante $C$ wird in der Theorie des Integrallogarithmus ebenfalls abgeleitet; man hätte daher auch aus ihr die Identität unserer Constante mit der des Integrallogarithmus beweisen können.

Erhebt man noch beide Seiten der Gleichung (2) auf den Exponenten $\mu$, so wird

$$e^{C\mu} = \frac{1^{\mu}e^{\mu}}{2^{\mu}} \cdot \frac{2^{\mu}e^{\frac{1}{2}\mu}}{3^{\mu}} \cdot \frac{3^{\mu}e^{\frac{1}{3}\mu}}{4^{\mu}} \cdot \frac{4^{\mu}e^{\frac{1}{4}\mu}}{5^{\mu}} \cdot \ldots$$

und wenn man mit dieser Gleichung in (1) dividirt, so ergiebt sich

$$\Gamma(1+\mu) = \frac{2^{\mu}}{1^{\mu}(1+\mu)} \cdot \frac{3^{\mu}}{2^{\mu}(1+\frac{1}{2}\mu)} \cdot \frac{4^{\mu}}{3^{\mu}(1+\frac{1}{3}\mu)} \cdot \ldots\ldots$$

Digitized by Google

oder

$$\Gamma(1+\mu)=\frac{2^{\mu}}{1^{\mu-1}(1+\mu)}\cdot\frac{3^{\mu}}{2^{\mu-1}(2+\mu)}\cdot\frac{4^{\mu}}{3^{\mu-1}(3+\mu)}\cdot\cdots\cdots \tag{5}$$

ein seinem Bildungsgesetz nach merkwürdiges Produkt für die Gammafunktion.

Betrachtet man dasselbe als den Gränzwerth, welchem sich das endliche aus $(n-1)$Faktoren bestehende Produkt:

$$\frac{2^{\mu}}{1^{\mu-1}(1+\mu)}\cdot\frac{3^{\mu}}{2^{\mu-1}(2+\mu)}\cdot\frac{4^{\mu}}{3^{\mu-1}(3+\mu)}\cdot\frac{n^{\mu}}{(n-1)^{\mu-1}(n-1+\mu)}$$

$$=\frac{2.3.4\ldots(n-1).n^{\mu}}{(\mu+1)(\mu+2)(\mu+3)\ldots(\mu+n-1)}$$

für unendlich wachsende $n$ nähert, so ist

$$\Gamma(\mu+1)=Lim.\left\{\frac{1.2.3.4\ldots(n-1)}{(\mu+1)(\mu+2)\ldots(\mu+n-1)}n^{\mu}\right\}$$

oder wegen $\Gamma(\mu+1)=\mu\,\Gamma(\mu)$

$$\Gamma(\mu)=Lim.\left\{\frac{1.2.3\ldots\ldots n}{\mu(\mu+1)(\mu+2)\ldots(\mu+n-1)}n^{\mu-1}\right\} \tag{6}$$

Diese Formel liesse sich auch als Definition der Funktion $\Gamma$ benutzen und man würde daraus leicht die hauptsächlichsten ihrer Eigenschaften ableiten können, wie diess namentlich Gauss in sehr eleganter Weise gethan hat*). Will man eine blos elementare Theorie der Gammafunktion geben, so ist dieser Gedankengang sehr natürlich, er ist es aber nicht mehr, wenn es darauf ankommt, die Bedeutung hervorzuheben, welche unsere Funktion für die Integralrechnung hat.

---

*) Die betreffende, mit Recht berühmte, Abhandlung steht in den *Comment. Gotting. rec. tom. II a.* 1812. Die Bezeichnungsweise ist daselbst etwas verschieden, nämlich das obige $\Gamma(\mu)=\Pi(\mu-1)$ oder das Gaussische $\Pi(\mu)$ = dem Légendre'schen $\Gamma(\mu+1)$.

Digitized by Google

## §. 10.

Auch eine Näherungsformel für $\Gamma(\mu)$ lässt sich aus der Gleichung

$$\frac{d\,l\Gamma(1+\mu)}{d\mu} = \int_0^\infty \frac{dt}{t} e^{-t} - \int_0^\infty \frac{dt}{t(1+t)^{\mu+1}} \qquad (1)$$

ableiten, wenn man mit derselben einige Transformationen vornimmt. Schreibt man nämlich im ersten Integrale rechts $\omega$ für $t$ und setzt im zweiten *)

$$t = e^\omega - 1, \text{ also } \omega = l(1+t)$$

---

*) Im Allgemeinen ist es bekanntlich nicht erlaubt in zwei Integralen, von denen jedes für sich unendlich wird, deren Differenz aber eine endliche Grösse ist, zwei verschiedene Substitutionen zu machen; so wäre es z. B. falsch in dem ersten der nachstehenden Integrale

$$\int_0^1 \frac{dz}{1-z} - \int_0^1 \frac{nz^{n-1}dz}{1-z^n} = ln$$

$z = x$ und im zweiten $z^n = x$ zu setzen, denn man käme damit auf das falsche Resultat:

$$ln = \int_0^1 \frac{dx}{1-x} - \int_0^1 \frac{dx}{1-x} = 0\,.$$

Dass aber in dem obigen Falle die dort angegebenen Substitutionen erlaubt sind, lässt sich so zeigen. Es ist erstlich

$$\frac{d\,l\Gamma(1+\mu)}{d\mu} = \int_0^\infty \left\{ \frac{1}{t} e^{-t} - \frac{1}{(1+t)^2\, l(1+t)} \right\} dt$$

$$+ \int_0^\infty \left\{ \frac{1}{(1+t)^2\, l(1+t)} - \frac{1}{t(1+t)^{\mu+1}} \right\} dt$$

indem sich der zweite Theil der ersten Zeile gegen den ersten Theil der zweiten hebt. Jedes Integral für sich ist eine endliche Grösse und wir dürfen daher im zweiten eine Substitution machen, ohne es im ersten zu thun; setzen wir nämlich $t = e^\omega - 1$ so wird jetzt:

Digitized by Google

so geht dasselbe über in

$$\int \frac{e^{\omega} d\omega}{(e^{\omega}-1)\, e^{(\mu+1)\omega}} = \int \frac{d\omega}{e^{\omega}-1}\, e^{-\mu\omega}$$

und die Gränzen für $\omega$ sind $\omega = 0$ und $\omega = \infty$, weil $l(1+t)$ für $t = 0$ und $t = \infty$ die Werthe 0 und $\infty$ annimmt. Es ist demnach

$$\frac{d\,l\Gamma(1+\mu)}{d\mu} = \int_0^{\infty} \left\{ \frac{1}{\omega} e^{-\omega} - \frac{1}{e^{\omega}-1} e^{-\mu\omega} \right\} d\omega . \qquad (2)$$

---

$$\frac{d\,l\Gamma(1+\mu)}{d\mu} = \int_0^{\infty} \left\{ \frac{1}{t} e^{-t} - \frac{1}{(1+t)^2\, l(1+t)} \right\} dt$$

$$+ \int_0^{\infty} \left\{ \frac{1}{\omega} e^{-\omega} - \frac{1}{e^{\omega}-1} e^{-\mu\omega} \right\} d\omega .$$

Vergleichen wir diess mit Nr. (2), so muss, wenn die im Texte stehende Rechnung richtig sein soll,

$$\int_0^{\infty} \left\{ \frac{1}{t} e^{-t} - \frac{1}{(1+t)^2\, l(1+t)} \right\} dt = 0$$

sein. Betrachten wir nun das Integral

$$\int_x^{\infty} \left\{ \frac{1}{t} e^{-t} - \frac{1}{(1+t)^2\, l(1+t)} \right\} dt$$

$$= \int_x^{\infty} \frac{1}{t} e^{-t}\, dt - \int_x^{\infty} \frac{dt}{(1+t)^2\, l(1+t)}$$

so ist klar, dass jedes der einzelnen Integrale für $x > 0$ endlich bleibt und daher sind hier verschiedene Substitutionen erlaubt, nämlich im ersten $t = u$ im zweiten $t = e^{u} - 1$; diess giebt

$$\int_x^{\infty} \frac{du}{u} e^{-u} - \int_{l(1+x)}^{\infty} \frac{du}{u} e^{-u} = \int_x^{l(1+x)} \frac{du}{u} e^{-u} .$$



Digitized by Google

Andererseits haben wir aber nach einer bekannten Formel *)

$$-\frac{1}{e^{\omega}-1}=-\frac{1}{\omega}+\frac{1}{2}-\frac{2\omega}{(2\pi)^2+\omega^2}$$

$$-\frac{2\omega}{(4\pi)^2+\omega^2}-\frac{2\omega}{(6\pi)^2+\omega^2}-\cdots.$$

wobei die Reihe der Funktion auf der linken Seite für alle Werthe von $\omega=0$ bis $\omega=\infty$ gleichgilt. Durch Substitution derselben ergiebt sich aus Nr. (2)

$$\frac{dl\Gamma(1+\mu)}{d\mu}=\int_0^{\infty}\left\{\frac{1}{\omega}e^{-\omega}-\frac{1}{\omega}e^{-\omega\mu}\right\}d\omega+\frac{1}{2}\int_0^{\infty}e^{-\mu\omega}d\omega$$

$$-2\int_0^{\infty}\left\{\frac{\omega}{(2\pi)^2+\omega^2}+\frac{\omega}{(4\pi)^2+\omega^2}+\cdots.\right\}e^{-\mu\omega}d\omega$$

---

Der absolute Werth des Integrales rechts liegt aber, wie man leicht sieht, zwischen

$$\frac{1}{l(1+\varkappa)}\left\{\varkappa-l(1+\varkappa)\right\}\quad\text{und}\quad\frac{1}{\varkappa}\left\{\varkappa-l(1+\varkappa)\right\}$$

und dasselbe gilt von dem Integrale ⊙. Lassen wir $\varkappa$ gegen die Null convergiren, so nähern sich die vorstehenden Grössen der gemeinschaftlichen Gränze Null und wir kommen somit auf die Gleichung ☽ zurück, woraus andererseits die Richtigkeit des in Nr. (2) entwickelten Resultates erhellt.

*) Nimmt man in der Gleichung

$$\tfrac{1}{2}cot\tfrac{1}{2}z=\frac{1}{z}-\frac{2z}{(2\pi)^2-z^2}-\frac{2z}{(4\pi)^2-z^2}-\cdots$$

$z=\omega\sqrt{-1}$, so findet man sehr leicht

$$\frac{1}{2}\frac{e^{\frac{1}{2}\omega}+e^{-\frac{1}{2}\omega}}{e^{\frac{1}{2}\omega}-e^{-\frac{1}{2}\omega}}=\frac{1}{\omega}+\frac{2\omega}{(2\pi)^2+\omega^2}+\frac{2\omega}{(4\pi)^2+\omega^2}+\cdots.$$

und hier führt die einfache Bemerkung, dass die linke Seite

$$=\frac{1}{2}\frac{e^{\omega}+1}{e^{\omega}-1}=\frac{1}{e^{\omega}-1}+\frac{1}{2}$$

ist, unmittelbar zur obenbenutzten Formel.

Digitized by Google

wo man die Werthe der beiden ersten Integrale leicht angeben kann, wenn man unter Andern die Formel (3) in §. 6 für $x = \mu$, $t = \omega$ in Anwendung bringt. Es wird so:

$$\frac{d\,l\Gamma(1+\mu)}{d\mu} = l\mu + \frac{1}{2\mu} - 2\int_0^\infty \left\{\frac{1}{(2\pi)^2+\omega^2} + \frac{1}{(4\pi)^2+\omega^2} + \ldots\right\} \omega e^{-\mu\omega} d\omega.$$

Multiplizirt man diese Gleichung mit $d\mu$ und integrirt hierauf zwischen den Gränzen $\mu = \mu$ und $\mu = n$, so gelangt man unter Berücksichtigung, dass

$$-\int \omega e^{-\mu\omega} d\mu = e^{-\mu\omega}$$

ist, leicht zu der Gleichung:

$$l\Gamma(1+\mu) - l\Gamma(1+n) = (\mu+\tfrac{1}{2})\,l\mu - \mu - \left[(n+\tfrac{1}{2})\,ln - n\right] + 2\int_0^\infty \left\{\frac{1}{(2\pi)^2+\omega^2} + \frac{1}{(4\pi)^2+\omega^2} + \ldots\right\} \left(e^{-\mu\omega} - e^{-n\omega}\right) d\omega.$$

Setzen wir zur Abkürzung

$$2\int_0^\infty \left\{\frac{1}{(2\pi)^2+\omega^2} + \frac{1}{(4\pi)^2+\omega^2} + \ldots\right\} e^{-\alpha\omega} d\omega = f(\alpha) \qquad (3)$$

so nimmt die vorige Gleichung die folgende Form an:

$$l\Gamma(1+\mu) = l\Gamma(1+n) + (\mu+\tfrac{1}{2})\,l\mu - \mu - \left[(n+\tfrac{1}{2})\,ln - n\right] + f(\mu) - f(n)$$

oder

$$\left.\begin{aligned} l\Gamma(1+\mu) = {} & (\mu+\tfrac{1}{2})\,l\mu - \mu + f(\mu) \\ & + l\Gamma(1+n) - (n+\tfrac{1}{2})\,ln + n - f(n). \end{aligned}\right\} \qquad (4)$$

Die Natur der hier vorkommenden Funktion $f$ ist nun zwar unbekannt, weil sich die in Nr. (3) vorkommende Integration durch die gewöhnlichen Mittel nicht bewerkstelligen lässt, man kann aber eine Eigenschaft derselben angeben, welche für unsere weitere Betrachtung von grossem Nutzen ist. Da nämlich für ein gerades $r$ der Ausdruck

Digitized by Google

$\frac{1}{(r\pi)^2+\omega^2}$ (das allgemeine Glied der in Nr. (3) vorkommenden Reihe) zwischen 0 und $\frac{1}{(r\pi)^2}$ liegt, so folgt, dass $f(\alpha)$ zwischen den Grössen

$$0 \text{ und } 2\int_0^\infty \left\{\frac{1}{(2\pi)^2}+\frac{1}{(4\pi)^2}+\ldots.\right\} e^{-\alpha\omega}d\omega$$

enthalten ist, woraus man durch Summirung der hier vorkommenden rein numerischen Reihe leicht

$$0 < f(\alpha) < \frac{1}{12}\int_0^\infty e^{-\alpha\omega}d\omega$$

d. i.

$$0 < f(\alpha) < \frac{1}{12\alpha}$$

findet. Aus dieser Bemerkung ergiebt sich sogleich, dass für unbegränzt wachsende $\alpha$

$$Lim.\, f(\alpha) = 0 \tag{5}$$

ist. Lassen wir jetzt in der Gleichung (4) $n$ unbegränzt wachsen, und benutzen sogleich das vorstehende Resultat, so wird

$$l\Gamma(1+\mu) = (\mu+\tfrac{1}{2})l\mu - \mu + f(\mu) + Lim.\left\{l\Gamma(1+n) - (n+\tfrac{1}{2})ln + n\right\}$$

und da für irgend ein endliches bestimmtes $\mu$ alle davon abhängigen Grössen endlich sind, so folgt, dass

$$Lim.\left\{l\Gamma(1+n) - (n+\tfrac{1}{2})ln + n\right\}$$

eine bestimmte endliche Grösse, also eine gewisse Constante sein müsse, welche wir vor der Hand mit $lk$ bezeichnen wollen. Es ist demnach

$$l\Gamma(1+\mu) = (\mu+\tfrac{1}{2})l\mu - \mu + f(\mu) + lk \tag{6}$$

und hier giebt der Uebergang von den Logarithmen zu den Zahlen

$$\Gamma(1+\mu) = k\frac{\mu^{\mu+\frac{1}{2}}}{e^\mu}e^{f(\mu)} = k\sqrt{\mu}\left(\frac{\mu}{e}\right)^\mu e^{f(\mu)}$$

Digitized by Google

oder weil $\Gamma(1+\mu)=\mu\,\Gamma(\mu)$ ist

$$\Gamma(\mu) = \frac{k}{\sqrt{\mu}}\left(\frac{\mu}{e}\right)^{\mu} e^{f(\mu)}. \tag{7}$$

Die Constante $k$ bestimmt sich hier auf folgende Weise:

Das Légendre'sche Theorem [Formel (3) in §. 7] giebt für $n=2$

$$\Gamma(\mu)\,\Gamma(\mu+\tfrac{1}{2}) = \frac{\sqrt{2}}{2^{2\mu}}\sqrt{2\pi}\;\Gamma(2\mu)$$

und folglich muss nach dem Vorigen

$$\frac{k}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{\mu}{e}\right)^{\mu} e^{f(\mu)} \cdot \frac{k}{\sqrt{\mu+\frac{1}{2}}}\left(\frac{\mu+\frac{1}{2}}{e}\right)^{\mu+\frac{1}{2}} e^{f(\mu+\frac{1}{2})}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2^{2\mu}}\sqrt{2\pi}\cdot\frac{k}{\sqrt{2\mu}}\left(\frac{2\mu}{e}\right)^{2\mu} e^{f(2\mu)}$$

sein. Hebt man hier so weit als möglich, so bleibt

$$k\,e^{f(\mu)}\cdot\frac{(\mu+\frac{1}{2})^{\mu}}{\sqrt{e}}\,e^{f(\mu+\frac{1}{2})} = \sqrt{2\pi}\,\mu^{\mu}\,e^{f(2\mu)}$$

woraus

$$k = \sqrt{2\pi}\,\sqrt{e}\,\left(\frac{\mu}{\mu+\frac{1}{2}}\right)^{\mu} e^{f(2\mu)-f(\mu+\frac{1}{2})-f(\mu)}$$

folgt. Da diese Gleichung für jedes $\mu$ bestehen muss, so können wir auch $\mu$ ins Unendliche wachsen lassen und den Gränzwerth des Ausdruckes rechts suchen. Dabei ist

$$Lim.\;\left(\frac{\mu}{\mu+\frac{1}{2}}\right)^{\mu} = Lim.\,\frac{1}{\left(1+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\mu}\right)^{\mu}} = \frac{1}{e^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

$$Lim.\,f(2\mu) = Lim.\,f(\mu+\tfrac{1}{2}) = Lim.\,f(\mu) = 0$$

mithin:

$$k = \sqrt{2\pi} \tag{8}$$

Digitized by Google

und demnach geht die Formel (7) in die folgende über

$$\Gamma(\mu) = \sqrt{\frac{2\pi}{\mu}} \left(\frac{\mu}{e}\right)^{\mu} e^{f(\mu)}. \tag{9}$$

Man kann dieselbe als eine Näherungsformel betrachten, wenn man berücksichtigt, dass für sehr grosse $\mu$ die Funktion $f(\mu)$ sehr klein, folglich $e^{f(\mu)}$ nur wenig von der Einheit verschieden ist; es lässt sich daher die obige Formel auch in der Gestalt

$$\Gamma(\mu) = \sqrt{\frac{2\pi}{\mu}} \left(\frac{\mu}{e}\right)^{\mu} (1+\nu) \tag{10}$$

darstellen, wenn man unter $\nu$ eine Grösse versteht, welche bei unendlich wachsenden $\mu$ bis zur Gränze Null abnimmt *).

Die so eben entwickelte Formel giebt zugleich ein sehr einfaches Mittel an die Hand um auch genäherte Ausdrücke für die Fakultäten

$$\mu(\mu+1)\ldots(\mu+n-1) = \frac{\Gamma(\mu+n)}{\Gamma(\mu)}$$

$$1.2\ldots.n \quad = \Gamma(n+1)$$

aufzustellen, durch deren Division man eine Näherungsformel für den Binomialkoeffizienten

$$\frac{(\mu+n-1)(\mu+n-2)\ldots(\mu+n-1-n+1)}{1.2.3\ldots n} = (\mu+n-1)_n$$

---

*) Diese Formel beweist man gewöhnlich dadurch, dass man erst für ganze positive $\mu$

$$l\Gamma(1+\mu) = l1 + l2 + \ldots + l\mu$$

setzt, nach einer Summenformel für

$$f(1) + f(2) + f(3) + \ldots + f(\mu)$$

die rechte Seite in eine unendliche Reihe verwandelt und dann zu den Zahlen zurückgeht. Diese Ableitung hat aber zwei schwache Seiten; einmal passt der Beweis blos auf positive ganze $\mu$ und lässt sich nur durch ein sehr ungenügendes Räsonnement auf andere $\mu$ ausdehnen; andererseits ist die sogenannte allgemeine Summenformel nichts weniger als allgemein und giebt nur dann unzweifelhafte Resultate, wenn u. A. $f(x)$ sich für alle innerhalb des Intervalles $x=0$ bis $x=\mu$ liegende Werthe von $x$ in eine Reihe von der Form $A+Bx+x^2+$ etc. verwandeln lässt, was aber beim Logarithmus gar nicht der Fall ist.

Digitized by Google

erhält, in welcher man nachher für $\mu+n-1$ irgend einen einfachen Buchstaben setzen kann. Diese Ausdrücke sind namentlich für die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten bei oft wiederholten Versuchen von Wichtigkeit *).

## §. 11.

Wir haben bisher nur Gammafunktionen mit positiver Veränderlichen (Argument) betrachtet und für diese alle wünschenswerthen Relationen entwickelt; es liegt uns nun noch ob, die Werthe der Gammafunktionen mit negativen Argumenten, also das Integral

$$\Gamma(-\mu) = \int_0^\infty \frac{dx}{x^{\mu+1}} e^{-x}$$

worin $\mu$ an sich positiv ist, zu betrachten.

Es hat keine Schwierigkeit, Integrale dieser Art, auf Gammafunktionen mit positiven Veränderlichen zu reduziren, aber diese Reduktion zeigt zugleich, dass die Werthe derselben sämmtlich unendlich sind. Vermöge der bekannten Reduktionsformel

$$\int uvdx = u\int vdx - \int du \int vdx$$

ist nämlich für $u = e^{-x}$, $v = x^{-\mu-1}$,

$$\int \frac{dx}{x^{\mu+1}} e^{-x} = e^{-x}\int \frac{dx}{x^{\mu+1}} + \int e^{-x}dx \int \frac{dx}{x^{\mu+1}}$$

$$= -\frac{e^{-x}}{\mu x^{\mu}} - \frac{1}{\mu}\int \frac{dx}{x^{\mu}} e^{-x}.$$

*) Man vergleiche hiermit das dritte Capitel von Laplace, *théorie analytique des probabilités*, 3me *édition*, *page* 126, wo dieser Gegenstand sehr ausführlich behandelt ist.

Digitized by Google

Auf gleiche Weise hat man $\mu - 1$ für $\mu$ gesetzt

$$\int \frac{dx}{x^{\mu}} e^{-x} = -\frac{e^{-x}}{(\mu-1)x^{\mu-1}} - \frac{1}{\mu-1}\int \frac{dx}{x^{\mu-1}} e^{-x}$$

ferner

$$\int \frac{dx}{x^{\mu-1}} e^{-x} = -\frac{e^{-x}}{(\mu-2)x^{\mu-2}} - \frac{1}{\mu-2}\int \frac{dx}{x^{\mu-2}} e^{-x}$$

u. s. w. Fährt man so fort bis zu einer beliebigen ganzen Zahl $n$ und substituirt jede Gleichung in die vorhergehende, so erhält man leicht

$$\int \frac{dx}{x^{\mu+1}} e^{-x}$$

$$= -\frac{e^{-x}}{\mu x^{\mu}} + \frac{e^{-x}}{\mu(\mu-1)x^{\mu-1}} - \ldots\ldots + \frac{(-1)^{n+1} e^{-x}}{\mu(\mu-1)\ldots(\mu-n)x^{\mu-n}}$$

$$+ \frac{(-1)^{n+1}}{\mu(\mu-1)\ldots(\mu-n)} \int \frac{dx}{x^{\mu-n}} e^{-x}$$

oder

$$\int \frac{dx}{x^{\mu+1}} e^{-x}$$

$$= -\left\{\frac{1}{\mu} - \frac{x}{\mu(\mu-1)} + \frac{x^2}{\mu(\mu-1)(\mu-2)} - \ldots\right.$$

$$\left. \ldots + \frac{(-1)^{n+1} x^n}{\mu(\mu-1)\ldots(\mu-n)}\right\} \frac{e^{-x}}{x^{\mu}}$$

$$+ \frac{(-1)^{n+1}}{\mu(\mu-1)\ldots(\mu-n)} \int x^{n-\mu} e^{-x} dx .$$

Da nun $n$ beliebig ist, so können wir dasselbe $> \mu$ nehmen, so dass das Integral auf der rechten Seite nach Einführung der Gränzen $x = 0$, $x = \infty$ in eine Gammafunktion mit positiven Argument nämlich

Digitized by Google

in $\Gamma(n-\mu+1)$ übergeht. Setzen wir auch im Uebrigen $x=\infty$ und $x=0$, so haben wir vermöge der Bemerkung, dass für jedes positive oder negative $p$, $Lim.\ x^p e^{-x} = 0$ ist,

$$\int_0^\infty \frac{dx}{x^{\mu+1}} e^{-x} = \frac{(-1)^{n+1}}{\mu(\mu-1)\ldots(\mu-n)} \int_0^\infty x^{n-\mu} e^{-x} dx$$

dagegen für $x=0$,

$$\int_0 \frac{dx}{x^{\mu+1}} e^{-x} = -\frac{1}{\mu}\cdot\frac{1}{0} + \frac{(-1)^{n+1}}{\mu(\mu-1)\ldots(\mu-n)} \int_0 x^{n-\mu} e^{-x} dx$$

mithin durch Subtraktion der unteren Gleichung von der oberen

$$\int_0^\infty \frac{dx}{x^{\mu+1}} e^{-x} = \frac{1}{\mu}\cdot\frac{1}{0} + \frac{(-1)^{n+1}}{\mu(\mu-1)\ldots(\mu-n)} \int_0^\infty x^{n-\mu} e^{-x} dx$$

oder

$$\Gamma(-\mu) = \frac{1}{\mu}\infty + \frac{(-1)^{n+1}}{\mu(\mu-1)\ldots(\mu-n)} \Gamma(n-\mu+1).$$

Da nun wegen $n > \mu$ die Funktion $\Gamma(n-\mu+1)$ immer eine endliche bestimmte Grösse ist, so folgt, dass für jedes $\mu$, es mag eine ganze Zahl sein oder nicht, $\Gamma(-\mu)$ unendlich ist.

Man kann diess auch noch auf andere Weise einsehen, nämlich für jedes $\mu$

$$\Gamma(\mu)\,\Gamma(1-\mu) = \int_0^\infty \frac{x^{\mu-1} dx}{1+x}$$

hie[illegible] an die Stelle [illegible]

[illegible] $\Gamma(-\mu) =$ [illegible] (2)

[illegible]weiten dieser Formel [illegible] einzelnen so entstehenden

Das erste dieser Integrale hat nun, weil $\mu$ positiv ist, immer einen endlichen Werth, wovon man sich leicht durch Verwandlung desselben in eine Reihe überzeugen kann; in dem zweiten dagegen durchläuft $x$ das Intervall $x=1$ bis $x=\infty$, folglich ist, was auch sonst das positive $\mu$ sein möge, immer $x^\mu > 1$, und

$$\frac{x^\mu}{1+x} > \frac{1}{1+x}$$

oder die erste Funktion wächst während des Intervalles 1 bis $\infty$ rascher als die zweite. Nun ist aber schon

$$\int_1^\infty \frac{dx}{1+x} = l(1+\infty) - l2 = \infty$$

folglich um so mehr

$$\int_1^\infty \frac{x^\mu dx}{1+x} = \infty .$$

Daraus ergiebt sich $\Gamma(1+\mu)\,\Gamma(-\mu) = \infty$, und da hier $\Gamma(1+\mu)$ wegen des positiven $\mu$ immer endlich ist, so muss $\Gamma(-\mu) = \infty$ sein *).

---

*) Légendre glaubt blos für ganze $\mu$ sei $\Gamma(-\mu) = \infty$, und will diess aus der Formel (6) in Cap. I. folgern, indem er $\mu$ negativ nimmt und daraus die Gleichung

$$\Gamma(-\mu) = \frac{\Gamma(n-\mu)}{(-\mu)(-\mu+1)\ldots(-\mu+n-1)}$$

ableitet, in welcher er $n > \mu$ setzt. Dabei hat aber Légendre übersehen, dass die angewendete Formel eine Folgerung von der Relation $\Gamma(\mu+1) = \mu\,\Gamma(\mu)$ ist, welche nicht mehr gilt, sobald $\mu$ negativ genommen wird, wie man augenblicklich bemerkt, wenn man den Beweis derselben in §. 1 für negative $\mu$ umgestalten wollte.

Digitized by Google

## Cap. IV.

## *Die wichtigsten unter den durch Gammafunktionen ausdrückbaren Integralen.*

### §. 12.

Unter den verschiedenen Werthen einer Gammafunktion ist besonders derjenige von Interesse, welcher dem Argument $\frac{1}{2}$ entspricht, weil diess der einzige Fall ist, in welchem sich für ein gebrochenes $\mu$ die Werthe von $\Gamma(\mu)$ und $\Gamma(n+\mu)$ durch die gewöhnlichen Hülfsmittel der Analysis angeben lassen. Die Integrale

$$\int_0^\infty z^{\frac{1}{2}-1} e^{-rz} dz = \frac{\Gamma(\frac{1}{2})}{\sqrt{r}} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{r}}$$

$$\int_0^\infty z^{n+\frac{1}{2}-1} e^{-rz} dz = \frac{\Gamma(n+\frac{1}{2})}{r^{n+\frac{1}{2}}} = \frac{1.3.5 \ldots\ldots (2n-1)}{(2r)^n} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{r}}$$

welche in diesen Fällen aus der Formel (8) in §. 1 entspringen, verdienen daher besondere Aufmerksamkeit.

Zuerst ist zu bemerken, dass man dieselben in etwas anderer Gestalt aufführen kann, wenn man $r=a^2$, $z=x^2$ setzt, wodurch sich die Gränzen nicht ändern und $dz=2x\,dx$ wird. Die obigen Gleichungen gehen dann nach beiderseitiger Division mit 2 in die folgenden über:

$$\int_0^\infty e^{-a^2x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a} \tag{1}$$

$$\int_0^\infty x^{2n} e^{-a^2x^2} dx = \frac{1.3.5 \ldots\ldots (2n-1)}{2^n a^{2n}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2a} \ldots \tag{2}$$

Es liegt nun der Gedanke sehr nahe, in der zweiten dieser Formel $n$ successive $=1, 2, 3, \ldots$ zu nehmen, die einzelnen so entstehenden

Digitized by Google

Gleichungen mit passenden Coeffizienten zu multipliziren und darauf Alles zu addiren; könnte man dann sowohl die auf der linken, als die auf der rechten Seite entstehende Reihe summiren, so würde man hierdurch zu einem neuen und allgemeineren Integrale gelangen. Diese Idee lässt sich in der That auf folgende spezielle Weise ausführen.

Man multiplizire die Gleichung (2) mit $\frac{(2\beta)^{2n}}{1.2.3 \ldots 2n}$, dann ist

$$\int_0^\infty \frac{(2\beta x)^{2n}}{1.2.3 \ldots (2n)} e^{-a^2x^2} dx = \frac{1.3.5 \ldots (2n-1)}{1.2.3 \ldots (2n)} \cdot \frac{2^n\sqrt{\pi}}{2a} \left(\frac{\beta}{a}\right)^{2n}$$

oder weil

$$1.2.3 \ldots (2n) = 1.3.5 \ldots (2n-1).2.4.6 \ldots (2n)$$
$$= 1.3.5 \ldots (2n-1).1.2.3 \ldots n.2^n$$

ist, auch

$$\int_0^\infty \frac{(2\beta x)^{2n}}{1.2.3 \ldots (2n)} e^{-a^2x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a} \cdot \frac{\left(\frac{\beta}{a}\right)^{2n}}{1.2.3 \ldots n}.$$

Setzt man hierin der Reihe nach $n = 1, 2, 3 \ldots$ *in inf.*, addirt die entstehenden Gleichungen zu Nr. (1) und bemerkt, dass man auf der linken Seite sämmtliche Integrale wegen der gleichen Integrationsgränzen nach dem Satze

$$\int_a^b F(x)\,dx + \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b \varphi(x)\,dx + \int_a^b \psi(x)\,dx + \cdots$$
$$= \int_a^b \{F(x) + f(x) + \varphi(x) + \psi(x) + \ldots\ldots\}\,dx$$

in ein einziges zusammenziehen kann, so erhält man:

$$\left.\begin{aligned} &\int_0^\infty \left[1 + \frac{(2\beta x)^2}{1.2} + \frac{(2\beta x)^4}{1.2.3.4} + \ldots\ldots\right] e^{-a^2x^2} dx \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2a}\left[1 + \frac{\left(\frac{\beta}{a}\right)^2}{1} + \frac{\left(\frac{\beta}{a}\right)^4}{1.2} + \frac{\left(\frac{\beta}{a}\right)^6}{1.2.3} + \ldots\ldots\right]. \end{aligned}\right\} \quad (3)$$

Digitized by Google

Beide Reihen sind aber für alle möglichen $\alpha$, $\beta$ und $x$ convergent und lassen sich nach bekannten Formeln summiren. Es ergiebt sich nämlich

$$\int_0^\infty \frac{e^{2\beta x} + e^{-2\beta x}}{2} e^{-\alpha^2 x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha} e^{\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^2} \tag{4}$$

worin $\alpha$ und $\beta$ alle möglichen Werthe haben können.

Da $\beta^{2n}$ ein willkührlicher Faktor war, so hindert nichts, $\beta$ imaginär zu nehmen, was Dasselbe ist, als wenn man die Gleichung (2) statt mit $\beta^{2n}$ mit $(-1)^n \beta^{2n}$ multiplizirt, folglich den Reihen in (3) wechselnde Zeichen verschafft hätte. Setzen wir also $\beta\sqrt{-1}$ an die Stelle von $\beta$, so geht die ebengefundene Gleichung in die folgende über:

$$\int_0^\infty \cos 2\beta x\, e^{-\alpha^2 x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha} e^{-\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^2} \tag{5}$$

welche u. A. in der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Wärmetheorie vielfach benutzt wird.

Bei der Wichtigkeit des gefundenen Theoremes dürfte es wohl nicht überflüssig sein, noch einen zweiten, auf ganz anderen Prinzipien beruhenden Beweis desselben zu geben. Setzt man

$$\int_0^\infty \cos 2\beta x\, e^{-\alpha^2 x^2} dx = f(\beta) \tag{6}$$

so ist durch partielle Differenziation nach $\beta$

$$\frac{df(\beta)}{d\beta} = -\int_0^\infty 2x \sin 2\beta x\, e^{-\alpha^2 x^2} dx\,. \tag{7}$$

Andererseits hat man nach der Reduktionsformel

$$\int uv dx = u \int v dx - \int du \int v dx$$

für $u = \sin 2\beta x$, $v = 2x\, e^{-\alpha^2 x^2}$,

Digitized by Google

$$\int 2x \sin 2\beta x \, e^{-\alpha^2 x^2} dx$$

$$= \sin 2\beta x \int 2x e^{-\alpha^2 x^2} dx - 2\beta \int \cos 2\beta x \, dx \int 2x e^{-\alpha^2 x^2} dx$$

oder weil aus

$$d\left(e^{-\alpha^2 x^2}\right) = -\alpha^2 e^{-\alpha^2 x^2} 2x \, dx$$

folgt

$$-\frac{e^{-\alpha^2 x^2}}{\alpha^2} = \int 2x e^{-\alpha^2 x^2} dx$$

auch

$$\int 2x \sin 2\beta x e^{-\alpha^2 x^2} dx = -\frac{\sin 2\beta x \, e^{-\alpha^2 x^2}}{\alpha^2} + \frac{2\beta}{\alpha^2} \int \cos 2\beta x e^{-\alpha^2 x^2} dx .$$

Hieraus erhält man für $x = \infty$ und $x = 0$,

$$\int_0^\infty 2x \sin 2\beta x e^{-\alpha^2 x^2} dx = \frac{2\beta}{\alpha^2} \int_0^\infty \cos 2\beta x e^{-\alpha^2 x^2} dx .$$

Die Gleichung (7) nimmt durch Substitution dieses Ausdrucks folgende Gestalt an:

$$\frac{df(\beta)}{d\beta} = -\frac{2\beta}{\alpha^2} \int_0^\infty \cos 2\beta x e^{-\alpha^2 x^2} dx$$

oder nach Formel (6)

$$\frac{df(\beta)}{d\beta} = -\frac{2\beta}{\alpha^2} f(\beta)$$

d. i.

$$\frac{df(\beta)}{f(\beta)} = -\frac{1}{\alpha^2} 2\beta \, d\beta$$

Digitized by Google

oder

$$dlf(\beta) = -\frac{1}{a^2} 2\beta\, d\beta .$$

Daraus folgt durch Integration

$$lf(\beta) = -\frac{\beta^2}{a^2} + Const.$$

mithin

$$f(\beta) = e^{-\left(\frac{\beta}{a}\right)^2 + Const.} = e^{Const.} e^{-\left(\frac{\beta}{a}\right)^2}$$

und wenn wir den ersten Faktor, welcher constant ist, mit $k$ bezeichnen:

$$f(\beta) = k e^{-\left(\frac{\beta}{a}\right)^2} = \int_0^\infty cos\, 2\beta x\, e^{-a^2x^2} dx .$$

Die Constante bestimmt sich dadurch, dass $\beta = 0$ genommen wird, woraus sich ergiebt

$$k = \int_0^\infty e^{-a^2x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a}$$

mithin nach dem Vorigen

$$\int_0^\infty cos\, 2\beta x\, e^{-a^2x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a} e^{-\left(\frac{\beta}{a}\right)^2} \qquad (8)$$

übereinstimmend mit dem unter (5) gefundenen Resultate.

Es lässt sich hieraus noch ein anderes und allgemeineres Integral dadurch ableiten, dass man beiderseits mehrfach, etwa $n$ mal partiell nach $\beta$ differenzirt. Es ist dann

$$\int_0^\infty \frac{d^n cos\, 2\beta x}{d\beta^n} e^{-a^2x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a} \cdot \frac{d^n\left[e^{-\left(\frac{\beta}{a}\right)^2}\right]}{d\beta^n}$$

Digitized by Google

oder wenn man links die Differenziation ausführt

$$\int_0^\infty (2x)^n \cos(\tfrac{1}{2}n\pi + 2\beta x)\, e^{-a^2x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a} \cdot \frac{d^n\left[e^{-\left(\frac{\beta}{a}\right)^2}\right]}{d\beta^n}.$$

Andererseits hat man aber nach einer bekannten Formel *)

$$\frac{d^n e^{ax^2}}{dx^n} =$$

$$\left\{a^n(2x)^n + \frac{n(n-1)}{1} a^{n-1}(2x)^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1.2} a^{n-2}(2x)^{n-4} + \ldots\right\} e^{ax^2}$$

folglich wenn man $x = \beta$, $a = -\frac{1}{\alpha^2}$ setzt

$$\frac{d^n\left[e^{-\left(\frac{\beta}{a}\right)^2}\right]}{d\beta^n} = (-1)^n \left(\frac{2\beta}{\alpha^2}\right)^n \left[1 - \frac{n(n-1)}{1}\left(\frac{a}{2\beta}\right)^2 + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1.2}\left(\frac{a}{2\beta}\right)^4 - \ldots\right] e^{-\left(\frac{\beta}{a}\right)^2}$$

und also nach dem Vorigen

$$\int_0^\infty x^n \cos(\tfrac{1}{2}n\pi + 2\beta x)\, e^{-a^2x^2} dx$$

$$= (-1)^n \frac{\sqrt{\pi}}{2a} \left(\frac{\beta}{\alpha^2}\right)^n \left[1 - \frac{n(n-1)}{1}\left(\frac{a}{2\beta}\right)^2 + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1.2}\left(\frac{a}{2\beta}\right)^4 - \ldots\right] e^{-\left(\frac{\beta}{a}\right)^2}. \quad (9)$$

*) M. s. mein *Handbuch der Differenzial- und Integralrechnung Theil I, S. 89, Formel* (10).

## §. 13.

Mittelst einer Methode, welcher der zweiten im vorigen Paragraphen benutzten völlig analog ist, kann man auch leicht die Werthe der Integrale

$$u = \int_0^\infty x^{\mu-1} e^{-x} \cos tx \, dx \tag{1}$$

$$v = \int_0^\infty x^{\mu-1} e^{-x} \sin tx \, dx \tag{2}$$

auf Gammafunktionen reduziren. Durch Differenziation nach der willkührlichen Constanten $t$ erhöht man zunächst die Dimension der Differenzialformel, erniedrigt sie dann wieder durch partielle Integration und zieht aus der Vergleichung beider Rechnungen eine Differenzialgleichung, welche sich leicht integriren lässt. Man hat in unserem Falle

$$\frac{du}{dt} = -\int_0^\infty x^\mu e^{-x} \sin tx \, dx \tag{3}$$

$$\frac{dv}{dt} = \int_0^\infty x^\mu e^{-x} \cos tx \, dx \,. \tag{4}$$

Ferner ist durch partielle Integration

$$\int x^\mu e^{-x} \sin tx \, dx = x^\mu \int e^{-x} \sin tx \, dx - \mu \int x^{\mu-1} dx \int e^{-x} \sin tx \, dx \,.$$

Berücksichtigt man hier die bekannte Integralformel

$$\int e^{-x} \sin tx \, dx = -\frac{t \cos tx + \sin tx}{1+t^2} e^{-x}$$

und führt die Gränzen $x = \infty$, $x = 0$ ein, wobei $x^\mu e^{-x}$ immer Null wird, wenn $\mu$ eine positive von Null verschiedene Grösse ist, so ergiebt sich:



Digitized by Google

$$\int_0^\infty x^\mu e^{-x} \sin tx\, dx = \frac{\mu}{t^2+1} \int_0^\infty x^{\mu-1} \{t \cos tx + \sin tx\} e^{-x} dx$$

d. i. nach (3), (1) und (2)

$$\frac{du}{dt} = -\frac{\mu}{t^2+1} \{tu + v\}. \tag{5}$$

Behandelt man ebenso das Integral auf der rechten Seite von (4), wobei man die Formel

$$\int e^{-x} \cos tx\, dx = \frac{-\cos tx + t \sin tx}{1+t^2} e^{-x}$$

anzuwenden Gelegenheit hat, so findet man

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{\mu}{t^2+1} \{-u + tv\}. \tag{6}$$

Um nun aus den beiden Differenzialformeln (5) und (6) die unbekannten Grössen $u$ und $v$ als Funktionen von $t$ zu entwickeln, was auf dem gewöhnlichen von Poisson eingeschlagenen Wege etwas weitläufig wird, multipliziren wir die Gleichung (6) mit $\sqrt{-1} = i$ und ziehen sie von der vorhergehenden ab; es wird so

$$\frac{du}{dt} - i\frac{dv}{dt}$$

$$= -\frac{\mu}{t^2+1} \{t(u - vi) + v + ui\}.$$

Durch die Bemerkung, dass $v + ui = i(u - vi)$ ist, gestaltet sich der Inhalt der Parenthese zu $(t+i)(u-vi)$, und wenn wir jetzt

$$u - vi = w \tag{7}$$

setzen, so wird sehr einfach

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{\mu}{t^2+1}(t+i)w = -\frac{\mu}{t-i} w = -\frac{\mu i}{ti+1} w.$$

Aus dieser Differenzialgleichung geht hervor *), dass

---

*) Für $ti = \tau$ verwandelt sich nämlich die Differenzialgleichung in

$$\frac{dw}{d\tau} = -\frac{\mu}{\tau+1} w \quad \text{oder} \quad \frac{dw}{w} = -\mu \frac{d\tau}{\tau+1}$$

Digitized by Google

$$w = \frac{C}{(ti+1)^{\mu}}$$

ist, wenn $C$ eine willkührliche constante Grösse bezeichnet. Setzt man dagegen in Nr. (7) für $u$ und $v$ ihre Werthe aus (1) und (2) so wird wegen $\cos tx - i\sin tx = e^{-txi}$

$$w = \int_0^{\infty} x^{\mu-1} e^{-(1+ti)x}\, dx = \frac{C}{(1+ti)^{\mu}}.$$

Die Constante $C$ bestimmt sich durch die Spezialisirung $t=0$, woraus $\Gamma(\mu) = C$ und mithin

$$\int_0^{\infty} x^{\mu-1} e^{-(1+ti)x}\, dx = \frac{\Gamma(\mu)}{(1+ti)^{\mu}}$$

folgt. Dieses Resultat lässt sich noch verallgemeineren, wenn man $\frac{b}{a}$ für $t$ und $ax$ für $x$ schreibt, wobei aber $a$ eine wesentlich positive weder unendlich zu- noch abnehmende Grösse sein muss, wenn sich die Integrationsgränzen nicht ändern sollen. Man findet unter diesen Bedingungen

$$\int_0^{\infty} x^{\mu-1} e^{-(a+bi)x}\, dx = \frac{\Gamma(\mu)}{(a+bi)^{\mu}}. \qquad (8)$$

Es geht aus dieser Gleichung die wichtige Bemerkung hervor, dass die Formel

$$\int_0^{\infty} x^{\mu-1} e^{-kx}\, dx = \frac{\Gamma(\mu)}{k^{\mu}}$$

---

woraus durch Integration

$$lw = Const. - \mu\, l(\tau+1)$$

oder

$$w = e^{Const. - \mu\, l(\tau+1)} = \frac{e^{Const.}}{(\tau+1)^{\mu}}$$

folgt, was für $e^{Const.} = C$, $\tau = ti$ mit der obigen Angabe zusammenfällt.

Digitized by Google

welche wir in §. 1 für blos reelle $k$ kennen lernten, auch für ein complexes $k$ gilt, sobald der reelle Bestandtheil desselben eine positive endliche Grösse ist.

Wollen wir in der Gleichung (8) eine Trennung der reellen und imaginären Partieen vornehmen, so haben wir

$$a + bi = \varrho(\cos\omega + i\sin\omega)$$

zu setzen, woraus

$$\varrho = (a^2 + b^2)^{\frac{1}{2}},\ \omega = Arctan\frac{b}{a} + n\pi$$

folgt, indem wir wie gewöhnlich unter $Arctan\, z$ den kleinsten zur Tangente $z$ gehörigen Bogen und unter $n$ eine ganze Zahl verstehen. Es wird jetzt aus (8)

$$\int_0^\infty x^{\mu-1}e^{-ax}\cos bx\,dx - i\int_0^\infty x^{\mu-1}e^{-ax}\sin bx\,dx$$

$$= \frac{\Gamma(\mu)}{\varrho^\mu(\cos\mu\omega + i\sin\mu\omega)} = \frac{\Gamma(\mu)}{\varrho^\mu}(\cos\mu\omega - i\sin\mu\omega)$$

$$= \frac{\Gamma(\mu)\cos(\mu\, Arctan\frac{b}{a} + n\pi)}{(a^2+b^2)^{\frac{1}{2}\mu}} - i\frac{\Gamma(\mu)\sin(\mu\, Arctan\frac{b}{a} + n\pi)}{(a^2+b^2)^{\frac{1}{2}\mu}}.$$

Da $n$ weder von $a$ noch von $b$ abhängt, so reicht eine beliebige Spezialisirung dieser Grössen zur Bestimmung von $n$ hin. So ergiebt sich für $a=1$, $b=0$,

$$\int_0^\infty x^{\mu-1}e^{-x}dx = \Gamma(\mu)\cos n\mu\pi$$

und da andererseits die linke Seite $\Gamma(\mu)$ zum Werthe hat, so kann diese Gleichung wegen des willkührlichen $\mu$ nur dann bestehen, wenn $n=0$ ist. Die Vergleichung der reellen und imaginären Partieen giebt jetzt:

Digitized by Google

$$\int_0^\infty x^{\mu-1}e^{-ax}\cos bx\,dx = \frac{\Gamma(\mu)\cos\left(\mu\,Arctan\frac{b}{a}\right)}{(a^2+b^2)^{\frac{1}{2}\mu}} \qquad (9)$$

$$\int_0^\infty x^{\mu-1}e^{-ax}\sin bx\,dx = \frac{\Gamma(\mu)\sin\left(\mu\,Arctan\frac{b}{a}\right)}{(a^2+b^2)^{\frac{1}{2}\mu}} \qquad (10)$$

wobei nicht zu vergessen ist, dass $a$ und $\mu$ positive endliche Grössen sein müssen.

Wir haben nun noch den Fall $a=0$ zu betrachten, welcher sich aus der vorhergehenden Betrachtung nicht ergiebt und auf welchen überhaupt die ganze Methode nicht anwendbar ist, weil die Produkte $x^\mu \sin tx$ und $x^\mu \cos tx$ nicht für $x=0$ und $x=\infty$ gleichzeitig verschwinden wie $x^\mu e^{-x}$. Wir schlagen daher einen anderen Weg ein, bei welchem es uns zunächst darauf ankommt, die Werthe der Integrale

$$\int_0^\infty \frac{\cos bs}{s^\lambda}ds \quad \text{und} \quad \int_0^\infty \frac{\sin bs}{s^\lambda}ds$$

zu bestimmen, aus welchen die ursprünglich gesuchten sehr leicht abgeleitet werden können.

Da nach den Fundamentaleigenschaften der Gammafunktionen

$$\frac{1}{s^\lambda} = \frac{1}{\Gamma(\lambda)}\int_0^\infty x^{\lambda-1}e^{-sx}dx$$

ist, so hat man offenbar

$$\int_0^\infty \frac{\cos bs}{s^\lambda}ds = \frac{1}{\Gamma(\lambda)}\int_0^\infty \cos bs\,ds \int_0^\infty x^{\lambda-1}e^{-sx}dx \qquad (11)$$

$$\int_0^\infty \frac{\sin bs}{s^\lambda}ds = \frac{1}{\Gamma(\lambda)}\int_0^\infty \sin bs\,ds \int_0^\infty x^{\lambda-1}e^{-sx}dx. \qquad (12)$$

Kehrt man auf der rechten Seite die Integrationsordnung um, so ist auch:

Digitized by Google

$$\int_0^\infty \frac{\cos bs}{s^\lambda}\,ds = \frac{1}{\Gamma(\lambda)}\int_0^\infty x^{\lambda-1}dx \int_0^\infty e^{-xs}\cos bs\,ds$$

$$= \frac{1}{\Gamma(\lambda)}\int_0^\infty x^{\lambda-1}dx\ \frac{x}{b^2+x^2}$$

$$\int_0^\infty \frac{\sin bs}{s^\lambda}\,ds = \frac{1}{\Gamma(\lambda)}\int_0^\infty x^{\lambda-1}dx \int_0^\infty e^{-xs}\sin bs\,ds$$

$$= \frac{1}{\Gamma(\lambda)}\int_0^\infty x^{\lambda-1}dx\ \frac{b}{b^2+x^2}$$

und wenn man in beiden Integralen $x = bz$ nimmt, so wird unter der Voraussetzung eines positiven endlichen $b$

$$\int_0^\infty \frac{\cos bs}{s^\lambda}\,ds = \frac{b^{\lambda-1}}{\Gamma(\lambda)}\int_0^\infty \frac{z^\lambda dz}{1+z^2} \tag{13}$$

$$\int_0^\infty \frac{\sin bs}{s^\lambda}\,ds = \frac{b^{\lambda-1}}{\Gamma(\lambda)}\int_0^\infty \frac{z^{\lambda-1}dz}{1+z^2}. \tag{14}$$

Die Werthe beider Integrale rechts sind sehr leicht zu finden, wenn man in der bekannten Formel

$$\int_0^\infty \frac{r^{\mu-1}dr}{1+r} = \frac{\pi}{\sin \mu\pi},\ 1>\mu>0$$

statt $r$ die neue Variable $z^2$ einführt und dann $\mu = \frac{\lambda+1}{2}$ und $\mu = \frac{\lambda}{2}$ setzt. Man erhält so:

Digitized by Google

$$\int_0^\infty \frac{\cos bs}{s^\lambda}\,ds = \frac{b^{\lambda-1}}{\Gamma(\lambda)}\,\frac{\pi}{2\cos\frac{1}{2}\lambda\pi},\quad 1>\lambda>0, \tag{15}$$

$$\int_0^\infty \frac{\sin bs}{s^\lambda}\,ds = \frac{b^{\lambda-1}}{\Gamma(\lambda)}\,\frac{\pi}{2\sin\frac{1}{2}\lambda\pi},\quad 2>\lambda>0. \tag{16}$$

Für alle anderen Werthe von $\lambda$ dagegen werden die Integrale unendlich. Für $\lambda=1$ fällt das zweite Integral noch endlich aus, nämlich

$$\int_0^\infty \frac{\sin bs}{s}\,ds = \frac{\pi}{2} \tag{17}$$

wobei wie bisher $\infty>b>0$ sein muss.

Setzt man in den Gleichungen (15) und (16) $s=x$, $\lambda=1-\mu$ und berücksichtigt die Formel

$$\Gamma(1-\mu) = \frac{1}{\Gamma(\mu)}\cdot\frac{\pi}{2\sin\frac{1}{2}\mu\pi\cos\frac{1}{2}\mu\pi}$$

so ergiebt sich leicht für $\infty>b>0$

$$\int_0^\infty x^{\mu-1}\cos bx\,dx = \frac{\Gamma(\mu)\cos\frac{1}{2}\mu\pi}{b^\mu},\quad 1>\mu>0 \tag{18}$$

$$\int_0^\infty x^{\mu-1}\sin bx\,dx = \frac{\Gamma(\mu)\cos\frac{1}{2}\mu\pi}{b^\mu},\quad 1>\mu-1. \tag{19}$$

Das Nämliche findet man auch aus den Gleichungen (9) und (10) für $a=0$, nur mit dem Unterschiede, dass man die Gränzen, innerhalb deren $\mu$ liegen muss, nicht mit erfährt*). Bezeichnet man wieder

*) In dieser Beziehung macht Moigno in seinem *calcul intégral S.* 307 *und* 308 einen Fehler. Er beweisst nämlich, dass wenn die Funktion $F(z)$ für $z=(a+bi)x$ dergestalt zerlegt werden kann, dass

$$F[(a+bi)x] = \Phi(x) + i\,\Psi(x)$$

Digitized by Google

$\sqrt{-1}$ mit $i$, so lassen sich die beiden Formeln (18) und (19) in die eine zusammenziehen

$$\int_0^\infty x^{\mu-1} e^{-bxi}\,dx = \frac{\Gamma(\mu)}{b^\mu} e^{\frac{1}{2}\mu\pi i},\quad 1>\mu>0. \tag{20}$$

Als Beispiel ist der Fall $\mu=\frac{1}{2}$ von Interesse, für welchen

$$\int_0^\infty \frac{\cos bx}{\sqrt{x}}\,dx = \int_0^\infty \frac{\sin bx}{\sqrt{x}} = \sqrt{\frac{\pi}{2b}} \tag{21}$$

und

$$\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}} e^{-bxi} = \sqrt{\frac{\pi}{b}}\, e^{\frac{1}{4}\pi i}$$

zum Vorschein kommt. Für $x=t^2$ wird noch

$$\int_0^\infty \cos(bt^2)\,dt = \int_0^\infty \sin(bt^2)\,dt = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2b}}$$

$$\int_0^\infty e^{-bt^2 i}\,dt = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{b}}\, e^{\frac{1}{4}\pi i}.$$

---

ist und wenn ferner ein Werth $\xi$ von $x$ existirt, für welchen $x\,\Phi(x)$ und $x\,\Psi(x)$ gleichzeitig verschwinden, die Formel

$$(a+bi)\int_0^\xi F[(a+bi)x]\,dx = a\int_0^\xi F(ax)\,dx$$

gilt. Diess passt allerdings auf die Annahme $F(z)=z^{\mu-1}e^{-z}$, $\xi=\infty$, aber nur unter der Voraussetzung, dass $a$ nicht $=0$ ist und daher darf man nicht, wie Moigno thut, die Formeln (9) und (10), welche sich mittelst dieses Theoremes ergeben, für $a=0$ in Anspruch nehmen wollen. Die Gleichungen (18) und (19) erhalten dann einen Schimmer von Allgemeinheit, dessen Trüglichkeit man erst in speziellen Fällen gewahr wird, wie z. B. wenn man in der ersteren $\mu=2$ nehmen wollte.

Digitized by Google

Schreibt man noch $h$ für $b$ und nimmt die Integrale zwischen den Gränzen $-\infty$ und $+\infty$ statt 0 und $\infty$ so ist auch

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos(ht^2)\,dt = \int_{-\infty}^{\infty} \sin(ht^2)\,dt = \sqrt{\frac{\pi}{2h}}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{ht^2 i}\,dt = \sqrt{\frac{\pi}{h}}\, e^{\frac{1}{4}\pi i}$$

weil die Integrale von $t=0$ bis $t=-\infty$ offenbar die nämlichen Werthe haben wie von $t=0$ bis $t=+\infty$. Setzt man noch im letzten Integrale

$$t = u + \frac{k}{h}$$

wodurch sich die Integrationsgränzen nicht ändern, so findet man leicht

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{(hu^2+2ku)i}\,du = \sqrt{\frac{\pi}{h}}\, e^{\left(\frac{\pi}{4} - \frac{k^2}{h}\right)i} \qquad (22)$$

wovon später eine interessante Anwendung vorkommen wird.

## §. 14.

Aus den Formeln (9) und (10) kann man dadurch, dass man nach $\mu$ als Veränderlicher differenziirt, noch einige andere bemerkenswerthe Integrale ableiten. Die genannte Differenziation ist sehr leicht auszuführen, wenn man wieder wie früher $Arctan\ \frac{b}{a} = \Theta$ und $\sqrt{a^2+b^2} = r$ setzt, wobei zu bemerken ist, dass hier $r$ und $\Theta$ von $\mu$ unabhängig sind. Schreibt man das Integral (16) unter der Form

$$\int_0^{\infty} x^{\mu-1} e^{-ax} \cos bx\,dx = \Gamma(\mu) \cos \mu\Theta \left(\frac{1}{r}\right)^{\mu}$$



Digitized by Google

und differenziirt für $\Gamma(\mu) = u$, $\cos\mu\Theta\left(\frac{1}{r}\right)^{\mu} = v$ nach der Regel $d.uv = udv + vdu$, so erhält man

$$\int_0^{\infty} lx \,.\, x^{\mu-1} e^{-ax} \cos bx \, dx$$

$$= \Gamma(\mu)\left\{\cos\mu\Theta\left(\frac{1}{r}\right)^{\mu} l\left(\frac{1}{r}\right) - \Theta \sin\mu\Theta\left(\frac{1}{r}\right)^{\mu}\right\}$$

$$+ \Gamma'(\mu)\cos\mu\Theta\left(\frac{1}{r}\right)^{\mu}.$$

Dabei ist nun wegen $\frac{d\,l\,\Gamma(\mu)}{d\mu} = \frac{\Gamma'(\mu)}{\Gamma(\mu)}$ auch $\Gamma'(\mu) = \Gamma(\mu)\frac{d\,l\,\Gamma(\mu)}{d\mu}$ oder nach Formel (8) in §. 6,

$$\Gamma'(\mu) = \Gamma(\mu)\left[-C + \int_0^1 \frac{1-x^{\mu-1}}{1-x}\,dx\right].$$

Durch Einführung dieses Werthes nimmt die oben entwickelte Gleichung folgende Form an:

$$\int_0^{\infty} lx \,.\, x^{\mu-1} e^{-ax} \cos bx \, dx$$

$$= \frac{\Gamma(\mu)}{r^{\mu}}\left\{l\left(\frac{1}{r}\right)\cos\mu\Theta - \Theta\sin\mu\Theta\right\}$$

$$+ \frac{\Gamma(\mu)\cos\mu\Theta}{r^{\mu}}\left\{-C + \int_0^1 \frac{1-x^{\mu-1}}{1-x}\,dx\right\}.$$

Nimmt man beide Seiten negativ, was links dadurch geschieht, dass man $l\left(\frac{1}{x}\right)$ an die Stelle von $lx$ setzt und führt darauf die Werthe von $r$ und $\Theta$ wieder ein, so hat man:

Digitized by Google

$$\left.\begin{aligned}&\int_0^\infty l\left(\frac{1}{x}\right) x^{\mu-1} e^{-ax} \cos bx\, dx\\ &= \frac{\Gamma(\mu)}{(a^2+b^2)^{\frac{1}{2}\mu}}\left[\tfrac{1}{2} l(a^2+b^2)\cos\left(\mu \operatorname{Arctan}\frac{b}{a}\right)\right.\\ &\qquad\left. + \operatorname{Arctan}\frac{b}{a}\sin\left(\mu \operatorname{Arctan}\frac{b}{a}\right)\right]\\ &+ \frac{\Gamma(\mu)\cos\left(\mu \operatorname{Arctan}\frac{b}{a}\right)}{(a^2+b^2)^{\frac{1}{2}\mu}}\left[C - \int_0^1 \frac{1-x^{\mu-1}}{1-x}\,dx\right]\end{aligned}\right\} \quad (23)$$

und hiermit ist das Integral links auf ein viel einfacheres zurückgeführt, dessen Werth sich für rationale $\mu$ nach den gewöhnlichen Regeln unmittelbar angeben und für irrationale $\mu$ wenigstens näherungsweise berechnen lässt.

Behandelt man auf ganz dieselbe Weise die Gleichung

$$\int_0^\infty x^{\mu-1} e^{-ax} \sin bx\, dx = \Gamma(\mu)\sin\mu\Theta\left(\frac{1}{r}\right)^{\mu}$$

so gelangt man leicht zu dem analogen Resultate:

$$\left.\begin{aligned}&\int_0^\infty l\left(\frac{1}{x}\right) x^{\mu-1} e^{-ax} \sin bx\, dx\\ &= \frac{\Gamma(\mu)}{(a^2+b^2)^{\frac{1}{2}\mu}}\left[\tfrac{1}{2} l(a^2+b^2)\sin\left(\mu \operatorname{Arctan}\frac{b}{a}\right)\right.\\ &\qquad\left. - \operatorname{Arctan}\frac{b}{a}\cos\left(\mu \operatorname{Arctan}\frac{b}{a}\right)\right]\\ &+ \frac{\Gamma(\mu)\sin\left(\mu \operatorname{Arctan}\frac{b}{a}\right)}{(a^2+b^2)^{\frac{1}{2}\mu}}\left[C - \int_0^1 \frac{1-x^{\mu-1}}{1-x}\,dx\right].\end{aligned}\right\} \quad (24)$$

Die gefundenen Gleichungen (23) und (24) gelten ohne Einschränkung für jedes positive von Null verschiedene $a$; ist aber $a=0$, so

Digitized by Google

muss in (23) $1 > \mu > 0$ und in (24) $1 > \mu > -1$ sein, weil dann die Formeln (15) und (16) in (21) und (22) übergehen.

Interessante spezielle Fälle unserer Gleichungen sind folgende:

I. $\mu = 1$; man hat dann

$$cos\left(Arctan\frac{b}{a}\right) = cos\left(Arccos\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}}\right) = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

$$sin\left(Arctan\frac{b}{a}\right) = sin\left(Arcsin\frac{\frac{b}{a}}{\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}}\right) = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

folglich

$$\left.\begin{aligned}&\int_0^\infty l\left(\frac{1}{x}\right) e^{-ax} \cos bx\, dx\\ &= \frac{1}{a^2+b^2}\left[\tfrac{1}{2}\, a\, l(a^2+b^2) + b\, Arctan\frac{b}{a} + a\, C\right]\end{aligned}\right\} \quad (25)$$

$$\left.\begin{aligned}&\int_0^\infty l\left(\frac{1}{x}\right) e^{-ax} \sin bx\, dx\\ &= \frac{1}{a^2+b^2}\left[\tfrac{1}{2}\, b\, l(a^2+b^2) - a\, Arctan\frac{b}{a} + b\, C\right].\end{aligned}\right\} \quad (26)$$

II. Ist $\mu$ eine ganze positive Zahl $> 1$, so hat es keine Schwierigkeit, das jedesmal auf der rechten Seite von (23) oder (24) vorkommende Integral auszuführen. Denn für $\mu = n+1$ wird

$$\int_0^1 \frac{1-x^n}{1-x}\, dx = \int_0^1 \left\{1 + x + x^2 + x^3 + \ldots + x^{n-1}\right\} dx$$

$$= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n}.$$

III. Für $b = 0$ ist nach Formel (23)

$$\int_0^\infty l\left(\frac{1}{x}\right) x^{\mu-1} e^{-ax}\, dx = \frac{\Gamma(\mu)}{a^\mu}\left[la + C - \int_0^1 \frac{1-x^{\mu-1}}{1-x}\, dx\right]$$

Digitized by Google

also z. B. für $\mu = \frac{1}{2}$ und $x = z^2$,

$$\int_0^\infty l\left(\frac{1}{z}\right) e^{-az^2}\, dz = \frac{\sqrt{\pi}}{4\sqrt{a}} [la + C + 2l2] .$$

## §. 15.

Die Formeln (9) und (10) in §. 13 lassen sich mit den ebendaselbst entwickelten (19) und (20) selbst wieder combiniren, wodurch man noch zu einigen neuen Integralen gelangt, deren Differenzialformeln aus goniometrischen Funktionen zusammengesetzt sind. — Schreibt man nämlich in Nr. (9) $p$ und $u$ für $\mu$ und $b$, multiplizirt die so entstehende Gleichung

$$\int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} \cos ux\, dx = \frac{\Gamma(p) \cos (p \operatorname{Arctan} u)}{(1+u^2)^{\frac{1}{2}p}}$$

worin $a = 1$ ist, mit

$$\frac{du}{u^q}$$

und integrirt hierauf zwischen den Gränzen $u = 0$, $u = \infty$, so ergiebt sich:

$$\left.\begin{aligned} &\int_0^\infty \frac{du}{u^q} \int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} \cos ux\, dx \\ &= \Gamma(p) \int_0^\infty \frac{\cos (p \operatorname{Arctan} u)}{(1+u^2)^{\frac{1}{2}p}} \frac{du}{u^q} . \end{aligned}\right\} (1)$$

Hier hat man nun einen von den glücklichen Fällen, in welchen sich zwei angezeigte Integrationen ausführen lassen, sobald man die Ordnung der Integrationen umkehrt. Die linke Seite der Gleichung (1) geht nämlich unter Anwendung dieser Operation in:

Digitized by Google

$$\int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} dx \int_0^\infty \frac{\cos xu}{u^q} du$$

über, wobei man die Formel (19) benutzen kann, wenn man in ihr

an die Stelle von $x$, $b$, $\lambda$

die Buchstaben $u$, $x$, $q$

treten lässt. Dass fragliche Doppelintegral verwandelt sich dann in

$$\int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} dx \cdot \frac{x^{q-1}}{\Gamma(q)} \cdot \frac{\pi}{2\cos \frac{1}{2}q\pi}, \quad 1 > q > 0$$

oder wenn man auch die Integration nach $x$ ausführt, in

$$\frac{\Gamma(p+q-1)}{\Gamma(q)} \cdot \frac{\pi}{2\cos \frac{1}{2}q\pi}, \quad 1 > q > 0,$$

und diess ist der Werth der linken Seite in der Gleichung (1). Es wird demnach

$$\int_0^\infty \frac{\cos(p \operatorname{Arctan} u)}{(1+u^2)^{\frac{1}{2}p}} \cdot \frac{du}{u^q} = \frac{\Gamma(p+q-1)}{\Gamma(p)\Gamma(q)} \cdot \frac{\pi}{2\cos \frac{1}{2}q\pi}, \quad 1 > q > 0. \quad (2)$$

Bevor wir nun zeigen, auf welche Weise sich dieses Integral in eine andere sehr geschmeidige Form bringen lässt, wollen wir erst eine ganz analoge Gleichung entwickeln, weil die zu jener Transformation erforderliche Substitution auf beide Integrale völlig gleichförmig anwendbar ist.

Für $a = 1$, $b = u$, $\mu = p$ geht die Formel (16) des §. 12 in

$$\int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} \sin ux \, dx = \frac{\Gamma(p) \sin(p \operatorname{Arctan} u)}{(1+u^2)^{\frac{1}{2}p}}$$

über, woraus man durch Multiplikation mit $\frac{du}{u^q}$ und Integration von $u = 0$ bis $u = \infty$ die Gleichung:

Digitized by Google

$$\left.\begin{aligned}&\int_0^\infty \frac{du}{u^q}\int_0^\infty x^{p-1}e^{-x}\sin ux\,dx\\ &= \Gamma(p)\int_0^\infty \frac{\sin(p\,Arctan\,u)}{(1+u^2)^{\frac{1}{2}p}}\cdot\frac{du}{u^q}\end{aligned}\right\}\quad(3)$$

erhält. Umkehrung der Integrationsordnung giebt hier auf der linken Seite

$$\int_0^\infty x^{p-1}e^{-x}dx\int_0^\infty \frac{\sin xu}{u^q}du$$

$$=\int_0^\infty x^{p-1}e^{-x}dx\,\frac{x^{q-1}}{\Gamma(q)}\cdot\frac{\pi}{2\sin\frac{1}{2}q\pi}=\frac{\Gamma(p+q-1)}{\Gamma(q)}\cdot\frac{\pi}{2\sin\frac{1}{2}q\pi}$$

$$2>q>0$$

und folglich nach Nr. (3)

$$\int_0^\infty \frac{\sin(p\,Arctan\,u)}{(1+u^2)^{\frac{1}{2}p}}\cdot\frac{du}{u^q}=\frac{\Gamma(p+q-1)}{\Gamma(p)\,\Gamma(q)}\cdot\frac{\pi}{2\sin\frac{1}{2}q\pi},\quad 2>q>0,\qquad(4)$$

und diess ist das Gegenstück zur Gleichung (2).

Nimmt man jetzt in den Formeln (2) und (4)

$$Arctan\,u=x,\ \text{also}\ u=tan\,x$$

so folgt

$$1+u^2=\frac{1}{\cos^2 x},\quad du=\frac{dx}{\cos^2 x}.$$

Wenn ferner $u=0$ und $u=\infty$ geworden ist, so hat $x$ die Werthe $x=0$ und $x=\frac{\pi}{2}$ angenommen und so erhält man zusammen:

Digitized by Google

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos px \cos^{p-2} x \cot^q x \, dx = \frac{\Gamma(p+q-1)}{\Gamma(p)\,\Gamma(q)} \cdot \frac{\pi}{2\cos\frac{1}{2}q\pi}, \; 1>q>0. \quad (5)$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin px \cos^{p-2} x \cot^q x \, dx = \frac{\Gamma(p+q-1)}{\Gamma(p)\,\Gamma(q)} \cdot \frac{\pi}{2\sin\frac{1}{2}q\pi}, \; 2>q>0. \quad (6)$$

Da $p$ hier noch völlig willkührlich ist, so enthalten diese Formeln eine grosse Menge spezieller Fälle in sich, die nur zum Theil bekannt sind. Für $p=1$ erhält man nichts wesentlich Neues; für $p=2$ z. B.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2x \cot^q x \, dx = \frac{q\pi}{2\cos\frac{1}{2}q\pi}, \; 1>q>0. \quad (7)$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x \cot^q x \, dx = \frac{q\pi}{2\sin\frac{1}{2}q\pi}, \; 2>q>0. \quad (8)$$

Nimmt man dagegen in der Formel (6) $q=1$, was in Nr. (5) nicht geschehen darf, so wird

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin px}{\sin x} \cos^{p-1} x \, dx = \frac{\pi}{2} \quad (9)$$

für jedes positive von Null verschiedene $p$ *).

Setzt man in der Formel (5) $\mu$ für $q$ und eine ganze positive Zahl $n$ an die Stelle von $p$, so erhält man unter Anwendung des bekannten Satzes $\Gamma(\mu+m)=\mu(\mu+1)\ldots(\mu+m-1)\,\Gamma(\mu)$ für $m=n-1$ leicht

$$\left.\begin{aligned} &\int_0^{\frac{\pi}{2}} (r\cos x)^n \cos nx \; . \; \frac{\cot^\mu x \, dx}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\mu(\mu+1)(\mu+2)\ldots.(\mu+n-2)}{1\,.\,2\,.\,3\,\ldots.\,(n-1)}\, r^n \cdot \frac{\pi}{2\cos\frac{1}{2}\mu\pi}, \end{aligned}\right\} \quad (10)$$

*) Diese spezielle Formel findet auch Liouville in Crelle's *Journal Bd.* 13, *S.* 232.

Digitized by Google

wobei $r^n$ ein beiderseits willkührlich zugesetzter constanter Faktor ist. Beachtet man nun, dass der Coeffizient von $r^n$ ein Binomialcoeffizient ist, so erhellt auf der Stelle, dass man beiderseits $n=1, 2, 3, \ldots$ nehmen und alle so entstehenden Gleichungen addiren kann, und dass man auf diese Weise zu einigen neuen Integralen gelangen muss. In der That ergiebt sich

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left\{r\cos x\,\cos x + (r\cos x)^2\cos 2x + \ldots\ldots\right\} \frac{\cot^\mu x\,dx}{\cos^2 x} = \left\{1 + \frac{\mu}{1}r + \frac{\mu(\mu+1)}{1\,.\,2}r^2 + \ldots\ldots\right\} \frac{r\pi}{2\cos\frac{1}{2}\mu\pi}. \qquad (11)$$

Die unter dem Integralzeichen stehende Reihe lässt sich mittelst der Formel

$$\frac{\varrho\cos x - \varrho^2}{1 - 2\varrho\cos x + \varrho^2} = \varrho\cos x + \varrho^2\cos 2x + \varrho^3\cos 3x + \ldots.$$

$$1 > \varrho > -1$$

leicht summiren, wenn man $\varrho = r\cos x$ und $1 > r > -1$ setzt; ihre Summe ist dann:

$$\frac{r\cos^2 x - r^2\cos^2 x}{1 - 2r\cos^2 x + r^2\cos^2 x} = \frac{r(1-r)\cos^2 x}{1 - (2r - r^2)\cos^2 x}.$$

Die auf der rechten Seite der Gleichung (11) in Parenthese stehende Reihe hat wegen der schon genannten Bedingung $1 > r > -1$ zur Summe:

$$(1-r)^{-\mu} = \frac{1}{(1-r)^\mu}.$$

Mittelst dieser Summen ergiebt sich nun

$$\left.\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cot^\mu x\,dx}{1 - (2r - r^2)\cos^2 x} &= \frac{1}{(1-r)^{\mu+1}} \cdot \frac{\pi}{2\cos\frac{1}{2}\mu\pi} \\ 1 > r > -1, \quad 1 > \mu > -1. & \end{aligned}\right\} (12)$$



Digitized by Google

Behandelt man ganz ebenso die Gleichung (6) so findet man zunächst

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left\{ r\cos x \sin x + (r\cos x)^2 \sin 2x + \ldots\ldots \right\} \frac{\cot^{\mu} x\, dx}{\cos^2 x}$$

$$= \left\{ 1 + \frac{\mu}{1} r + \frac{\mu(\mu+1)}{1 \cdot 2} r^2 + \ldots\ldots \right\} \frac{r\pi}{2\sin \frac{1}{2}\mu\pi}$$

und wegen der Formel

$$\frac{\varrho \sin x}{1 - 2\varrho\cos x + \varrho^2} = \varrho \sin x + \varrho^2 \sin 2x + \varrho^3 \sin 3x + \ldots.$$

$$1 > \varrho > -1$$

wenn man sie für $\varrho = r\cos x$ in Anwendung bringt

$$\left.\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cot^{\mu-1} x\, dx}{1 - (2r - r^2)\cos^2 x} &= \frac{1}{(1-r)^{\mu}} \cdot \frac{\pi}{2\sin \frac{1}{2}\mu\pi} \\ 1 > r > -1, \quad 2 > \mu > 0 &. \end{aligned}\right\} \quad (13)$$

Setzt man in den Formeln (12) und (13)

$$1 - r = \sqrt{1-k}$$

wo das Wurzelzeichen nur positiv genommen werden darf, weil $1-r$ stets positiv bleibt, und schreibt dann in Formel (13) $\mu + 1$ für $\mu$, so wird letztere mit der ersteren identisch nämlich

$$\left.\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cot^{\mu} x\, dx}{1 - k\cos^2 x} &= \frac{1}{(1-k)^{\frac{1}{2}(\mu+1)}} \cdot \frac{\pi}{2\cos \frac{1}{2}\mu\pi} \\ 1 > k > -1, \quad 1 > \mu > -1 &, \end{aligned}\right\} \quad (14)$$

ein Resultat, das man auch a posteriori leicht verifiziren kann, wenn man

$$\frac{1}{1 - k\cos^2 x}$$

in eine Reihe verwandelt und jedes einzelne Glied derselben integrirt, wobei man zu beachten hat, dass für $\sin x = z$, $z = \sqrt{y}$:

Digitized by Google

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{\mu+2n} x \frac{dx}{\sin^{\mu} x} = \int_0^1 (1-z^2)^{\frac{1}{2}(2n+\mu-1)} z^{-\mu} dz$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 (1-y)^{\frac{1}{2}(\mu+1)+n-1} y^{\frac{1}{2}(1-\mu)-1} dy$$

ist und sich der Werth des letzten Integrales mit Hülfe der Formeln (4) und (8) in §. 2 leicht finden lässt. Differenzirt man die gefundene Gleichung (14) $m$mal nach $k$, so erhält man noch

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cot^{\mu} x \cos^{2m} x \, dx}{(1-k\cos^2 x)^{m+1}}$$

$$= \frac{(\mu+1)(\mu+3)\ldots(\mu+2m-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \ldots (2m)} \cdot \frac{1}{(1-k)^{\frac{1}{2}(\mu+1)+m+1}} \cdot \frac{\pi}{2\cos\frac{1}{2}\mu\pi} \cdot$$

$$1 > k > -1, \quad 1 > \mu > -1. \qquad (13)$$

## §. 16.

Einige andere durch Gammafunktionen ausdrückbare Integrale ergeben sich aus einer sehr allgemeinen Transformation, welche sich auf eine ganze Klasse von Integralen anwenden lässt, und wodurch man auf das Theorem

$$\int_0^{\infty} F(cx + \frac{a}{x}) \frac{dx}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{c}} \int_0^{\infty} F(2\sqrt{ac} + x) \frac{dx}{\sqrt{x}} \qquad (1)$$

kommt, in welchem $F$ eine völlig willkührliche Funktion bedeutet. Die Transformation selbst besteht in folgenden Substitutionen.

Es ist identisch

$$\int_0^{\infty} f\left[(cz - \frac{a}{z})^2\right] dz$$

$$= \frac{1}{2c} \int_0^{\infty} f\left[(cz - \frac{a}{z})^2\right] (c + \frac{a}{z^2}) dz \left\{1 + \frac{cz - \frac{a}{z}}{\sqrt{4ac + (cz - \frac{a}{z})^2}}\right\}.$$

Digitized by Google

wovon man sich leicht durch die einfache Bemerkung überzeugt, dass

$$\frac{1}{2c}\left(c+\frac{a}{z^2}\right)\left\{1+\frac{cz-\frac{a}{z}}{\sqrt{4ac+\left(cz-\frac{a}{z}\right)^2}}\right\}=1$$

ist. Nimmt man nun in dem Integrale auf der rechten Seite

$$cz-\frac{a}{z}=y \quad \text{folglich} \quad \left(c+\frac{a}{z^2}\right)dz=dy$$

und berücksichtigt, dass für $z=0$, $y=-\infty$ und für $z=\infty$, $y=+\infty$ wird, sobald $a$ und $c$ positive von Null verschiedene Grössen sind, so ergiebt sich auf der Stelle

$$\int_0^\infty f\left[\left(cz-\frac{a}{z}\right)^2\right]dz=\frac{1}{2c}\int_{-\infty}^{\infty} f(y^2)\,dy\left\{1+\frac{y}{\sqrt{4ac+y^2}}\right\}$$

$$=\frac{1}{2c}\int_{-\infty}^{\infty} f(y^2)\,dy+\frac{1}{2c}\int_{-\infty}^{\infty} f(y^2)\frac{y\,dy}{\sqrt{4ac+y^2}}. \qquad (2)$$

Zerlegt man das erste dieser Integrale wie folgt

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(y^2)\,dy=\int_0^{\infty} f(y^2)\,dy+\int_{-\infty}^{0} f(y^2)\,dy$$

so erhellt auf der Stelle, dass das zweite Integral rechts dem ersten ebendaselbst gleich sein müsse, weil die Funktion $f(y^2)$, welche integrirt wird, von $y=0$ bis $y=-\infty$ die nämlichen Werthe giebt, wie von $y=0$ bis $y=+\infty$. Es ist demnach

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(y^2)\,dy=2\int_0^{\infty} f(y^2)\,dy. \qquad (3)$$

Ebenso zerlegen wir das zweite Integral in Nr. (2), nämlich:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{y f(y^2)\,dy}{\sqrt{4ac+y^2}}=\int_0^{\infty}\frac{y f(y^2)\,dy}{\sqrt{4ac+y^2}}+\int_{-\infty}^{0}\frac{y f(y^2)\,dy}{\sqrt{4ac+y^2}} \qquad (4)$$

Digitized by Google

da nun die Funktion

$$\frac{y f(y^2)}{\sqrt{4ac + y^2}} = \Phi(y)$$

die Eigenschaft $\Phi(-y) = -\Phi(+y)$ besitzt, so folgt, dass das zweite Integral rechts in (4) das erste aufhebt und mithin

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{y f(y^2)\, dy}{\sqrt{4ac + y^2}} = 0$$

sein muss. Substituiren wir dieses Resultat nebst dem in Nr. (3) gefundenen in die Gleichung (2), so ergiebt sich sehr einfach

$$\int_0^{\infty} f\left[\left(cz - \frac{a}{z}\right)^2\right] dz = \frac{1}{c}\int_0^{\infty} f(y^2)\, dy = \frac{1}{c}\int_0^{\infty} f(z^2)\, dz$$

oder

$$\int_0^{\infty} f\left[c^2 z^2 + \frac{a^2}{z^2} - 2ac\right] dz = \frac{1}{c}\int_0^{\infty} f(z^2)\, dz\,.$$

Schreibt man $a$ und $c$ für $a^2$ und $c^2$, wo nun $a$, $c$, $\sqrt{a}$ und $\sqrt{c}$ immer positiv zu nehmen sind und setzt $z = \sqrt{x}$; so ergiebt sich

$$\int_0^{\infty} f(cx + \frac{a}{x} - 2\sqrt{ac})\frac{dx}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{c}}\int_0^{\infty} f(x)\frac{dx}{\sqrt{x}}$$

und wenn man eine neue Funktion $F$ der Art einführt, dass

$$f(z - 2\sqrt{ac}) = F(z)$$
$$\text{also} \qquad f(z) = F(2\sqrt{ac} + z)$$

ist, so kommt man auf das bereits in Nr. (1) angezeigte Resultat:

$$\int_0^{\infty} F(cx + \frac{a}{x})\frac{dx}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{c}}\int_0^{\infty} F(2\sqrt{ac} + x)\frac{dx}{\sqrt{x}}\,. \qquad (5)$$

Dasselbe ist noch dadurch einer Verallgemeinerung fähig, dass man beiderseits beliebig vielmal nach einer der beiden willkührlichen

Digitized by Google

Constanten $a$ oder $c$ differenzirt. Geschieht diess $n$mal in Bezug auf $a$, so wird

$$\int_0^\infty \frac{1}{x^n} F^{(n)}\left(cx + \frac{a}{x}\right) \frac{dx}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{c}} \int_0^\infty \frac{d^n F(2\sqrt{ac} + x)}{da^n} \cdot \frac{dx}{\sqrt{x}} \qquad (6)$$

wobei man die rechte Seite auf folgende Weise weiter entwickeln kann. Kennt man die successiven Differenzialquotienten $q'(u)$, $q''(u)$, $q'''(u)$ *etc.* einer beliebigen Funktion $q(u)$, so gilt für die Differenziation von $q(\sqrt{v})$ nach $v$ die folgende Regel *)

$$\frac{d^n q(\sqrt{v})}{dv^n} = \frac{1}{2^n} \left\{ \frac{q^{(n)}(\sqrt{v})}{(\sqrt{v})^n} - \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{q^{(n-1)}(\sqrt{v})}{(\sqrt{v})^{n+1}} \right.$$
$$\left. + \frac{(n+1)\,n(n-1)(n-2)}{2\,.\,4} \cdot \frac{q^{(n-2)}(\sqrt{v})}{(\sqrt{v})^{n+2}} - \ldots \right\}$$

wobei die Reihe rechts so weit fortgesetzt wird, bis sie von selbst abbricht und die Coeffizienten unter der Form

$$\frac{(n+r-1)(n+r-2)\ldots(n+1)\,n(n-1)\ldots(n-r)}{2\,.\,4\,.\,6\,\ldots\,(2r)}$$

stehen. Dieses Theorem, von dessen Richtigkeit man sich leicht mittelst des Schlusses von $n$ auf $n+1$ überzeugen kann, ist in unserem Falle von leichter Anwendung, wenn man

$$q(u) = F(2\sqrt{c}\,.\,u + x)$$

setzt, woraus für ein ganzes positives $p$

$$q^{(p)}(u) = (2\sqrt{c})^p F^{(p)}(2\sqrt{c}\,.\,u + x)$$
$$q^{(p)}(\sqrt{v}) = (2\sqrt{c})^p F^{(p)}(2\sqrt{c}\,\sqrt{v} + x)$$

folgt. Denkt man sich jetzt $a$ für $v$ geschrieben, so ergiebt sich:

---

*) M. s. meine *Differenztalrechnung S. 92, Formel* (15).

Digitized by Google

$$\frac{d^n F(2\sqrt{ac}+x)}{da^n}$$

$$= \frac{1}{2^n}\left\{\frac{(2\sqrt{c})^n F^{(n)}(2\sqrt{ac}+x)}{(\sqrt{a})^n} - \frac{n(n-1)}{2}\frac{(2\sqrt{c})^{n-1} F^{(n-1)}(2\sqrt{ac}+x)}{(\sqrt{a})^{n+1}}\right.$$

$$\left. + \frac{(n+1)n(n-1)(n-2)}{2\,.\,4}\frac{(2\sqrt{c})^{n-2} F^{(n-2)}(2\sqrt{ac}+x)}{(\sqrt{a})^{n+2}} - \ldots\ldots\right\}$$

$$= \left(\frac{c}{a}\right)^{\frac{n}{2}}\left\{F^{(n)}(2\sqrt{ac}+x) - \overset{n}{K}_1 \frac{F^{(n-1)}(2\sqrt{ac}+x)}{2\sqrt{ac}}\right.$$

$$\left. + \overset{n}{K}_2 \frac{F^{(n-2)}(2\sqrt{ac}+x)}{(2\sqrt{ac})^2} - \ldots\ldots\right\}$$

wobei zur Abkürzung

$$\frac{(n+r-1)(n+r-2)\ \ldots\ (n-r)}{2\,.\,4\,.\,6\ \ldots\ (2r)} = \overset{n}{K}_r \qquad (7)$$

gesetzt worden ist. Substituiren wir diess in die Gleichung (6), integriren jedes einzelne Glied der Reihe und bezeichnen kurz wie folgt

$$\int_0^\infty F^{(n-r)}(2\sqrt{ac}+x)\frac{dx}{\sqrt{x}} = J_{n-r} \qquad (8)$$

so ist

$$\int_0^\infty \frac{1}{x^n} F^{(n)}\left(cx+\frac{a}{x}\right)\frac{dx}{\sqrt{x}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{c}}\left(\frac{c}{a}\right)^{\frac{n}{2}}\left\{J_n - \overset{n}{K}_1 \frac{J_{n-1}}{2\sqrt{ac}} + \overset{n}{K}_2 \frac{J_{n-2}}{(2\sqrt{ac})^2} - \ldots\ldots\right\}. \qquad (9)$$

Wählt man hier die Funktion $F$ so, dass man die in Nr. (8) angedeutete Integration ausführen kann, so sind sämmtliche auf der

Digitized by Google

rechten Seite der Gleichung (9) stehende Grössen bekannt und man erhält folglich den Werth eines neuen Integrales von verwickelterer Form.

Durch Differenziation nach $c$ liesse sich aus der Formel (5) noch ein zweites analoges Resultat ableiten, das man auch auf folgendem kürzeren Wege findet. Man setze in dem Integrale links in (9) $x = \frac{1}{z}$, so geht dasselbe über in:

$$-\int_{\infty}^{0} z^n F^{(n)}\left(\frac{c}{z} + az\right) \frac{dz}{z^2} \sqrt{z}$$

oder auch

$$\int_{0}^{\infty} z^{n-1} F^{(n)}\left(az + \frac{c}{z}\right) \frac{dz}{\sqrt{z}}.$$

Schreibt man nun wieder $x$ für $z$ und vertauscht $a$ und $c$ gegen einander, so ergiebt sich nach Nr. (9)

$$\int_{0}^{\infty} x^{n-1} F^{(n)}\left(cx + \frac{a}{x}\right) \frac{dx}{\sqrt{x}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\frac{a}{c}\right)^{\frac{n}{2}} \left\{ J_n - \overset{n}{K}_1 \frac{J_{n-1}}{2\sqrt{ac}} + \overset{n}{K}_2 \frac{J_{n-2}}{(2\sqrt{ac})^2} - \ldots\ldots \right\}. \qquad (10)$$

## §. 17.

Die hauptsächlichsten Anwendungen, welche sich von den Formeln (9) und (10) im vorigen Paragraphen machen lassen, bestehen in den folgenden Spezialisirungen der mit $F$ bezeichneten Funktion.

I. Es sei $F(z) = e^{-z}$ also

$$F^{(n-r)}(z) = (-1)^{n-r} e^{-z}$$

so folgt

$$J_{n-r} = (-1)^{n-r} \int_{0}^{\infty} e^{-(2\sqrt{ac}+x)} \frac{dx}{\sqrt{x}} = (-1)^{n-r} \sqrt{\pi}\, e^{-2\sqrt{ac}}$$

Digitized by Google

und nach Nr. (9)

$$\int_0^\infty \frac{dx}{x^n\sqrt{x}}\, e^{-(cx+\frac{a}{x})}$$

$$= \sqrt{\frac{\pi}{c}}\left(\frac{c}{a}\right)^{\frac{n}{2}} \left\{1 + \frac{K_1^{(n)}}{2\sqrt{ac}} + \frac{K_2^{(n)}}{(2\sqrt{ac})^2} + \ldots\right\} e^{-2\sqrt{ac}} \qquad (1)$$

und ebenso nach Nr. (10)

$$\int_0^\infty \frac{x^{n-1}dx}{\sqrt{x}}\, e^{-(cx+\frac{a}{x})}$$

$$= \sqrt{\frac{\pi}{a}}\left(\frac{a}{c}\right)^{\frac{n}{2}} \left\{1 + \frac{K_1^{(n)}}{2\sqrt{ac}} + \frac{K_2^{(n)}}{(2\sqrt{ac})^2} + \ldots\right\} e^{-2\sqrt{ac}} . \qquad (2)$$

Für $c = a$ vereinigen sich diese Formeln zu einer spezielleren, welche Cauchy auf anderem Wege gefunden hat *).

II. Eine zweite nicht weniger leichte Entwickelung gewährt die Substitution

$$F(z) = \frac{1}{(b+z)^\lambda}.$$

Sie giebt erstlich

$$F^{(n)}(z) = \frac{(-1)^n \lambda(\lambda+1)\ldots(\lambda+n-1)}{(b+z)^{\lambda+n}} = \frac{\Gamma(\lambda+n)}{\Gamma(\lambda)} \cdot \frac{(-1)^n}{(b+z)^{\lambda+n}}$$

folglich

$$F^{(n)}(cx+\frac{a}{x}) = \frac{\Gamma(\lambda+n)}{\Gamma(\lambda)} \cdot \frac{(-1)^n x^{\lambda+n}}{(a+bx+cx^2)^{\lambda+n}} \qquad (3)$$

---

*) *Exercices de Mathématiques* 2me *Livraison. Paris* 1826.



Digitized by Google

ferner weil

$$F^{(n-r)}(z) = \frac{\Gamma(\lambda+n-r)}{\Gamma(\lambda)} \cdot \frac{(-1)^{n-r}}{(b+z)^{\lambda+n-r}}$$

ist,

$$J_{n-r} = \frac{(-1)^{n-r}\Gamma(\lambda+n-r)}{\Gamma(\lambda)} \int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}\,(b+2\sqrt{ac}+x)^{\lambda+n-r}}$$

oder wenn man $x = (b+2\sqrt{ac})y$ setzt

$$J_{n-r} = \frac{(-1)^{n-r}\Gamma(\lambda+n-r)}{\Gamma(\lambda)\,(b+2\sqrt{ac})^{\lambda+n-r-\frac{1}{2}}} \int_0^\infty \frac{y^{\frac{1}{2}-1}dy}{(1+y)^{\lambda+n-r}}.$$

Bestimmt man den Werth des Integrales rechts, so findet sich

$$J_{n-r} = \frac{(-1)^{n-r}\sqrt{\pi}}{\Gamma(\lambda)} \cdot \frac{\Gamma(\lambda+n-r-\frac{1}{2})}{(b+2\sqrt{ac})^{\lambda+n-r-\frac{1}{2}}}. \qquad (4)$$

Substituiren wir nun die unter (3) und (4) gefundenen Werthe für $r = 0, 1, 2, \ldots$ in die Formel (9) des vorigen Paragraphen, so ergiebt sich

$$\Gamma(\lambda+n) \int_0^\infty \frac{x^\lambda dx}{\sqrt{x}\,(a+bx+cx^2)^{\lambda+n}}$$

$$= \sqrt{\frac{\pi}{c}} \left(\frac{c}{a}\right)^{\frac{n}{2}} \left\{ \frac{\Gamma(\lambda+n-\frac{1}{2})}{(b+2\sqrt{ac})^{\lambda+n-\frac{1}{2}}} \right.$$

$$\left. + \frac{K_1^n}{2\sqrt{ac}} \frac{\Gamma(\lambda+n-\frac{1}{2}-1)}{(b+2\sqrt{ac})^{\lambda+n-\frac{1}{2}-1}} + \ldots\ldots \right\}$$

Digitized by Google

oder für $\lambda + n - \frac{1}{2} = \mu$

$$\Gamma(\mu+\tfrac{1}{2})\sqrt{\frac{c}{\pi}}\left(\frac{a}{c}\right)^{\frac{n}{2}}\int_0^\infty \frac{x^{\mu-n}\,dx}{(a+bx+cx^2)^{\mu+\frac{1}{2}}}$$

$$= \frac{\Gamma(\mu)}{(b+2\sqrt{ac})^{\mu}} + \frac{\overset{n}{K}_1}{2\sqrt{ac}}\cdot\frac{\Gamma(\mu-1)}{(b+2\sqrt{ac})^{\mu-1}}$$

$$+ \frac{\overset{n}{K}_2}{(2\sqrt{ac})^2}\cdot\frac{\Gamma(\mu-2)}{(b+2\sqrt{ac})^{\mu-2}} + \ldots\ldots \qquad (5)$$

Durch ganz die nämlichen Substitutionen erhält man aus der Formel (10)

$$\Gamma(\mu+\tfrac{1}{2})\sqrt{\frac{a}{\pi}}\left(\frac{c}{a}\right)^{\frac{n}{2}}\int_0^\infty \frac{x^{\mu+n-1}\,dx}{(a+bx+cx^2)^{\mu+\frac{1}{2}}}$$

$$= \frac{\Gamma(\mu)}{(b+2\sqrt{ac})^{\mu}} + \frac{\overset{n}{K}_1}{2\sqrt{ac}}\cdot\frac{\Gamma(\mu-1)}{(b+2\sqrt{ac})^{\mu-1}}$$

$$+ \frac{\overset{n}{K}_2}{(2\sqrt{ac})^2}\cdot\frac{\Gamma(\mu-2)}{(b+2\sqrt{ac})^{\mu-2}} + \ldots\ldots$$

oder $n+1$ für $n$ gesetzt

$$\Gamma(\mu+\tfrac{1}{2})\sqrt{\frac{c}{\pi}}\left(\frac{c}{a}\right)^{\frac{n}{2}}\int_0^\infty \frac{x^{\mu+n}\,dx}{(a+bx+cx^2)^{\mu+\frac{1}{2}}}$$

$$= \frac{\Gamma(\mu)}{(b+2\sqrt{ac})^{\mu}} + \frac{\overset{n+1}{K}_1}{2\sqrt{ac}}\cdot\frac{\Gamma(\mu-1)}{(b+2\sqrt{ac})^{\mu-1}}$$

$$+ \frac{\overset{n+1}{K}_2}{(2\sqrt{ac})^2}\cdot\frac{\Gamma(\mu-2)}{(b+2\sqrt{ac})^{\mu-2}} + \ldots\ldots \qquad (6)$$

Digitized by Google

Nimmt man in der letzteren Gleichung $a=1$, $b=0$, $c=1$, so lässt sich mit Hülfe der Substitution $x^2=z$ der Werth des Integrales links ausfindig machen und man kommt dann auf das in §. 4 bewiesene Theorem zurück.

## §. 18.

Ausser den einfachen Integralen giebt es auch noch eine reichhaltige Klasse vielfacher Integrale, welche sich ebenfalls auf Gammafunktionen reduziren lassen und von denen wir die wichtigsten mittheilen wollen, indem wir dabei zugleich die allgemeinen Reduktionsmethoden auseinander setzen werden, mit welchen die Analysis durch die eleganten Betrachtungen von Lejeune Dirichlet, Liouville und Cauchy bereichert worden ist.

Um einen bestimmten Fall vor Augen zu haben, beschäftigen wir uns zunächst mit dem vielfachen Integrale

$$S = \iiint \dots \frac{P}{Q^{\mu}}\, dx\, dy\, dz\, \dots. \qquad (1)$$

worin $P$ und $Q$ ein paar beliebige Funktionen der Variablen $x$, $y$, $z$, ... bedeuten und $\mu$ als eine reelle positive Grösse vorausgesetzt wird; die Gränzen der einzelnen Integrationen mögen vor der Hand ganz willkührlich bleiben. Da man $Q$ immer als positive Grösse ansehen kann, weil das Vorzeichen von $P$ willkührlich ist, so liegt der Gedanke sehr nahe, $\frac{1}{Q^{\mu}}$ durch Anwendung der einfachsten Formel der Gammafunktionen selbst in ein bestimmtes Integral zu verwandeln, indem man schreibt:

$$\frac{1}{Q^{\mu}} = \frac{1}{\Gamma(\mu)} \int_0^{\infty} t^{\mu-1} e^{-Qt}\, dt$$

und diess gilt auch selbst für imaginäre $Q$, wenn nur der reelle Theil davon positiv ist, was man leicht erlangen kann. Mit Hülfe dieser Substitution wird

$$S = \frac{1}{\Gamma(\mu)} \int_0^{\infty} \iiint \dots t^{\mu-1} P e^{-Qt}\, dx\, dy\, dz \dots dt\,. \qquad (2)$$

Digitized by Google

Hier lässt sich nun in vielen Fällen eine solche Sonderung der Variablen vornehmen, dass sich das vorstehende vielfache Integral in ein Produkt einfacher Integrale verwandelt. Diess ist nämlich dann möglich, wenn sich $P$ und $Q$ so zerlegen lassen, dass

$$P = P_x . P_y . P_z \ \ldots.$$

$$Q = Q_0 + Q_x + Q_y + Q_z + \ldots..$$

ist, wobei $P_x$ und $Q_x$ Funktionen von $x$ allein, $P_y$ und $Q_y$ Funktionen von $y$ allein etc. bedeuten und $Q_0$ eine weder von $x$ noch von $y$, noch von $z$ etc. abhängige Grösse, also eine Constante ist. Die Differenzialformel in (2) nimmt jetzt folgende Gestalt an

$$t^{\mu-1} e^{-Q_0 t} P_x e^{-Q_x t} P_y e^{-Q_y t} P_z e^{-Q_z t} \ \ldots. \ dx\, dy\, dz \ \ldots. \ dt$$

und es wird jetzt durch Vereinigung der Grössen, welche blos $x$ oder nur $y$ etc. enthalten:

$$S = \frac{1}{\Gamma(\mu)} \int_0^\infty t^{\mu-1} e^{-Q_0 t} dt \int P_x e^{-Q_x t} dx \int P_y e^{-Q_y t} dy \ \ldots.$$

Lassen sich nun die einzelnen Integrationen in Bezug auf $x$, $y$, $z$, etc. ausführen, so dass man etwa

$$\left.\begin{aligned} U = \int P_x e^{-tQ_x} dx, \quad V = \int P_y e^{-tQ_y} dy \\ W = \int P_z e^{-tQ_z} dz, \ \ldots. \end{aligned}\right\} \quad (3)$$

hätte, wobei $t$ in allen diesen Integralen als arbiträre Constante auftritt, so ergiebt sich sehr einfach:

$$S = \frac{1}{\Gamma(\mu)} \int_0^\infty t^{\mu-1} e^{-Q_0 t} dt \, U\, V\, W \ \ldots. \quad (4)$$

und hiermit ist das vielfache Integral in (1) auf eine Quadratur zurückgeführt.

Eines der einfachsten Beispiele für diese Reduktionsmethode bildet die Annahme:

Digitized by Google

$$P = x^{l-1} e^{-ax} \cdot y^{m-1} e^{-bx} \cdot z^{n-1} e^{-cz} \cdot \ldots$$

$$Q = \varkappa + \alpha x + \beta y + \gamma z + \ldots$$

wobei die Integrationsgränzen sämmtlich 0 und $\infty$ sein mögen. Es ist dann

$$P_x = x^{l-1} e^{-ax}, \quad P_y = y^{m-1} e^{-by}, \ldots$$

$$Q_0 = \varkappa, \quad Q_x = \alpha x, \quad Q_y = \beta y, \ldots$$

folglich nach Nr. (3)

$$U = \int_0^\infty x^{l-1} e^{-ax} e^{-tax} dx = \frac{\Gamma(l)}{(a+at)^l}$$

$$V = \int_0^\infty y^{m-1} e^{-by} e^{-t\beta y} dy = \frac{\Gamma(m)}{(b+\beta t)^m}$$

u. s. f.

mithin nach (1) und (4)

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty \ldots \frac{x^{l-1} y^{m-1} z^{n-1} \ldots e^{-(ax+by+cz+\ldots)}}{(\varkappa + \alpha x + \beta y + \gamma z + \ldots)^\mu} dx\, dy\, dz \ldots$$

$$= \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,\Gamma(n) \ldots}{\Gamma(\mu)} \int_0^\infty \frac{t^{\mu-1} e^{-\varkappa t} dt}{(a+at)^l (b+\beta t)^m (c+\gamma t)^n \ldots} \qquad (5)$$

Reduzirt man in dieser sehr allgemeinen Formel die Variablen auf eine einzige $x$ und setzt $a = 1$ $\varkappa = 1$, so wird

$$\int_0^\infty \frac{x^{l-1} dx}{(1+\alpha x)^\mu} e^{-x} = \frac{\Gamma(l)}{\Gamma(\mu)} \int_0^\infty \frac{t^{\mu-1} dt}{(1+at)^l} e^{-t}$$

Digitized by Google

und wenn man $x$ und $\lambda$ für $t$ und $l$ setzt

$$\int_0^\infty \frac{x^{\lambda-1}\,dx}{(1+ax)^\mu}\,e^{-x} = \frac{\Gamma(\lambda)}{\Gamma(\mu)}\int_0^\infty \frac{x^{\mu-1}\,dx}{(1+ax)^\lambda}\,e^{-x}.$$

Man kann hieraus noch anderweite Resultate herleiten, wenn man nach einer der Grössen $\lambda$ oder $\mu$ differenzirt. So giebt die Differenziation nach $\lambda$

$$\int_0^\infty \frac{x^{\lambda-1}\,lx\,dx}{(1+ax)^\mu}\,e^{-x} = \frac{\Gamma(\lambda)}{\Gamma(\mu)}\int_0^\infty \frac{x^{\mu-1}\,dx}{(1+ax)^\lambda}\,l\left(\frac{1}{1+ax}\right)e^{-x}$$

$$+\frac{\Gamma'(\lambda)}{\Gamma(\mu)}\int_0^\infty \frac{x^{\mu-1}\,dx}{(1+ax)^\lambda}\,e^{-x}$$

oder weil

$$\Gamma'(\lambda) = \Gamma(\lambda)\frac{dl\Gamma(\lambda)}{d\lambda} = \Gamma(\lambda)\left\{-C + \int_0^1 \frac{1-x^{\lambda-1}}{1-x}\,dx\right\}$$

ist, wobei $C$ die Constante des Integrallogarithmus bedeutet,

$$\int_0^\infty \frac{x^{\lambda-1}\,lx\,dx}{(1+ax)^\mu}\,e^{-x} = \frac{\Gamma(\lambda)}{\Gamma(\mu)}\int_0^\infty \frac{x^{\mu-1}\,dx}{(1+ax)^\lambda}\,l\left(\frac{1}{1+ax}\right)e^{-x}$$

$$+\frac{\Gamma(\lambda)}{\Gamma(\mu)}\left\{-C + \int_0^1 \frac{1-x^{\lambda-1}}{1-x}\,dx\right\}\int_0^\infty \frac{x^{\mu-1}\,dx}{(1+ax)^\lambda}\,e^{-x}. \qquad (6)$$

Nimmt man in der Gleichung (5) $a=b=c\ \ldots\ =0$, so ergiebt sich sehr einfach

$$\int_0^\infty\int_0^\infty\int_0^\infty \cdots \frac{x^{l-1}\,y^{m-1}\,z^{n-1}\,\cdots}{(\varkappa+ax+\beta y+\gamma z+\ldots)^\mu}\,dx\,dy\,dz\,\ldots$$

$$= \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,\Gamma(n)\,\ldots.}{\alpha^l\,\beta^m\,\gamma^n\,\ldots.}\cdot\frac{\Gamma(\mu-l-m-n-\ldots.)}{\Gamma(\mu)\,\varkappa^{\mu-l-m-n-\ldots.}}. \qquad (7)$$

Digitized by Google

Man kann dieses Resultat noch verallgemeinern, wenn man für $x, y, z, \ldots$ neue Variable der Art einführt, dass

$$x = \xi^p, \; y = \eta^q, \; z = \zeta^r, \; \ldots.$$

ist. Die Differenzialformel links geht dann über in

$$\ldots pqr \cdot \frac{\xi^{pl-1}\,\eta^{qm-1}\,\zeta^{rn-1}\,\ldots}{(\varkappa + a\xi^p + \beta\eta^q + \gamma\zeta^r + \ldots)^\mu}\, d\xi\, d\eta\, d\zeta \ldots$$

während sich die Integrationsgränzen nicht ändern. Setzt man nun $\varkappa = 1$, $a = a^p$, $\beta = b^q$, $\gamma = c^r$, etc., $x, y, z, \ldots$ für $\xi, \eta, \zeta, \ldots$ und $\frac{l}{p}, \frac{m}{q}, \frac{n}{r}$, etc. für $l, m, n, \ldots$ so ergiebt sich

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty \ldots \frac{x^{l-1}\, y^{m-1}\, z^{n-1}\, \ldots}{(1 + a^p x^p + b^q y^q + c^r z^r + \ldots)^\mu}\, dx\, dy\, dz \ldots$$

$$= \frac{\Gamma(\frac{l}{p})\,\Gamma(\frac{m}{q})\,\Gamma(\frac{n}{r})\,\ldots}{pqr \ldots \Gamma(\mu)\, a^l\, b^m\, c^n\, \ldots}\, \Gamma(\mu - \frac{l}{p} - \frac{m}{q} - \frac{n}{r} - \ldots.) \qquad (8)$$

Für $\varkappa = 0$ wird das Integral auf der rechten Seite in (5) zu einem rein algebraischen, dessen Werth besonders in dem Falle, wo $l, m, n, \ldots$ ganze positive Zahlen sind, leicht gefunden werden kann. Man zerlegt nämlich den Bruch

$$\frac{1}{(a+\alpha t)^l\,(b+\beta t)^m\,(c+\gamma t)^n\,\ldots.}$$

in seine Partialbrüche und bringt so das fragliche Integral auf eine Reihe anderer von der Form

$$\int_0^\infty \frac{t^{\nu-1}\, dt}{(A+Bt)^s}$$

worin man $t = \frac{A}{B}x$ setzt und das neue Integral:

Digitized by Google

$$\int_0^\infty \frac{x^{\nu-1}\,dx}{(1+x)^s}$$

mit Hülfe von Gammafunktionen ausdrückt.

Sind in der Formel (5) $\mu$, $l$, $m$, $n$, ... sämmtlich ganze positive Zahlen, so lässt sich der Werth des Integrales rechts völlig entwickeln. Zunächst ist nämlich nach dem Vorigen klar, dass man das Integral auf eine Partie anderer von der Form

$$\int_0^\infty \frac{t^{\nu-1}\,dt}{(A+Bt)^s}\,e^{-\varkappa t}$$

reduziren kann, worin wir das nunmehr ganze positive $\nu-1$ mit $r$ und $\frac{A}{B}$ mit $\lambda$ bezeichnen wollen. Es kommt dann nur darauf an, den Werth von

$$\int_0^\infty \frac{t^r\,dt}{(\lambda+t)^{s+1}}\,e^{-\varkappa t} \tag{9}$$

zu finden, weil man hieraus durch Division mit $B^{s+1}$ und nachherige Substitution von $s-1$ für $s$ das obige Integral wieder herleiten könnte. Bezeichnen wir nun mit $\varphi(\varkappa, \lambda)$ den Werth des Integrales

$$\int_0^\infty \frac{dt}{\lambda+t}\,e^{-\varkappa t} \tag{10}$$

so ergiebt sich durch $r$malige Differenziation nach $\varkappa$

$$\int_0^\infty \frac{t^r\,dt}{\lambda+t}\,e^{-\varkappa t} = (-1)^r\,\frac{d^r\varphi(\varkappa, \lambda)}{d\varkappa^r}$$

und durch $s$malige Differenziation nach $\lambda$

$$(-1)^s\,1\,.\,2\,\ldots\,s\int_0^\infty \frac{t^r\,dt}{(\lambda+t)^{s+1}}\,e^{-\varkappa t} = (-1)^r\,\frac{d^{r+s}\varphi(\varkappa, \lambda)}{d\varkappa^r\,d\lambda^s}$$



Digitized by Google

d. i.

$$\int_0^\infty \frac{t^r\,dt}{(\lambda+t)^{s+1}}\,e^{-xt} = \frac{(-1)^{r+s}}{1.2.3\ldots s}\cdot\frac{d^{r+s}\varphi(x,\lambda)}{dx^r\,d\lambda^s}.$$

Das Integral in (10) findet sich aber sehr leicht mit Hülfe des Integrallogarithmus. Nach der Definition desselben ist nämlich

$$li(u) = \int_0^u \frac{dx}{lx} \quad \text{also} \quad li(e^{-a}) = \int_0^{e^{-a}} \frac{dx}{lx}$$

und wenn man hier

$$x = e^{-a}.e^{-z}$$

setzt, so wird

$$lx = -(a+z), \quad dx = -e^{-a}.e^{-z}\,dz$$

und da für $x = e^{-a}$ und $x = 0$, $z$ die Werthe $z = 0$ und $z = \infty$ bekommt, so ist jetzt

$$li(e^{-a}) = e^{-a}\int_\infty^0 \frac{dz}{a+z}e^{-z}$$

oder

$$\int_0^\infty \frac{dz}{a+z}e^{-z} = -e^a\,li(e^{-a})$$

woraus für $z = xt$, $a = x\lambda$, wenn nun $x$ eine reelle positive Grösse ist, folgt

$$\int_0^\infty \frac{dt}{\lambda+t}e^{-xt} = -e^{x\lambda}\,li(e^{-x\lambda})$$

womit $\varphi(x,\lambda)$ gefunden ist. Die in der Gleichung

$$\int_0^\infty \frac{t^r\,dt}{(\lambda+t)^{s+1}}\,e^{-xt} = \frac{(-1)^{r+s+1}}{1.2.3\ldots s}\cdot\frac{d^{r+s}}{dx^r\,d\lambda^s}\left\{e^{x\lambda}\,li(e^{-x\lambda})\right\}$$

Digitized by Google

angedeuteten Differenziationen sind nun leicht auszuführen, weil vermöge der Definition des Integrallogarithmus die Formeln gelten:

$$\frac{dli(u)}{du} = \frac{1}{lu} \quad \text{oder} \quad \frac{dli(e^{-v})}{dv} = \frac{e^{-v}}{v}.$$

Ein nicht minder bemerkenswerthes Beispiel für die in den Formeln (1) bis (4) auseinandergesetzte Reduktionsmethode liefert die Substitution

$$P = l\left(\frac{1}{x}\right) l\left(\frac{1}{y}\right) l\left(\frac{1}{z}\right) \ldots.$$

$$Q = x + ax + \beta y + \gamma z + \ldots.$$

wobei sämmtliche Integrationsgränzen 0 und $\infty$ sein mögen. Es wird jetzt unter Anwendung der Formel (25) in §. 14 für $b = 0$,

$$U = \int_0^\infty l\left(\frac{1}{x}\right) e^{-tax}\, dx = \frac{C + la + lt}{at}$$

$$V = \int_0^\infty l\left(\frac{1}{x}\right) e^{-t\beta x}\, dx = \frac{C + l\beta + lt}{\beta t}$$

u. s. f.

wobei wir zur Abkürzung

$$C + la = a, \quad C + l\beta = b, \quad C + l\gamma = c, \ldots. \tag{11}$$

setzen wollen. Nach Formel (1) und (4) ergiebt sich nun unter der Voraussetzung, dass $n$ Variable vorhanden sind

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty \ldots \frac{l\left(\frac{1}{x}\right) l\left(\frac{1}{y}\right) l\left(\frac{1}{z}\right) \ldots.}{(x + ax + \beta y + \gamma z + \ldots)^\mu} dx\, dy\, dz \ldots.$$

$$= \frac{1}{\Gamma(\mu)\alpha\beta\gamma \ldots} \int_0^\infty t^{\mu-n-1} e^{-xt} (a + lt)(b + lt)(c + lt) \ldots. dt. \tag{12}$$

Der Werth des Integrales rechts kann immer angegeben werden; denn durch Entwickelung des Produktes $(a + lt)(b + lt) \ldots$ reduzirt

Digitized by Google

sich das Integral auf eine Reihe anderer, welche unter der gemeinschaftlichen Form

$$\int_0^\infty t^{\nu-1} e^{-\varkappa t} (lt)^s \, dt$$

stehen, worin $s$ eine positive ganze Zahl bedeutet. Andererseits ist aber das vorliegende Integral

$$\frac{d^s}{d\nu^s} \int_0^\infty t^{\nu-1} e^{-\varkappa t} dt = \frac{d^s \left\{ \Gamma(\nu) \varkappa^{-\nu} \right\}}{d\nu^s}.$$

und diese Differenziation ist leicht auszuführen, wenn man successive immer den Satz anwendet:

$$\frac{d\Gamma(\nu)}{d\nu} = \Gamma(\nu) \frac{dl\Gamma(\nu)}{d\nu}$$

$$= \Gamma(\nu) \left\{ -C + \frac{1}{1} \frac{\nu-1}{\nu} + \frac{1}{2} \frac{\nu-1}{\nu+1} + \frac{1}{3} \frac{\nu-1}{\nu+2} + \cdots \right\}.$$

## §. 19.

Nicht immer sind, wie in den bisher betrachteten Integralen, die Gränzen für die einzelnen Integrationen unmittelbar bestimmt, im Gegentheil kommt sogar bei den meisten vielfachen Integralen und zwar fast bei allen denen, auf welche man in der mathematischen Physik stösst, der Fall vor, dass nur eine Bedingung angegeben ist, welcher die Variablen der Integrationen genügen müssen. Will man z. B. den kubischen Inhalt einer Kugel mit dem Halbmesser $r$ nach der Formel

$$\iiint dx \, dy \, dz$$

bestimmen, so muss man die Integrationsgränzen so bestimmen, dass $x$, $y$, $z$ keine anderen Werthe annehmen, als solche, welche die Bedingung

$$x^2 + y^2 + z^2 \leqq r^2$$

Digitized by Google

erfüllen; denn wenn wir uns $x$, $y$, $z$ als Coordinaten irgend eines Punktes denken, so darf sich die Integration (Addition der Elemente) nur auf alle die Punkte des Raumes erstrecken, welche nicht ausserhalb der durch die Gleichung $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ charakterisirten Kugelfläche liegen.

Im Allgemeinen ist nun die Reduktion von dergleichen vielfachen Integralen viel schwerer als die von solchen, in denen die Gränzen unmittelbar bestimmt sind; es giebt aber eine Form derselben, bei welcher diese Reduktion durchaus keinen Schwierigkeiten unterliegt, die gedachte sehr allgemeine Form ist nämlich folgende

$$S = \iiint \dots x^{l-1} y^{m-1} z^{n-1} \dots f(x+y+z+\dots)\, dx\, dy\, dz \dots \quad (1)$$

in welcher $x$, $y$, $z$, ... alle diejenigen positiven Werthe annehmen sollen, die der Bedingung

$$x + y + z + \dots \leqq \varkappa \quad (2)$$

Genüge leisten.

Setzen wir zuvörderst nur zwei Variable $x$ und $y$ voraus, so ist

$$S = \iint x^{l-1} y^{m-1} f(x+y)\, dx\, dy$$

$$x + y \leqq \varkappa$$

und wenn wir das Integral in der Form

$$S = \int x^{l-1} dx \int y^{m-1} f(x+y)\, dy$$

darstellen, so sind die Werthe, welche $y$ annehmen kann, offenbar in dem Intervalle $y = 0$ bis $y = \varkappa - x$ enthalten, nachher aber steht dem $x$ noch der Spielraum von $x = 0$ bis $x = \varkappa$ offen; in der That erfüllen auch jedes $y$ zwischen 0 und $\varkappa - x$, und jedes $x$ zwischen 0 und $\varkappa$ die aufgestellte Bedingung. Es ist demnach

$$S = \int_0^{\varkappa} x^{l-1} dx \int_0^{\varkappa - x} y^{m-1} f(x+y)\, dy\,. \quad (3)$$

In so fern das nach $y$ genommene Integral eine Funktion von $x$ und $\varkappa$ allein darstellt, möge hier zur Abkürzung:

Digitized by Google

$$\int_0^{x-x} y^{m-1} f(x+y)\,dy = F(x, \varkappa) \tag{4}$$

sein, so dass

$$S = \int_0^{\varkappa} x^{l-1} F(x, \varkappa)\,dx \tag{5}$$

wird. Durch Differenziation dieser Gleichung unter Berücksichtigung des Satzes: dass für

$$S = \int_a^b \Phi(x, \varkappa)\,dx$$

und von $\varkappa$ abhängige $a$ und $b$,

$$\frac{dS}{d\varkappa} = \Phi(b, \varkappa)\frac{db}{d\varkappa} - \Phi(a, \varkappa)\frac{da}{d\varkappa} + \int_a^b \frac{d\Phi(x, \varkappa)}{d\varkappa}\,dx$$

ist *), ergiebt sich in unserem Falle

$$\frac{dS}{d\varkappa} = \varkappa^{l-1} F(\varkappa, \varkappa) + \int_0^{\varkappa} x^{l-1} \frac{dF(x, \varkappa)}{d\varkappa}\,dx .$$

---

*) Giebt man in der Gleichung

$$S = \int_a^b \Phi(x, \varkappa)\,dx$$

dem $\varkappa$ einen Zuwachs $\Delta\varkappa$, so werden, weil $a$ und $b$ von $\varkappa$ abhangen sollen, etwa $a + \Delta a$ und $b + \Delta b$ an die Stelle von $a$ und $b$ treten und $S$ wird um $\Delta S$ zunehmen. Hieraus folgt

$$\Delta S = \int_{a+\Delta a}^{b+\Delta b} \Phi(x, \varkappa + \Delta\varkappa)\,dx - \int_a^b \Phi(x, \varkappa)\,dx .$$

Zerlegt man das erste Integral in die drei anderen

$$-\int_a^{a+\Delta a} \Phi(x, \varkappa+\Delta\varkappa)\,dx + \int_a^b \Phi(x, \varkappa+\Delta\varkappa)\,dx + \int_b^{b+\Delta b} \Phi(x, \varkappa + \Delta\varkappa)\,dx$$

und dividirt nachher mit $\Delta\varkappa$, so ergiebt sich leicht:

Digitized by Google

Aus Nr. (4) folgt aber unmittelbar

$$F(\varkappa,\ \varkappa) = 0, \quad \frac{dF(x,\ \varkappa)}{d\varkappa} = (\varkappa - x)^{m-1} f(\varkappa)$$

---

$$\left.\begin{aligned} \frac{\Delta S}{\Delta \varkappa} = \frac{1}{\Delta \varkappa}\int_b^{b+\Delta b} \Phi(x,\ \varkappa+\Delta\varkappa)\,dx - \frac{1}{\Delta\varkappa}\int_a^{a+\Delta a} \Phi(x,\ \varkappa+\Delta\varkappa)\,dx \\ + \int_a^b \frac{\Phi(x,\ \varkappa+\Delta\varkappa) - \Phi(x,\ \varkappa)}{\Delta\varkappa}\,dx\,. \end{aligned}\right\} \quad (A)$$

Setzen wir das unbestimmte Integral

$$\int \Phi(x,\ \varkappa)\,dx = {}^1\Phi(x,\ \varkappa) \quad (B)$$

so ist

$$\frac{1}{\Delta\varkappa}\int_b^{b+\Delta b} \Phi(x,\ \varkappa+\Delta\varkappa)\,dx = \frac{{}^1\Phi(b+\Delta b,\ \varkappa+\Delta\varkappa) - {}^1\Phi(b,\ \varkappa+\Delta\varkappa)}{\Delta\varkappa}$$

$$= \frac{{}^1\Phi(b+\Delta b,\ \varkappa+\Delta\varkappa) - {}^1\Phi(b,\ \varkappa+\Delta\varkappa)}{\Delta b}\cdot\frac{\Delta b}{\Delta\varkappa}$$

und durch Uebergang zur Gränze für unendlich abnehmende $\Delta\varkappa$ und $\Delta b$

$$Lim\ \frac{1}{\Delta\varkappa}\int_b^{b+\Delta b} \Phi(x,\ \varkappa+\Delta\varkappa)\,dx = \frac{d\,{}^1\Phi(b,\ \varkappa)}{db}\cdot\frac{db}{d\varkappa}$$

nach Formel (B) ist aber

$$\frac{d\,{}^1\Phi(x,\ \varkappa)}{dx} = \Phi(x,\ \varkappa) \quad \text{mithin} \quad \frac{d\,{}^1\Phi(b,\ \varkappa)}{db} = \Phi(b,\ \varkappa)$$

und nach dem Vorigen

$$Lim\ \frac{1}{\Delta\varkappa}\int_b^{b+\Delta b} \Phi(x,\ \varkappa+\Delta\varkappa)\,dx = \Phi(b,\ \varkappa)\,\frac{db}{d\varkappa}. \quad (C)$$

Ebenso ist

$$Lim\ \frac{1}{\Delta\varkappa}\int_a^{a+\Delta a} \Phi(x,\ \varkappa+\Delta\varkappa)\,dx = \Phi(a,\ \varkappa)\,\frac{da}{d\varkappa}. \quad (D)$$

Berücksichtigt man endlich, dass unter den bereits auf S. 6 angegebenen Umständen:

Digitized by Google

und also nach dem Vorhergehenden

$$\frac{dS}{dx} = \int_0^x x^{l-1}(x-x)^{m-1} f(x)\,dx$$

oder wenn man $x = xs$ setzt

$$\frac{dS}{dx} = x^{l+m-1} f(x) \int_0^1 s^{l-1}(1-s)^{m-1} ds$$

$$= x^{l+m-1} f(x) \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)}{\Gamma(l+m)}$$

und umgekehrt

$$S = \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)}{\Gamma(l+m)} \left\{ \int x^{l+m-1} f(x)\,dx + Const \right\}$$

wo nun die Constante so bestimmt werden muss, dass für $x = 0$, $S = 0$ wird [gemäss Nr. (5)]. Es ist mithin

$$S = \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)}{\Gamma(l+m)} \int_0^x x^{l+m-1} f(x)\,dx$$

oder auch wegen der Bedeutung von $S$ und wegen der Gleichgültigkeit des Integrationsbuchstabens

$$\left.\begin{aligned} &\int_0^x x^{l-1}\,dx \int_0^{x-x} y^{m-1} f(x+y)\,dy \\ &= \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)}{\Gamma(l+m)} \int_0^x t^{l+m-1} f(t)\,dt\,. \end{aligned}\right\} \quad (6)$$

---

$$Lim \int_a^b \frac{\Phi(x, x+\Delta x) - \Phi(x, x)}{\Delta x}\,dx = \int_a^b \frac{d\Phi(x, x)}{dx}\,dx \qquad (E)$$

ist, und geht mit Benutzung der Gleichungen (C), (D) und (E) in (A) zur Gränze für unendlich abnehmende $\Delta x$ über, so ergiebt sich unmittelbar die im Texte angeführte Formel.

Digitized by Google

Etwas rascher gelangt man zu demselben Resultate, wenn man in dem Doppelintegrale

$$\int_0^{\varkappa} \int_x^{\varkappa - x} x^{l-1} y^{m-1} f(x+y)\, dx\, dy$$

erst $y = t - x$ also $dy = dt$ und nachher $x = ts$, also $dx = tds$ setzt, wofür man kurz sagen kann, dass $x + st$, $y = (1-s)t$ genommen und in der ersten Substitution $s$ in der zweiten $t$ als neue Veränderliche betrachtet worden ist. Es wird dann

$$\iint x^{l-1} y^{m-1} f(x+y)\, dx\, dy = \iint s^{l-1}(1-s)^{m-1} t^{l+m-1} f(t)\, ds\, dt$$

$$= \int s^{l-1}(1-s)^{m-1} ds \int t^{l+m-1} f(t)\, dt$$

Die Gränzen für $t$ bestimmen sich durch die Gleichungen $y = 0$ und $y = \varkappa - x$, die hier in $(1-s)t = 0$, $(1-s)t = \varkappa - st$ übergehen, woraus $t = 0$, $t = \varkappa$ folgt; die Gränzen für $s$ ergeben sich aus den Gleichungen $x = 0$, $x = \varkappa$ oder $ts = 0$, $ts = \varkappa$, nämlich $s = 0$, $s = \frac{\varkappa}{t}$, oder weil $t$ nach Ausführung der ersten Integration den Werth $\varkappa$ angenommen hat, $s = 0$ und $s = 1$. Mittelst dieser Substitutionen kommen wir auf die Formel (6) zurück.

Betrachten wir jetzt den Fall eines dreifachen Integrales, oder

$$S = \int x^{l-1} dx \int y^{m-1} dy \int z^{n-1} f(x+y+z)\, dz$$

$$x + y + z \leqq \varkappa$$

so kann erstlich $x$ das Intervall 0 bis $\varkappa$ durchlaufen, dann müssen aber $y$ und $z$ so gewählt werden, dass $y + z \geqq \varkappa - x$ ist; bezeichnen wir $\varkappa - x$ zur Abkürzung mit $\varkappa'$, so befinden wir uns mit den Integrationen in Bezug auf $y$ und $z$ für $y + z \leqq \varkappa'$ ganz in dem Falle, wie früher mit den Integrationen in Beziehung auf $x$ und $y$ für $x + y \leqq \varkappa$. Es ist demnach

$$S = \int_0^{\varkappa} x^{l-1} dx \int_0^{\varkappa'} y^{m-1} dy \int_0^{\varkappa'-y} z^{n-1} f(x+y+z)\, dz .$$



Digitized by Google

Das Doppelintegral

$$\int_0^{x'} y^{m-1}\,dy \int_0^{x'-y} z^{n-1} f(x+y+z)\,dz$$

lässt sich aber nach der so eben entwickelten Regel Nr. (6) auf das einfachere:

$$\frac{\Gamma(m)\,\Gamma(n)}{\Gamma(m+n)} \int_0^{x'} t^{m+n-1} f(x+t)\,dt$$

reduziren und wegen $x' = x - x$ wird nun

$$S = \frac{\Gamma(m)\,\Gamma(n)}{\Gamma(m+n)} \int_0^{x} x^{l-1}\,dx \int_0^{x-x} t^{m+n-1} f(x+t)\,dt$$

und bei nochmaliger Anwendung derselben Regel

$$S = \frac{\Gamma(m)\,\Gamma(n)}{\Gamma(m+n)} \cdot \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m+n)}{\Gamma(l+m+n)} \int_0^{x} u^{l+m+n-1} f(u)\,du$$

oder wenn man wieder $t$ für $u$ schreibt

$$S = \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,\Gamma(n)}{\Gamma(l+m+n)} \int_0^{x} t^{l+m+n-1} f(t)\,dt\,. \qquad (7)$$

Man übersieht leicht den Fortgang dieser Reduktionen. Bei vier Variablen $x$, $y$, $z$, $s$, z. B. wo

$$x + y + z + s \leqq x$$

sein soll, kann man erstlich $x$ von 0 bis $x$ gehen lassen, und muss dann $y$, $z$, $s$ so wählen, dass $y + z + s \leqq x - x$ ist, wobei $x - x = x'$ sein möge. Um nun wieder die Bedingung $y + z + s \leqq x'$ zu erfüllen, giebt man $y$ alle Werthe von $y = 0$ bis $y = x'$ und wählt $z$ und $s$ so, dass $z + s \leqq x' - y \leqq x''$ bleibt, wo $x''$ zur Abkürzung dient. Endlich lässt man $z$ von 0 bis $x''$ gehen und setzt $s = x'' - z$. Es ist demnach bei vier Variablen für:

Digitized by Google

$$x - x = x', \quad x' - y = x'',$$

$$S = \int_0^x x^{l-1}\,dx \int_0^{x'} y^{m-1}\,dy \int_0^{x''} z^{n-1}\,dz \int_0^{x''-z} s^{p-1} f(x+y+z+s)\,ds$$

und wenn man das dreifache Integral in Bezug auf $y$, $z$, $s$ nach Formel (7) und das nachher übrig bleibende doppelte nach Formel (6) reduzirt, so ergiebt sich

$$S = \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,\Gamma(n)\,\Gamma(p)}{\Gamma(l+m+n+p)} \int_0^x t^{l+m+n+p-1} f(t)\,dt$$

und überhaupt gilt die allgemeine Reduktionsformel:

$$\left.\begin{aligned} &\iiint \ldots x^{l-1} y^{m-1} z^{n-1} \ldots f(x+y+z+\ldots)\,dx\,dy\,dz \ldots \\ &= \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,\Gamma(n) \ldots}{\Gamma(l+m+n+\ldots)} \int_0^x t^{l+m+n+\ldots-1} f(t)\,dt \end{aligned}\right\} \quad (8)$$

wobei die Integrationen sich auf alle die positiven $x$, $y$, $z$, $\ldots$ erstrecken, welche der Bedingung

$$x + y + z + \ldots \leqq x \quad (9)$$

Genüge leisten.

Eines der einfachsten Beispiele für dieses sehr bemerkenswerthe, von Liouville gefundene Theorem giebt die Supposition $f(x+y+z+\ldots) = 1$; wendet man auf der rechten Seite die Relation $\mu\,\Gamma(\mu) = \Gamma(1+\mu)$ an, so wird

$$\iiint \ldots x^{l-1} y^{m-1} z^{n-1} \ldots dx\,dy\,dz \ldots$$
$$= \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,\Gamma(n) \ldots}{\Gamma(1+l+m+n+\ldots)}\, x^{l+m+n+\ldots}.$$

Für

$$x = \left(\frac{\xi}{a}\right)^p, \quad y = \left(\frac{\eta}{b}\right)^q, \quad z = \left(\frac{\zeta}{c}\right)^r, \ldots$$

und $x = 1$ ergiebt sich hieraus leicht:

Digitized by Google

$$\iiint \ldots \xi^{pl-1}\,\eta^{qm-1}\,\zeta^{rn-1} \ldots d\xi\,d\eta\,d\zeta \ldots$$

$$= \frac{a^{pl}\,b^{qm}\,c^{rn} \ldots}{p\,q\,r \ldots} \cdot \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,\Gamma(n) \ldots}{\Gamma(1+l+m+n+\ldots)}$$

wobei die Bedingung

$$\left(\frac{\xi}{a}\right)^p + \left(\frac{\eta}{b}\right)^q + \left(\frac{\zeta}{c}\right)^r + \ldots \leqq 1$$

erfüllt sein muss. Schreibt man noch $x$, $y$, $z$ für $\xi$, $\eta$, $\zeta$ und $\frac{l}{p}$, $\frac{m}{q}$, $\frac{n}{r}$, ... für $l$, $m$, $n$, ..., so gelangt man zur folgenden Formel:

$$\left.\begin{aligned} &\iiint \ldots x^{l-1}\,y^{m-1}\,z^{n-1} \ldots dx\,dy\,dz \ldots \\ &= \frac{a^l\,b^m\,c^n \ldots}{pqr\ldots} \cdot \frac{\Gamma(\frac{l}{p})\,\Gamma(\frac{m}{q})\,\Gamma(\frac{n}{r}) \ldots}{\Gamma(1+\frac{l}{p}+\frac{m}{q}+\frac{n}{r}+\ldots)} \end{aligned}\right\} \quad (10)$$

wobei sich die Integration auf alle positive, die Bedingung

$$\left(\frac{x}{a}\right)^p + \left(\frac{y}{b}\right)^q + \left(\frac{z}{c}\right)^r + \ldots \leqq 1 \qquad (11)$$

erfüllende $x$, $y$, $z$, ... erstreckt.

Die soeben aufgestellte Formel dient zur Auflösung einer grossen Anzahl von Aufgaben über die Bestimmung der Volumina, Schwerpunkte und Trägheitsmomente verschiedener Körper; so giebt z. B. die Formel

$$\iiint dx\,dy\,dz = \frac{abc}{pqr} \cdot \frac{\Gamma(\frac{1}{p})\,\Gamma(\frac{1}{q})\,\Gamma(\frac{1}{r})}{\Gamma(1+\frac{1}{p}+\frac{1}{q}+\frac{1}{r})}$$

den Inhalt desjenigen Raumes an, welcher von den positiven Theilen der Coordinatenebenen und der durch die Gleichung:

Digitized by Google

$$\left(\frac{x}{a}\right)^p + \left(\frac{y}{b}\right)^q + \left(\frac{z}{c}\right)^r = 1$$

charakterisirten Fläche begränzt wird. Sind $p$, $q$, $r$ gerade Zahlen oder Brüche, welche dergleichen zu Zählern haben, so ist jene Fläche eine geschlossene, die durch die Coordinatenebenen in congruente Octanten zerlegt wird, und dann ist der blos von der Fläche eingeschlossene Raum das Achtfache des obigen Ausdrucks. So findet man z. B. für $p = q = r = z$, dass $\frac{4}{3} abc\pi$ der cubische Inhalt eines Ellipsoides mit den Achsen $a$, $b$, $c$ ist, und ebenso leicht, dass der von der Fläche

$$\left(\frac{x}{a}\right)^4 + \left(\frac{y}{b}\right)^4 + \left(\frac{z}{c}\right)^4 = 1$$

begränzte Raum durch

$$\frac{1}{6} abc \frac{\Gamma(\frac{1}{4})^3}{\Gamma(\frac{3}{4})}$$

ausgedrückt wird und demnach blos von dem Integrale $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}$ abhängt, welches auch zur Rektifikation der Lemniscate dient.

Durch Einführung neuer Variablen kann man übrigens die gefundene Gleichung

$$\int_0^x x^{l-1}\,dx \int_0^{x-x} y^{m-1}\,dy \int_0^{x-x-y} z^{n-1}\,dz \ldots \int_0^{x-x-y-\ldots-u} v^{s-1} f(x+y+\ldots+v)\,dv$$

$$= \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,\Gamma(n)\,\ldots\,\Gamma(s)}{\Gamma(l+m+n+\ldots+s)} \int_0^x t^{l+m+n+\ldots+s-1} f(t)\,dt$$

noch auf eine andere ebenso elegante als brauchbare Form bringen. Setzt man zunächst $x = \varkappa - \xi$ und berücksichtigt, dass überhaupt immer

$$\int_0^\varkappa \Psi(x)\,dx = \int_0^\varkappa \Psi(\varkappa - \xi)\,d\xi$$

ist, so geht die linke Seite in:

Digitized by Google

$$\int_0^x (x-\xi)^{l-1} d\xi \int_0^{\xi} y^{m-1} dy \int_0^{\xi-y} z^{n-1} dz \ldots \int_0^{\xi-y-z-\ldots-u} v^{s-1} f(x-\xi+y+\ldots+v)\, dv$$

über. Für $y = \xi - \eta$, wo nun $\eta$ die neue Variable und $\xi$ constant für die Integration nach $\eta$ ist, wird hieraus

$$\int_0^x (x-\xi)^{l-1} d\xi \int_0^{\xi} (\xi-\eta)^{m-1} d\eta \ldots \int_0^{\eta-z-\ldots-u} v^{s-1} f(x-\eta+z+\ldots+v)\, dv$$

führt man überhaupt statt der früheren Variablen $x$, $y$, $z$, .... $u$, $v$ die neuen $\xi$, $\eta$, $\zeta$, ... $\chi$, $\omega$ ein, welche mit jenen durch die Gleichungen

$$x = x - \xi,\ y = \xi - \eta,\ z = \eta - \zeta,\ \ldots,\ v = \chi - \omega$$

verbunden sind, so ergiebt sich ohne Schwierigkeit

$$\int_0^x (x-\xi)^{l-1} d\xi \int_0^{\xi} (\xi-\eta)^{m-1} d\eta \ldots\ldots \int_0^{\chi} (\chi-\omega)^{s-1} f(x-\omega)\, d\omega$$

$$= \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,\ldots\,\Gamma(s)}{\Gamma(l+m+\ldots+s)} \int_0^x t^{l+m+\ldots+s-1} f(t)\, dt\ .$$

Setzt man weiter $f(x-\omega) = \Phi(\omega)$, also $f(t) = \Phi(x-t)$ und substituirt auf der rechten Seite statt $t$ die neue Variable $x - \tau$, so gelangt man zu dem sehr eleganten Theoreme:

$$\left.\begin{aligned} &\int_0^x (x-\xi)^{l-1} d\xi \int_0^{\xi} (\xi-\eta)^{m-1} d\eta \ldots\ldots \int_0^{\chi} (\chi-\omega)^{s-1}\, \Phi(\omega)\, d\omega \\ &= \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,\ldots\,\Gamma(s)}{\Gamma(l+m+\ldots+s)} \int_0^x (x-\tau)^{l+m+\ldots+s-1}\, \Phi(\tau)\, d\tau\ . \end{aligned}\right\} \quad (12)$$

Von besonderem Interesse ist hier der Fall

$$l + m + n + \ldots + s = 1 \quad (13)$$

in welchem wir

$$\int \Phi(\tau)\, d\tau = q(\tau)$$

Digitized by Google

setzen wollen, woraus $\Phi(x) = \varphi'(x)$, also auch $\Phi(\omega) = \varphi'(\omega)$ folgt. Es wird dann:

$$\left.\begin{aligned}\int_0^{\varkappa}(\varkappa-\xi)^{l-1}d\xi\int_0^{\xi}(\xi-\eta)^{m-1}d\eta\ \ldots\ \int_0^{\chi}(\chi-\omega)^{s-1}\varphi'(\omega)\,d\omega\\ = \Gamma(l)\,\Gamma(m)\,\ldots\,\Gamma(s)\,[\varphi(\varkappa)\ -\ \varphi(o)]\end{aligned}\right\}\quad(14)$$

und da hier $\varkappa$ eine ganz willkührliche Grösse bezeichnet, so dient diese Formel u. A. auch um eine willkührliche Funktion $\varphi(\varkappa)$ in ein vielfaches bestimmtes Integral zu verwandeln. — Reduzirt man die verschiedenen Variablen auf zwei, so wird $m = 1 - l$

$$\int_0^{\varkappa}(\varkappa-\xi)^{l-1}d\xi\ \int_0^{\xi}\frac{\varphi'(\eta)\,d\eta}{(\xi-\eta)^{l}} = \frac{\pi}{\sin nl}\,[\varphi(\varkappa)\ -\ \varphi(o)]$$

und hierin spricht sich ein zuerst von Abel auf anderem Wege entwickeltes Resultat aus *). Man kann dasselbe auch in etwas anderer

---

*) In Crelle's *Journal Bd. I. S.* 153 beweist Abel zuerst den speziellen Fall $\varphi(\varkappa) = \varkappa^{\alpha}$, was mittelst der Substitutionen $\eta = \xi v$, $\xi = \varkappa u$ sehr leicht ist. In der so entstandenen Gleichung

$$\int_0^{\alpha}(\varkappa-\xi)^{l-1}d\xi\ \int_0^{\xi}\frac{\alpha\eta^{\alpha-1}d\eta}{(\xi-\eta)^{l}} = \frac{\pi}{\sin nl}\,\varkappa^{\alpha}$$

sieht nun der Verf. $\alpha$ als variabel an, multiplizirt beiderseits mit $f(\alpha)\,d\alpha$, integrirt nach $\alpha$ zwischen willkührlichen Gränzen und setzt dabei

$$\int\varkappa^{\alpha}f(\alpha)\,d\alpha = \varphi(\varkappa)\ \text{ also }\ \int\alpha\eta^{\alpha-1}f(\alpha)\,d\alpha = \varphi'(\eta)$$

wodurch er ebenfalls zum allgemeinen Theoreme gelangt. Diese Ableitung ist jedoch nicht streng, da man nicht voraussetzen darf, dass sich jede Funktion $\varphi(\varkappa)$ durch ein bestimmtes Integral von obiger Form ausdrücken lassen muss, oder mit anderen Worten, es fehlt der Beweis, dass die Gleichung

$$\varphi(\varkappa) = \int_{\alpha}^{\beta}\varkappa^{\vartheta}f(\vartheta)\,d\vartheta,$$

worin $f(\vartheta)$ eine noch zu bestimmende Funktion von $\vartheta$ bezeichnet, für jedes gegebene $\varphi(\varkappa)$ auflösbar ist.

Digitized by Google

Form darstellen, indem man sagt: sind zwei Funktionen $\varphi$ und $\psi$ so mit einander verbunden, dass

$$\int_0^\xi \frac{\varphi'(\eta)\,d\eta}{(\xi-\eta)^l} = \psi(\xi) \tag{15}$$

ist, so erhält man umgekehrt $\varphi$ durch $\psi$ ausgedrückt mittelst der Formel

$$\varphi(x) - \varphi(o) = \frac{\sin \pi l}{\pi} \int_0^x (x-\xi)^{l-1} \psi(\xi)\,d\xi . \tag{16}$$

Der geniale, leider zu früh verstorbene Urheber dieses Theoremes macht hiervon eine sehr nette Anwendung auf das dynamische Problem von der Bewegung eines schweren Punktes auf einer gegebenen Curve. Denkt man sich nämlich in einer Vertikalebene eine Curve construirt, durch den tiefsten Punkt derselben, der als Coordinatenanfang genommen wird, in vertikaler Richtung die Achse der $x$ gezogen, so wird derjenige Bogen der Curve, welchem die Abscissen $x=0$ und $x=h$ entsprechen (dessen Projektion auf die Abscissenachse $=h$ ist) in der Zeit

$$t = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_0^h \frac{ds}{\sqrt{h-x}} \tag{17}$$

durchlaufen, in welcher Gleichung $ds$ das Bogenelement der Curve, also $\frac{ds}{dt}$ die momentane Geschwindigkeit des Beweglichen im Punkte $xy$ und $g$ die Beschleunigung der Schwere bezeichnet. In dieser Formel ist nun $s$ als Funktion von $x$ gegeben etwa $s=\varphi(x)$ und man findet die Abhängigkeit des $t$ von $h$ etwa $t=\psi(h)$. Kehrt man nun die Aufgabe um und verlangt diejenige Curve zu finden, für welche die Fallzeit $t$ eine gegebene Funktion von $h$ ist, so muss man umgekehrt $s$ durch $t$ oder $\varphi$ durch $\psi$ ausdrücken. Vergleicht man (15) mit (17), indem man $\eta=x$, $\xi=h$, $l=\frac{1}{2}$ und $\varphi(x):\sqrt{\pi g}$ für $\varphi(x)$ setzt, so wird $\psi(\xi)=\psi(h)=t$ und die Formel (16) giebt jetzt

$$\frac{1}{\sqrt{2g}}\left[\varphi(x) - \varphi(o)\right] = \frac{1}{\pi} \int_0^x \frac{\psi(h)\,dh}{\sqrt{x-h}}$$

Digitized by Google

oder wenn man $x$ für das beliebige $\varkappa$ schreibt und bemerkt, dass für $x=0$ sich der Bogen $\varphi(x)$ annullirt

$$\varphi(x) = \frac{\sqrt{2g}}{\pi} \int_0^x \frac{\psi(h)\,dh}{\sqrt{x-h}}$$

oder

$$s = \frac{\sqrt{2g}}{\pi} \int_0^x \frac{t\,dh}{\sqrt{x-h}} \qquad (18)$$

wobei $x$ constant für die Integration nach $h$ bleibt. Hat man auf diese Weise $s$ als Funktion von $x$ bestimmt, so kann man nachher die Gleichung der Curve in rechtwinklichen Coordinaten mittelst der Formel

$$y = \int_0^x dx \sqrt{\left(\frac{ds}{dx}\right)^2 - 1}$$

entwickeln, wobei die untere Integrationsgränze sich aus der Bemerkung ergiebt, dass für $x=0$ auch $y=0$ sein muss, weil in diesem Falle schon $s=0$ war.

## §. 20.

Die erste unter den Methoden, welche vorhin zur Reduktion des Doppelintegrales

$$\int_0^x x^{l-1}\,dx \int_0^{x-x} y^{m-1} f(x+y)\,dy$$

dienten, eignet sich vorzüglich zur Transformation aller unter der allgemeinen Form

$$S = \int_0^1 dx \int_0^{\varphi(x)} dy\, f(x,y) \qquad (1)$$

stehenden Integrale und diess ist in so fern von Werth, als das Problem der Complanation von Oberflächen immer auf solche Integrale führt.



Digitized by Google

Wir sehen nämlich $S$ als einen speziellen Fall des allgemeineren Integrales

$$T = \int_0^{\varkappa} dx \int_0^{\varphi(x,\varkappa)} dy\, f(x,y) \tag{2}$$

an, worin $\varkappa$ eine willkührlich in $\varphi(x)$ eingetragene Constante bezeichnet; zugleich setzen wir voraus, dass die verallgemeinerte Funktion $\varphi(x,\varkappa)$ für $\varkappa = 1$ auf $\varphi(x)$ zurückkomme und für $x = \varkappa$ sich annullire. Nehmen wir zur Abkürzung

$$\int_0^{\varphi(x,\varkappa)} dy\, f(x,y) = F(x,\varkappa) \tag{3}$$

also

$$T = \int_0^{\varkappa} F(x,\varkappa)\, dx$$

so ergiebt sich jetzt durch partielle Differenziation in Bezug auf $\varkappa$

$$\frac{dT}{d\varkappa} = F(\varkappa,\varkappa) + \int_0^{\varkappa} \frac{dF(x,\varkappa)}{d\varkappa}\, dx. \tag{4}$$

Zufolge von Nr. (3) ist aber

$$F(\varkappa,\varkappa) = \int_0^{\varphi(\varkappa,\varkappa)} dy\, f(x,y) = \int_0^{0} dy\, f(x,y) = 0$$

$$\frac{dF(x,\varkappa)}{d\varkappa} = f[x, \varphi(x,\varkappa)] \frac{d\varphi(x,\varkappa)}{d\varkappa}.$$

Die Substitution beider Ausdrücke in (4) giebt jetzt

$$\frac{dT}{d\varkappa} = \int_0^{\varkappa} f[x, \varphi(x,\varkappa)] \left(\frac{d\varphi(x,\varkappa)}{d\varkappa}\right) dx$$

oder

$$T = \int d\varkappa \int_0^{\varkappa} f[x, \varphi(x,\varkappa)] \left(\frac{d\varphi(x,\varkappa)}{d\varkappa}\right) dx + Const.$$

Digitized by Google

Nimmt man $\varkappa = 1$, $\varkappa = 0$, subtrahirt die beiden so entstehenden Werthe des $T$ von einander und bemerkt dabei, dass für $\varkappa = 1$ das Integral $T$ in $S$ und für $\varkappa = 0$ in Null übergeht, so wird

$$S = \int_0^1 dx \int_0^x f[x, \varphi(x, \varkappa)] \left(\frac{d\varphi(x, \varkappa)}{dx}\right) dx . \qquad (5)$$

Es ist sehr leicht, dem nach $x$ genommenen Integrale ebenfalls die Gränzen 0 und 1 zu verschaffen; in der That bedarf es hierzu, nach Ausführung der durch

$$\left(\frac{d\varphi(x, \varkappa)}{dx}\right)$$

angedeuteten partiellen Differenziation, nur der Substitution $x = \varkappa\vartheta$, wo $\vartheta$ eine neue Variable bezeichnet. Man hat dann das mit variablen Integrationsgränzen versehene Integral in (1) auf ein anderes mit constanten Integrationsgränzen zurückgeführt und diess ist für die Reduktion des fraglichen Integrales deshalb ein wichtiger Schritt, weil in der neuen Form die Anordnung der Integrationen der Willkühr überlassen werden kann. Um hiervon gleich ein elegantes Beispiel zu haben, wollen wir voraussetzen, dass sich in dem Integrale

$$S_1 = \iint f(x, y)\, dx\, dy$$

die Integrationen auf alle positiven, die Bedingung

$$x^2 + y^2 \leqq 1$$

erfüllende $x$ und $y$ beziehen sollen, woraus

$$\varphi(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

folgt. Setzen wir nun

$$\varphi(x, \varkappa) = \sqrt{\varkappa^2 - x^2}$$

so genügt die verallgemeinerte Funktion $\varphi(x, \varkappa)$ den Voraussetzungen $\varphi(x, 1) = \varphi(x)$, $\varphi(\varkappa, \varkappa) = 0$; zugleich ist

$$\left(\frac{d\varphi(x, \varkappa)}{dx}\right) = \frac{\varkappa}{\sqrt{\varkappa^2 - x^2}}$$

Digitized by Google

und mithin nach Nr. (5)

$$S_1 = \int_0^1 dx \int_0^x f[x, \sqrt{x^2 - x^2}] \frac{x}{\sqrt{x^2 - x^2}} dx$$

woraus für $x = x\vartheta$ folgt

$$S_1 = \int_0^1 dx \int_0^1 f[x\vartheta, x\sqrt{1-\vartheta^2}] \frac{x}{\sqrt{1-\vartheta^2}} d\vartheta \qquad (6)$$

oder auch durch Umkehrung der Integrationsordnung

$$S_1 = \int_0^1 \frac{d\vartheta}{\sqrt{1-\vartheta^2}} \int_0^1 f[x\vartheta, x\sqrt{1-\vartheta^2}]\, x\, dx . \qquad (7)$$

Man wird gleich übersehen, dass es unzählige Fälle geben wird, in welchen sich entweder in (6) oder (7) die erste Integration bewerkstelligen lässt und in allen diesen Fällen führt man die Complanation auf eine Quadratur zurück. Nimmt man beispielsweis

$$f(x, y) = \sqrt{\frac{1-\beta^2 x^2 - \alpha^2 y^2}{1-x^2-y^2}}$$

so ergiebt sich auf der Stelle aus der Vergleichung der beiden Werthe von $S_1$

$$\iint dx\, dy \sqrt{\frac{1-\beta^2 x^2 - \alpha^2 y^2}{1-x^2-y^2}} \qquad (\text{für } x^2 + y^2 \leqq 1)$$

$$= \int_0^1 \frac{d\vartheta}{\sqrt{1-\vartheta^2}} \int_0^1 x\, dx \sqrt{\frac{1-\beta^2 x^2 \vartheta^2 - \alpha^2 x^2 (1-\vartheta^2)}{1-x^2}} . \qquad (8)$$

Setzt man zur Abkürzung

$$\beta^2 \vartheta^2 + \alpha^2 (1 - \vartheta^2) = \omega^2 \qquad (9)$$

und führt eine neue Variable $z = x^2$ ein, so erhält man unmittelbar

$$\iint dx\, dy \sqrt{\frac{1-\beta^2 x^2 - \alpha^2 y^2}{1-x^2-y^2}} \qquad (\text{für } x^2 + y^2 \leqq 1)$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d\vartheta}{\sqrt{1-\vartheta^2}} \int_0^1 dz \sqrt{\frac{1-\omega^2 z}{1-z}}$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d\vartheta}{\sqrt{1-\vartheta^2}} \left\{1 + \frac{1-\omega^2}{2\omega}\, l\left(\frac{1+\omega}{1-\omega}\right)\right\} \qquad (10)$$

Digitized by Google

wie man durch Ausführung der Integration nach $z$ ohne Schwierigkeit findet. Statt nun für $\omega$ seinen Werth aus Nr. (9) zu substituiren, behalten wir diese Grösse gleich als neue Variable bei und entwickeln $d\vartheta : \sqrt{1-\vartheta^2}$ mit Hülfe von $\omega$. Aus Nr. (9) folgt dann

$$\vartheta = \sqrt{\frac{\omega^2 - \alpha^2}{\beta^2 - \alpha^2}}$$

woraus $d\vartheta$ und $\sqrt{1-\vartheta^2}$ leicht abzuleiten sind. Berücksichtigt man endlich noch in Nr. (10) die Formel

$$\int_0^1 \frac{d\vartheta}{\sqrt{1-\vartheta^2}} = \frac{\pi}{2}$$

so erhält man ohne Schwierigkeit

$$\iint dx\,dy\,\sqrt{\frac{1-\beta^2 x^2 - \alpha^2 y^2}{1-x^2-y^2}} \qquad (\text{für } x^2+y^2 \leqq 1)$$

$$= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4}\int_\alpha^\beta \frac{1-\omega^2}{\sqrt{(\omega^2-\alpha^2)(\beta^2-\omega^2)}}\, l\left(\frac{1+\omega}{1-\omega}\right) d\omega\,. \qquad (11)$$

Diese elegante Formel dient zugleich zur Complanation des dreiachsigen Ellipsoids. Wendet man nämlich die allgemeine Complanationsformel

$$U = \iint d\xi\,d\eta\,\sqrt{1+\left(\frac{d\zeta}{d\xi}\right)^2 + \left(\frac{d\zeta}{d\eta}\right)^2}$$

auf den Fall an, wo

$$\left(\frac{\xi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\eta}{b}\right)^2 + \left(\frac{\xi}{c}\right)^2 = 1$$

oder

$$\zeta = c\sqrt{1 - \left(\frac{\xi}{a}\right)^2 - \left(\frac{\eta}{b}\right)^2}$$

ist, setzt zur Abkürzung

$$1 - \frac{c^2}{a^2} = \beta^2, \quad 1 - \frac{c^2}{b^2} = \alpha^2$$

Digitized by Google

und dehnt die Integrationen so aus, dass $U$ die Fläche des von den positiven Theilen der Abscissenachsen durchschnittenen Octanten des Ellipsoids darstellt, so findet man

$$U = \int\int d\xi\, d\eta \sqrt{\frac{1 - \left(\frac{\beta\xi}{a}\right)^2 - \left(\frac{\alpha\eta}{b}\right)^2}{1 - \left(\frac{\xi}{a}\right)^2 - \left(\frac{\eta}{b}\right)^2}}$$

unter der Bedingung

$$\left(\frac{\xi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\eta}{b}\right)^2 \leqq 1$$

wie man leicht aus einer einfachen geometrischen Betrachtung abnehmen wird. Für $\xi = ax$, $\eta = by$ wird hieraus

$$U = ab \int\int dx\, dy \sqrt{\frac{1 - \beta^2 x^2 - \alpha^2 y^2}{1 - x^2 - y^2}}$$

$$x^2 + y^2 \leqq 1$$

und mithin wird nach Formel (11) die Oberfläche eines Octanten des dreiachsigen Ellipsoids durch

$$\tfrac{1}{4} ab\, \pi + \tfrac{1}{4} ab \int_\alpha^\beta \frac{1 - \omega^2}{\sqrt{(\omega^2 - \alpha^2)(\beta^2 - \omega^2)}}\, l\left(\frac{1+\omega}{1-\omega}\right) d\omega \qquad (12)$$

ausgedrückt. Dabei sind $\alpha$ und $\beta$ die beiden Excentricitäten des Ellipsoids und zwar, wenn $a > b > c$, $\alpha$ die kleinere, beide aber ächte Brüche. Dass dieselben in unserer Formel zugleich als Gränzen des nach $\omega$ genommenen Integrales auftreten, ist eine eigenthümliche Erscheinung.

Weitere Details über diese Methode zur Reduktion doppelter Integrale würden hier um so überflüssiger sein, als wir namentlich im zweiten Theile dieser Schrift viel allgemeinere und expeditivere Mittel zur Reduktion solcher vielfacher Integrale, in denen willkührliche Funktionen vorkommen, aufzeigen werden.

Digitized by Google

## §. 21.

Die Hauptschwierigkeit bei der Behandlung derjenigen vielfachen Integrale, in denen die Integrationsgränzen blos durch eine oder mehrere Bedingungsgleichungen bestimmt werden, besteht, wie man aus dem Gedankengange der vorigen Paragraphen leicht abnehmen wird, darin, dass hier die Aufeinanderfolge der Integrationen unabänderlich vorgeschrieben ist, indem die Integrationsgränzen für die erste Variable Funktionen der zweiten Variablen, die Gränzen für diese wieder Funktionen der dritten Variablen etc. und erst die Integrationsgränzen für die letzte Variable (früher $x$) constante Grössen sind. Diese feststehende Ordnung beraubt uns der Möglichkeit, eine Umkehrung der Integrationsordnungen vorzunehmen, welche nur bei durchweg constanten Gränzen anwendbar, dann aber auch eines der mächtigsten Hülfsmittel zur Verwerthung vielfacher Integrale ist. Es drängt sich daher von selbst die Frage auf, ob man nicht durch irgend einen Kunstgriff das fragliche vielfache Integral in ein anderes verwandeln könnte, dessen Integrationsgränzen constante Grössen und womöglich 0 und $\infty$ oder $-\infty$ und $+\infty$ sind, weil man viele Integrale der letzteren Art kennt. Diesen Gedanken hat Lejeune Dirichlet auf die folgende ebenso einfache als geniale Weise ausführen gelehrt *).

Um einen bestimmten nicht zu complizirten Fall vor Augen zu haben, sei

$$S = \int\int\int \ldots F(x, y, z, \ldots)\, dx\, dy\, dz \ldots \qquad (1)$$

das gegebene vielfache Integral, worin die Integrationsgränzen unter Voraussetzung positiver $x$, $y$, $z$, ... durch die Bedingung

$$x + y + z + \ldots < 1$$

bestimmt werden mögen. Gesetzt nun, man könnte ein Integral

$$\int_\alpha^\beta f(\omega, \alpha)\, d\omega = \Omega \qquad (2)$$

*) M. s. *Abhandlungen der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin; aus dem Jahre* 1839, erschienen 1841, *S.* 61 *der mathematischen Abhandlungen.*

Digitized by Google

auftreiben, dass für alle Werthe der darin enthaltenen willkührlichen Constante $\sigma$, welche unter der Einheit liegen, $\Omega = 1$ dagegen für alle $\sigma > 1$, $\Omega = 0$ wäre, so würde man weil der erste Fall $\sigma < 1$ mit der Bedingung $x + y + z + \ldots < 1$ conform ist, auch sagen können, dass

$$\int_a^\beta f(\omega, x + y + z + \ldots)\, d\omega = 1 \text{ oder } = 0$$

ist jenachdem

$$x + y + z + \ldots < 1 \text{ oder } > 1$$

ausfällt, und dabei würden $x$, $y$, $z$, ... natürlich als willkührliche Constanten in Bezug auf die Integration nach $\omega$ erscheinen. Betrachten wir nun das Integral

$$S = \iiint \ldots F(x, y, z, \ldots)\, dx\, dy\, dz \ldots \int_a^\beta f(\omega, x + y + z + \ldots)\, d\omega$$

so erhellt auf der Stelle, dass es mit $S$ so lange identisch ist, als $x + y + z + \ldots < 1$ bleibt, dass es aber verschwindet, sobald $x + y + z + \ldots > 1$ ausfällt. In dem Falle endlich, wo $x + y + z + \ldots = 1$ ist, annullirt sich das Integral von selbst, welchen Werth auch der Faktor $\Omega$ haben möge, weil es sich dann auf eines seiner unendlich abnehmenden Elemente reduzirt *).

---

*) Handelte es sich z. B. um die Cubatur des Ellipsoids, so wäre das Integral $\iiint dx\, dy\, dx$ so zu nehmen, dass $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 \leqq 1$ bleibt, d. h. es wären alle diejenigen Körperelemente zu addiren, deren Coordinaten $x$, $y$, $z$, die obige Bedingung erfüllen. Von diesen Elementen liegen die, welche der Umgleichung $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 < 1$ genügen, innerhalb der begränzenden Fläche, und die, für welche $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1$ wird, auf der genannten Fläche. Da man sich aber die Elemente als unendlich abnehmend zu denken hat, so bilden die Elemente der letzteren Art die begränzende Fläche selbst und liefern keinen Beitrag zum Volumen des fraglichen

Digitized by Google

Aus diesem Allen zusammen folgt, dass $S'$ immer denselben Werth behält, man mag nun die Integrationen nach den Gränzen verrichten, welche der Bedingung $x+y+z+\ldots<1$ genügen, oder nach anderen und zwar grösseren; man kann daher auch behaupten, dass

$$S'=\int_0^\infty\int_0^\infty\int_0^\infty\ldots F(x,y,z,\ldots)\,dx\,dy\,dz\ldots\int_\alpha^\beta f(\omega,x+y+z+\ldots)\,d\omega$$

ist; denn denkt man sich das Integral in seine Elemente zerlegt, so scheidet der Faktor $\Omega$ von selbst alle diejenigen Elemente aus, für welche $x+y+z+\ldots>1$ wird. Da nun ausserdem $S'=S$ ist, so haben wir

$$\left.\begin{aligned}&\iiint\ldots F(x,\ y,\ z,\ \ldots)\,dx\,dy\,dz\ \ldots\\ &=\int_0^\infty\int_0^\infty\int_0^\infty\ldots F(x,y,z,\ldots)\,dx\,dy\,dz\ldots\int_\alpha^\beta f(\omega,x+y+z+\ldots)\,d\omega.\end{aligned}\right\}\quad(3)$$

Hier steht nun zwar auf der rechten Seite eine Integration mehr, aber dieser Nachtheil wird durch den Vortheil constanter Gränzen weit aufgewogen.

Da nun Alles darauf ankommt, ein Integral $\Omega$ von den obenangegebenen Eigenschaften zu haben, so müssen wir uns zunächst nach einem solchen umsehen. Es ist aber für lediglich positive $c$

$$\int_0^\infty\frac{\sin ct}{t}\,dt=\frac{\pi}{2}\qquad(4)$$

und hieraus ergiebt sich leicht:

---

Körpers, oder es ist $\iiint dx\,dy\,dz=0$, sobald $\left(\frac{x}{a}\right)^2+\left(\frac{y}{b}\right)^2+\left(\frac{z}{c}\right)^2=1$ wird. Ganz ebenso verhält sich die Sache mit den Integralen $S$ und $S'$, so dass es einerlei ist, ob man die Bedingung $x+y+z+\ldots<1$ oder $x+y+z+\ldots\leqq 1$ aufstellt.



Digitized by Google

$$\int_0^\infty \frac{\sin bt \cos at}{t}\,dt = \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{\sin(b+a)t + \sin(b-a)t}{t}\,dt$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{\sin(b+a)}{t}\,dt + \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{\sin(b-a)}{t}\,dt$$

folglich in dem Falle $b > a$ jedes der Integrale rechts $= \frac{\pi}{2}$ und

$$\int_0^\infty \frac{\sin bt \cos at}{t}\,dt = \frac{\pi}{2}, \quad b > a.$$

Dagegen wird für $b < a$

$$\int_0^\infty \frac{\sin bt \cos at}{t}\,dt = \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{\sin(a+b)t}{t}\,dt - \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{\sin(a-b)t}{t}\,dt$$

und da hier $a - b$ positiv ist,

$$\int_0^\infty \frac{\sin bt \cos at}{t}\,dt = 0, \quad b < a.$$

Setzen wir noch $b = 1$, $a = \sigma$, $t = \omega$ so folgt:

$$\left.\begin{aligned} \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega}\cos\sigma\omega\,d\omega &= 1 \text{ für } \sigma < 1 \\ &= 0 \quad \text{„} \quad \sigma > 1 \end{aligned}\right\} \quad (5)$$

und also erfüllt das vorstehende Integral die Bedingungen, welche dem $\Omega$ auferlegt waren*), und wir haben demnach zu Folge der Gleichung (3) für:

---

*) Die Auffindung des Integrales $\Omega$, welches Lejeune Dirichlet sehr passend den Diskontinuitätsfaktor nennt, steht hier noch als ein vereinzelter Kunstgriff des Calcüls. Dagegen werden wir im zweiten Theile dieser Schrift zeigen, wie sich dergleichen Faktoren in beliebiger Menge entwickeln lassen und dass es namentlich sehr leicht ist, ein Integral anzugeben, dessen Werth eine ganz beliebige Funktion $f(\sigma)$ oder Null ist, jenachdem $\sigma$ innerhalb oder ausserhalb eines gegebenen Intervalles $\lambda$ bis $\varkappa$ fällt. Der obige, bis jetzt der einzige bekannte, Diskontinuitätsfaktor erscheint dann nur als die einfachste Spezialisirung $f(\sigma) = 1$, $\lambda = 0$, $\varkappa = 1$.

Digitized by Google

$$x + y + z + \ldots \leqq 1$$

die Formel:

$$\iiint \ldots F(x, y, z, \ldots)\, dx\, dy\, dz$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty \ldots F(x, y, z, \ldots)\, dx\, dy\, dz \ldots$$

$$\ldots \int_0^\infty \frac{\sin \omega}{\omega} \cos(x + y + z + \ldots)\, \omega\, d\omega \,.$$

Bemerkt man noch, dass $\cos \sigma\omega$ der reelle Bestandtheil von $e^{-\sigma\omega i}$ ist $(i = \sqrt{-1})$, so kann man statt des Vorigen auch sagen, dass das Integral:

$$\left.\begin{array}{c} \iiint \ldots F(x, y, z, \ldots)\, dx\, dy\, dz \ldots \\ x + y + z + \ldots \leqq 1 \end{array}\right\} \quad (6)$$

die reelle Partie des folgenden ausmacht:

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{2}{\pi} \displaystyle\int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty \ldots F(x, y, z, \ldots)\, dx\, dy\, dz \ldots \\ \qquad \ldots \displaystyle\int_0^\infty \frac{\sin \omega}{\omega} e^{-(x + y + z + \ldots)\omega i}\, d\omega \,. \end{array}\right\} \quad (7)$$

Mit welcher ausserordentlichen Leichtigkeit sich dieses sehr allgemeine Theorem zur Verwerthung vielfacher Integrale anwenden lässt, mögen die folgenden Beispiele zeigen.

Es sei

$$F(x, y, z, \ldots) = x^{l-1} y^{m-1} z^{n-1} \ldots e^{-a(x + y + z + \ldots)} \quad (8)$$

so würde es sich nach Nr. (7) um den reellen Bestandtheil von:

Digitized by Google

$$\frac{2}{\pi}\int_0^\infty\int_0^\infty \ldots x^{l-1}e^{-ax}\,dx\,.\,y^{m-1}e^{-ay}\,dy\,\ldots\int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega}e^{-\omega xi}e^{-\omega yi}\ldots d\omega$$

handeln. Statt nun zuerst nach $\omega$ und dann nach $x, y, z, \ldots$ zu integriren, kann man hier zuvor nach $x, y, z, \ldots$ integriren und die Integration nach $\omega$ bis zuletzt aufsparen, so dass das Integral in

$$\frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega}\,d\omega\int_0^\infty x^{l-1}e^{-(a+\omega i)x}\,dx\int_0^\infty y^{m-1}e^{-(a+\omega i)y}\,dy\,\ldots.$$

übergeht, wobei jetzt die Variablen $x, y, z, \ldots$ so gesondert sind, dass die Integrationen nach denselben sich auf ein bloses Produkt einfacher Integrale reduziren, deren Werthe sehr leicht anzugeben sind. Man erhält nämlich

$$\frac{2}{\pi}\,\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,\Gamma(n)\,\ldots\int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega}\cdot\frac{d\omega}{(a+\omega i)^{l+m+n+\ldots}}$$

und der reelle Theil hiervon ist der Werth des Integrales

$$\iiint\ldots x^{l-1}y^{m-1}z^{n-1}\ldots e^{-a(x+y+z+\ldots)}\,dx\,dy\,dz\,\ldots$$

$$\text{für } x+y+z+\ldots \leqq 1,$$

wobei nur positive Werthe von $x, y, z, \ldots$ vorausgesetzt werden.

Ist nur eine Variable $x$ vorhanden, so folgt hieraus

$$\text{die reelle Partie von } \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega}\cdot\frac{d\omega}{(a+\omega i)^l} = \frac{1}{\Gamma(l)}\int_0^1 x^{l-1}e^{-ax}\,dx$$

und wenn man $l+m+n+\ldots$ für $l$ setzt:

Digitized by Google

$$\text{die reelle Partie von } \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega}\cdot\frac{d\omega}{(a+\omega i)^{l+m+n+\ldots}}$$

$$= \frac{1}{\Gamma(l+m+n+\ldots)}\int_0^1 x^{l+m+n+\ldots-1}\, e^{-ax}\, dx$$

und wenn man diess für das Vorhergehende benutzt, so wird

$$\left.\begin{aligned} &\iiint\ldots x^{l-1}\, y^{m-1}\, z^{n-1}\ldots e^{-a(x+y+z+\ldots)}\, dx\, dy\, dz\ldots \\ &= \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,\Gamma(n)\ldots}{\Gamma(l+m+n+\ldots)}\int_0^1 x^{l+m+n+\ldots-1}\, e^{-ax}\, dx \\ &\qquad x+y+z+\ldots \leqq 1\,. \end{aligned}\right\} \quad (9)$$

Aus der Ableitung derselben scheint hervorzugehen, dass dieselbe für $a=0$ nur dann richtig bleibt, wenn $l$, $m$, $n$, etc. positive ächte Brüche sind; man kann sich aber leicht überzeugen, dass wenn überhaupt die Gleichung (9) für jedes positive $a$ gilt, gleichviel auf welchem Wege man dieselbe abgeleitet haben mag, sie auch noch für $a=0$ ganz im Allgemeinen ein richtiges Resultat liefern muss. Lässt man nämlich in dem Integrale

$$\iiint\ldots x^{l-1}\, y^{m-1}\ldots\left\{1-e^{-a(x+y+\ldots)}\right\} dx\, dy\ldots$$

$a$ bis zur Null abnehmen, so nähert sich, weil $x+y+z+\ldots$ die Einheit nicht übersteigt, auch $a(x+y+z+\ldots)$ und ebenso der Faktor

$$1-e^{-a(x+y+z+\ldots)}$$

der Gränze Null und mithin ist dann der Werth des obigen Integrales $=0$, woraus sehr leicht folgt, dass

$$\iiint\ldots x^{l-1}\, y^{m-1}\ldots dx\, dy\ldots$$

$$= Lim\iiint\ldots x^{l-1}\, y^{m-1}\ldots e^{-a(x+y+\ldots)}\, dx\, dy\ldots$$

Digitized by Google

ist, wobei sich das Zeichen *Lim* auf die unbegränzte Abnahme von $a$ bezieht. Wir haben daher auch

$$\iiint x^{l-1} y^{m-1} \ldots dx\, dy \ldots$$

$$= \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,\ldots}{\Gamma(l+m+\ldots)} \cdot Lim \int_0^1 x^{l+m+\ldots-1} e^{-a(x+y+\ldots)}\, dx$$

$$= \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,\Gamma(n)\,\ldots.}{\Gamma(1+l+m+n+\ldots)}$$

und hiermit kommen wir auf die schon im vorigen Paragraphen bewiesene Formel zurück; die Priorität ihrer Entwickelung gebührt indessen Lejeune Dirichlet.

## §. 22.

Eine der elegantesten Anwendungen des so eben auseinandergesetzten Verfahrens, in welcher ebenfalls die Gammafunktionen eine nicht unwichtige Rolle spielen, ist die Reduktion des dreifachen Integrales

$$-\frac{1}{s-1} \iiint \frac{dx\, dy\, dz}{\left[(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 + (z-\gamma)^2\right]^{\frac{1}{2}(s-1)}} = S \qquad (1)$$

worin sich die Integrationen auf alle diejenigen positiven oder negativen Werthe von $x$, $y$, $z$ erstrecken sollen, welche der Bedingung

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 < 1 \qquad (2)$$

Genüge leisten. Dieses Integral ist deshalb von besonderem Interesse, weil ihm eine unmittelbare physikalische Bedeutung zukommt; es dient nämlich zur Berechnung der Anziehung, welche ein Ellipsoid mit den Achsen $a$, $b$, $c$ auf einen irgendwo im Raume gegebenen materiellen Punkt ausübt, vorausgesetzt, dass die Anziehung nach der $s^{ten}$ rezi-

Digitized by Google

proken Potenz der Entfernung überhaupt wirkt *). Setzen wir zur Abkürzung

$$\sqrt{(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2+(z-\gamma)^2} = r \qquad (3)$$

---

*) In kurzen Worten ist die Ableitung hiervon folgende. Irgend ein Element des Ellipsoids, dessen Dichtigkeit $\Delta$ ist, hat $\Delta\,dx\,dy\,dz$ zur Masse, wobei $x$, $y$, $z$ die Coordinaten des fraglichen Elementes sind. Ist $r$ die Entfernung desselben von einem bestimmten Punkte, dessen Masse $= 1$ sein möge, so zieht es denselben mit der Kraft $\frac{\Delta\,dx\,dy\,dz}{r^2}$ an und die Richtung dieser Kraft fällt mit der von $r$ zusammen. Heissen $\lambda$, $\mu$, $\nu$ die drei Winkel, welche die Richtung von $r$ mit den drei Coordinatenachsen, wofür wir die Achsen des Ellipsoids nehmen, einschliesst, so sind

$$\frac{\Delta\,dx\,dy\,dz}{r^2}\cos\lambda,\quad \frac{\Delta\,dx\,dy\,dz}{r^2}\cos\mu,\quad \frac{\Delta\,dx\,dy\,dz}{r^2}\cos\nu$$

die längs der Coordinatenachsen wirkenden Componenten jener Elementaranziehung. Nennen wir ferner $A$, $B$, $C$ die Componenten der Gesammtanziehung, welche das ganze Ellipsoid auf den gegebenen Punkt ausübt, und setzen wir die Dichtigkeit im ganzen Körper als gleich voraus, so ist

$$A = \Delta\iiint\frac{dx\,dy\,dz}{r^2}\cos\lambda,\quad B = \Delta\iiint\frac{dx\,dy\,dz}{r^2}\cos\mu,$$

$$C = \Delta\iiint\frac{dx\,dy\,dz}{r^2}\cos\nu$$

und hierin müssen die Integrationen so ausgeführt werden, dass man alle Elemente mitrechnet, die nicht ausserhalb des vom Ellipsoide umschlossenen Raumes liegen, deren Coordinaten also die Bedingung

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2+\left(\frac{y}{b}\right)^2+\left(\frac{z}{c}\right)^2 \leqq 1$$

befriedigen, wobei man statt $\leqq$ auch blos $<$ setzen kann. Sind nun weiter $\alpha$, $\beta$, $\gamma$ die Coordinaten des gegebenen vom Ellipsoide angezogenen Punktes, so finden die Gleichungen

$$r^2 = (\alpha-x)^2+(\beta-y)^2+(\gamma-z)^2$$

$$\cos\lambda = \frac{\alpha-x}{r},\quad \cos\mu = \frac{\beta-y}{r},\quad \cos\nu = \frac{\gamma-z}{r}$$

statt, in denen wir blos auf die absoluten Werthe der Differenzen $\alpha-x$, $\beta-y$, $\gamma-z$

Digitized by Google

wobei das Wurzelzeichen immer positiv genommen werden möge und

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = \sigma \qquad (4)$$

---

Rücksicht zu nehmen brauchen. Ferner ergiebt sich durch partielle Differenziation von $r^2$ nach $\alpha$

$$r\,dr = (a-x)\,da, \quad \text{oder} \quad \frac{a-x}{r} = \frac{dr}{da} = \cos\lambda$$

und mithin nach dem Vorigen

$$A = \Delta \iiint \frac{dx\,dy\,dz}{r^s} \cdot \frac{dr}{da}$$

und wenn man die Gleichung

$$-\frac{1}{s-1} \cdot \frac{d\left(\frac{1}{r^{s-1}}\right)}{da} = \frac{1}{r^s} \cdot \frac{dr}{da}$$

berücksichtigt

$$A = -\frac{\Delta}{s-1} \iiint \frac{d\left(\frac{1}{r^{s-1}}\right)}{da}\,dx\,dy\,dz\,.$$

Da aber die Integrationen nach $x$, $y$, $z$ und die Differenziation nach der arbiträren Constanten $\alpha$ von einander unabhängig sind, so kann man auch umgekehrt erst integriren und dann differenziren, also

$$A = \frac{d}{da}\left\{-\frac{\Delta}{s-1} \iiint \frac{dx\,dy\,dz}{r^{s-1}}\right\}$$

setzen und wenn man einfacher $\Delta = 1$,

$$-\frac{1}{s-1} \iiint \frac{dx\,dy\,dz}{r^{s-1}} = S,$$

nimmt, so hat man

$$A = \frac{dS}{da}, \quad B = \frac{dS}{d\beta}, \quad C = \frac{dS}{d\gamma}.$$

Die Grösse $S$ fällt mit dem in (1) aufgestellten Integrale zusammen und ist das, was Gauss in seiner Abhandlung: *„Allgemeine Lehrsätze über die im verkehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung wirkenden Anziehungs- oder Abstossungskräfte, Leipzig* 1840," das Potenzial der Anziehung resp. Abstossung genannt hat.

Digitized by Google

so erhellt, dass das in Rede stehende Integral mit dem folgenden

$$-\frac{2}{\pi}\frac{1}{s-1}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx\,dy\,dz}{r^{s-1}}\int_{0}^{\infty}\frac{\sin\omega}{\omega}\cos\sigma\omega\,d\omega$$

zusammenfällt, weil der hinzugesetzte Faktor alle diejenigen Elemente des Integrales ausscheidet, welche der Bedingung $\sigma \leqq 1$ nicht genügen. Statt des vorstehenden Integrales betrachten wir noch bequemer das folgende

$$S_1 = -\frac{2}{\pi}\frac{1}{s-1}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx\,dy\,dz}{r^{s-1}}\int_{0}^{\infty}\frac{\sin\omega}{\omega}e^{\sigma\omega i}d\omega \qquad (5)$$

von welchem jenes, also auch $S$, den reellen Bestandtheil bildet. Durch Umkehrung der Integrationsordnung wird nun

$$S_1 = -\frac{2}{\pi}\frac{1}{s-1}\int_{0}^{\infty}\frac{\sin\omega}{\omega}d\omega\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx\,dy\,dz}{r^{s-1}}e^{\sigma\omega i} \qquad (6)$$

aber auch hier kann man die Integrationen nach $x$, $y$, $z$ nicht sogleich ausführen, weil sich der Ausdruck

$$\frac{dx\,dy\,dz}{r^{s-1}}e^{\sigma\omega i}$$

$$= \frac{dx\,dy\,dz}{\left[(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2+(z-\gamma)^2\right]^{\frac{1}{2}(s-1)}}e^{\left[\left(\frac{x}{a}\right)^2+\left(\frac{y}{b}\right)^2+\left(\frac{z}{c}\right)^2\right]\omega i}$$

nicht in drei Faktoren zerlegen lässt, von welchen der eine nur $x$, der andere nur $y$ und der dritte nur $z$ enthielte. Da nun aber Alles auf die wirkliche Ausführung der gedachten Operation ankommt, so wollen wir jenes dreifache Integral vorerst für sich betrachten und die Gleichung (6) kürzer in der Form:



Digitized by Google

$$S_1 = -\frac{2}{\pi}\,\frac{1}{s-1}\int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega}\,d\omega\; S_2 \tag{7}$$

darstellen, wobei zur Abkürzung

$$S_2 = -\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx\,dy\,dz}{r^{s-1}}\,e^{\sigma\omega i} \tag{8}$$

gesetzt worden ist. Hier bedarf es nur einer sehr einfachen Substitution, um sogleich die Integration zu ermöglichen, man muss nämlich $\frac{1}{r^{s-1}}$ selbst in ein bestimmtes Integral verwandeln, was auf folgende Weise geschieht. Lassen wir in der bekannten Formel

$$\int_0^\infty x^{\mu-1}e^{bxi}\,dx = \frac{\Gamma(\mu)}{b^\mu}e^{\frac{\mu\pi}{2}i},\quad 1>\mu>0$$

an die Stelle von $x$, $b$, $\mu$ die Grössen: $\vartheta$, $r^2$, $\frac{s-1}{2}$ treten, so folgt

$$\frac{\Gamma\left(\frac{s-1}{2}\right)}{r^{s-1}}e^{(s-1)\frac{\pi}{4}i} = \int_0^\infty \vartheta^{\frac{s-3}{2}}e^{r^2\vartheta i}\,d\vartheta,\quad 1>\frac{s-1}{2}>0$$

oder

$$\frac{1}{r^{s-1}} = \frac{1}{\Gamma\left(\frac{s-1}{2}\right)}e^{(1-s)\frac{\pi}{4}i}\int_0^\infty \vartheta^{\frac{s-3}{2}}e^{r^2\vartheta i}\,d\vartheta,\quad 3>s>2$$

und mithin ist unter der Voraussetzung, dass $s$ zwischen 2 und 3 liegt,

$$S_2 = \frac{e^{(1-s)\frac{\pi}{4}i}}{\Gamma\left(\frac{s-1}{2}\right)}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}dx\,dy\,dz\,e^{\sigma\omega i}\int_0^\infty \vartheta^{\frac{s-3}{2}}e^{r^2\vartheta i}\,d\vartheta$$

Digitized by Google

oder wenn man die Integration nach $\vartheta$ bis zuletzt aufspart

$$S_2 = \frac{e^{(1-s)\frac{\pi}{4}i}}{\Gamma\left(\frac{s-1}{2}\right)} \int_0^\infty \vartheta^{\frac{s-3}{2}} d\vartheta \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} dx\,dy\,dz\, e^{\sigma\omega i} e^{r^2\vartheta i}. \quad (9)$$

Zieht man das Produkt der beiden Exponenzialgrössen in eine einzige zusammen und substituirt für $\sigma$ und $r^2$ ihre Werthe, so hat die neue Exponenzialgrösse den Exponenten

$$\begin{aligned}\sigma\omega i + r^2\vartheta i = (\alpha^2+\beta^2+\gamma^2)\vartheta i \\ + \left[\left(\frac{\omega}{a^2}+\vartheta\right)x^2 - 2\alpha\vartheta x\right]i + \left[\left(\frac{\omega}{b^2}+\vartheta\right)y^2 - 2\beta\vartheta y\right]i \\ + \left[\left(\frac{\omega}{c^2}+\vartheta\right)z^2 - 2\gamma\vartheta z\right]i\end{aligned}$$

und folglich zerfällt diese Exponenzialgrösse in 4 andere als Faktoren, von denen die erste einen constanten Exponenten, die zweite einen blos von $x$, die dritte einen blos von $y$ und die vierte einen nur von $z$ abhängigen Exponenten besitzt. Da nun hierdurch eine Sonderung der Variablen bewerkstelligt worden ist, so verwandelt sich das dreifache Integral

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} dx\,dy\,dz\, e^{(\sigma\omega+r^2\vartheta)i} \quad (10)$$

in das Produkt folgender vier Faktoren:

$$\left.\begin{aligned} & e^{(\alpha^2+\beta^2+\gamma^2)\vartheta i} \\ & \int_{-\infty}^{\infty} dx\, e^{\left[\left(\frac{\omega}{a^2}+\vartheta\right)x^2 - 2\alpha\vartheta x\right]i} \\ & \int_{-\infty}^{\infty} dy\, e^{\left[\left(\frac{\omega}{b^2}+\vartheta\right)y^2 - 2\beta\vartheta y\right]i} \\ & \int_{-\infty}^{\infty} dz\, e^{\left[\left(\frac{\omega}{c^2}+\vartheta\right)z^2 - 2\gamma\vartheta z\right]i} \end{aligned}\right\} \quad (11)$$

Digitized by Google

wobei sich sämmtliche Integrationen ausführen lassen, wenn man die Formel (17) in §. 13 nämlich

$$\int_{-\infty}^{\infty} du\, e^{[hu^2 - 2ku]i} = \sqrt{\frac{\pi}{h}}\, e^{\left(\frac{\pi}{4} - \frac{k^2}{h}\right)i}$$

in Anwendung bringt, indem man der Reihe nach $u = x,\ y,\ z$

$$h = \frac{\omega}{a^2} + \vartheta, \quad \frac{\omega}{b^2} + \vartheta, \quad \frac{\omega}{c^2} + \vartheta,$$

$$k = \quad a\vartheta, \qquad \beta\vartheta, \qquad \gamma\vartheta$$

setzt. Hat man so die Werthe der 3 Integrale in (11) bestimmt und multiplizirt dann die vier unter (11) verzeichneten Faktoren, deren Produkt dem Integrale in (10) gleichgilt, so findet man nach einer kleinen Reduktion

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} dx\, dy\, dz\, e^{(\sigma\omega + r^2\vartheta)i}$$

$$= \frac{\pi^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\left(\frac{\omega}{a^2} + \vartheta\right)\left(\frac{\omega}{b^2} + \vartheta\right)\left(\frac{\omega}{c^2} + \vartheta\right)}}\, e^{\frac{3}{4}\pi i + \Theta\omega i}$$

wobei zur Abkürzung

$$\Theta = \frac{a^2\vartheta}{\omega + a^2\vartheta} + \frac{\beta^2\vartheta}{\omega + b^2\vartheta} + \frac{\gamma^2\vartheta}{\omega + c^2\vartheta} \qquad (12)$$

gesetzt worden ist. Die Formel (9) gestaltet sich nun wie folgt

$$S_2 = \frac{\pi^{\frac{3}{2}}}{\Gamma\left(\frac{s-1}{2}\right)}\, e^{\left(1 - \frac{s}{4}\right)\pi i} \int_0^{\infty} \frac{\vartheta^{\frac{s-3}{2}}\, d\vartheta\, e^{\Theta\omega i}}{\sqrt{\left(\frac{\omega}{a^2} + \vartheta\right)\left(\frac{\omega}{b^2} + \vartheta\right)\left(\frac{\omega}{c^2} + \vartheta\right)}}$$

wobei man statt $e^{\pi i}$ kürzer $-1$ schreibt. Substituiren wir das gefundene Resultat mit der Rücksicht, dass:

Digitized by Google

$$\frac{s-1}{2}\,\Gamma\left(\frac{s-1}{2}\right) = \Gamma\left(\frac{s+1}{2}\right)$$

ist, in die Gleichung (7) so wird

$$S_1 = \frac{\sqrt{\pi}\, e^{-\frac{s\pi}{4}i}}{\Gamma\left(\frac{s+1}{2}\right)} \int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega}\, d\omega \int_0^\infty \frac{\vartheta^{\frac{s-3}{2}}\, d\vartheta\, e^{\Theta\omega i}}{\sqrt{\left(\frac{\omega}{a^2}+\vartheta\right)\left(\frac{\omega}{b^2}+\vartheta\right)\left(\frac{\omega}{c^2}+\vartheta\right)}}.$$

Von den zwei Integrationen, welche hier verlangt werden, lässt sich nun wieder eine auf folgende Weise ausführen. Man setze $\vartheta = \frac{\omega}{\tau}$, wo $\tau$ eine neue Variable bezeichnet, so wird

$$\vartheta^{\frac{s-3}{2}}\, d\vartheta = -\,\omega^{\frac{s-1}{2}}\, \frac{d\tau}{\tau^{\frac{s+1}{2}}}$$

ferner

$$\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\omega}{a^2}+\vartheta\right)\left(\frac{\omega}{b^2}+\vartheta\right)\left(\frac{\omega}{c^2}+\vartheta\right)}}$$

$$= \frac{1}{\omega^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{\tau}\right)\left(\frac{1}{b^2}+\frac{1}{\tau}\right)\left(\frac{1}{c^2}+\frac{1}{\tau}\right)}}$$

$$= \frac{1}{\omega^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{\tau^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\left(1+\frac{\tau}{a^2}\right)\left(1+\frac{\tau}{b^2}\right)\left(1+\frac{\tau}{c^2}\right)}}$$

ausserdem geht $\Theta$ über in

$$\frac{a^2}{a^2+\tau} + \frac{\beta^2}{b^2+\tau} + \frac{\gamma^2}{c^2+\tau} = T \qquad (13)$$

wobei $T$ zur Abkürzung dient. Den Integrationsgränzen endlich $\vartheta = 0$ und $\vartheta = \infty$ entsprechen jetzt $\tau = \infty$ und $\tau = 0$, die man aber ver-

Digitized by Google

tauschen darf, wenn man dem Integrale das entgegengesetzte Zeichen giebt, wodurch es wieder positiv wird. Diese Substitutionen geben nun zusammen:

$$S_1 = \frac{\sqrt{\pi}\, e^{-\frac{s\pi}{4}i}}{\Gamma\left(\frac{s+1}{2}\right)} \int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega}\, d\omega \cdot \frac{\omega^{\frac{s-1}{2}}}{\omega^{\frac{1}{2}}} \int_0^\infty \frac{\tau^{1-\frac{s}{2}}\, d\tau\, e^{T\omega i}}{\sqrt{\left(1+\frac{\tau}{a^2}\right)\left(1+\frac{\tau}{b^2}\right)\left(1+\frac{\tau}{c^2}\right)}}$$

durch Umkehrung der Integrationsordnung wird hieraus:

$$S_1 = \frac{\sqrt{\pi}\, e^{-\frac{s\pi}{4}i}}{\Gamma\left(\frac{s+1}{2}\right)} \left\{ \int_0^\infty \frac{\tau^{1-\frac{s}{2}}\, d\tau}{\sqrt{\left(1+\frac{\tau}{a^2}\right)\left(1+\frac{\tau}{b^2}\right)\left(1+\frac{\tau}{c^2}\right)}} \int_0^\infty \omega^{\frac{s}{2}-3} \sin\omega\, e^{T\omega i}\, d\omega \right\} \quad (14)$$

und weil hier $T$ in Bezug auf $\omega$ constant ist, so erhellt sogleich, dass sich hier die Integration nach $\omega$ ausführen lassen muss. Da es uns aber nur um den reellen Bestandtheil dieses Integrales zu thun ist, so stellen wir $e^{-\frac{s\pi}{4}i}$ unter das Integralzeichen und zerlegen

$$e^{(T\omega - \frac{s\pi}{4})i} \quad \text{in} \quad \cos\left(T\omega - \frac{s\pi}{4}\right) + i \sin\left(T\omega - \frac{s\pi}{4}\right).$$

Wir haben dann nach dem Früheren

$$S = \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma\left(\frac{s+1}{2}\right)} \left\{ \int_0^\infty \frac{\tau^{1-\frac{s}{2}}\, d\tau}{\sqrt{\left(1+\frac{\tau}{a^2}\right)\left(1+\frac{\tau}{b^2}\right)\left(1+\frac{\tau}{c^2}\right)}} \int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega^{3-\frac{s}{2}}} \cos\left(T\omega - \frac{s\pi}{4}\right) d\omega \right\} \quad (15)$$

Digitized by Google

Was nun das Integral nach $\omega$ anbelangt, so zerfällt dasselbe in die folgenden:

$$\cos\frac{s\pi}{4}\int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega^\lambda}\cos T\omega\,d\omega + \sin\frac{s\pi}{4}\int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega^\lambda}\sin T\omega\,d\omega \qquad (16)$$

wobei zur Abkürzung $\lambda$ statt $3-\frac{s}{2}$ geschrieben worden ist; ferner hat man wieder für $T<1$

$$\int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega^\lambda}\cos T\omega\,d\omega = \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{\sin(1-T)\omega}{\omega^\lambda}\,d\omega + \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{\sin(1-T)\omega}{\omega^\lambda}\,d\omega$$

d. i. unter Anwendung bekannter Formel

$$\int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega^\lambda}\cos T\omega\,d\omega = \frac{\pi}{4\Gamma(\lambda)\sin\frac{1}{2}\lambda\pi}\left\{(1-T)^{\lambda-1}+(1+T)^{\lambda-1}\right\}$$

dagegen für $T>1$

$$\int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega^\lambda}\cos T\omega\,d\omega = -\frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{\sin(T-1)\omega}{\omega^\lambda}\,d\omega + \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{\sin(T+1)\omega}{\omega^\lambda}\,d\omega$$

$$= \frac{\pi}{4\Gamma(\lambda)\sin\frac{1}{2}\lambda\pi}\left\{-(T-1)^{\lambda-1}+(T+1)^{\lambda-1}\right\}$$

ferner für $T<1$:

Digitized by Google

$$\int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega^\lambda}\sin T\omega\, d\omega$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{\cos(1-T)\omega}{\omega^\lambda}d\omega - \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{\cos(1+T)\omega}{\omega^\lambda}d\omega$$

$$= \frac{\pi}{4\Gamma(\lambda)\cos\frac{1}{2}\lambda\pi}\left\{(1-T)^{\lambda-1} - (1+T)^{\lambda-1}\right\}$$

und für $T>1$

$$\int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega^\lambda}\sin T\omega\, d\omega$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{\cos(T-1)\omega}{\omega^\lambda}d\omega - \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{\cos(T+1)\omega}{\omega^\lambda}d\omega$$

$$= \frac{\pi}{4\Gamma(\lambda)\cos\frac{1}{2}\lambda\pi}\left\{(T-1)^{\lambda-1} - (T+1)^{\lambda-1}\right\}.$$

Substituirt man diess in Nr. (16) so findet man, dass die dortige Summe für $T<1$ gleich

$$\frac{\pi}{4\Gamma(\lambda)}\left\{\frac{\cos\frac{s\pi}{4}}{\sin\frac{\lambda\pi}{2}} + \frac{\sin\frac{s\pi}{4}}{\cos\frac{\lambda\pi}{2}}\right\}(1-T)^{\lambda-1}$$

$$+ \frac{\pi}{4\Gamma(\lambda)}\left\{\frac{\cos\frac{s\pi}{4}}{\sin\frac{\lambda\pi}{4}} - \frac{\sin\frac{s\pi}{4}}{\cos\frac{\lambda\pi}{2}}\right\}(1+T)^{\lambda-1}$$

und für $T>1$ gleich:

Digitized by Google

$$\frac{\pi}{4\Gamma(\lambda)}\left\{-\frac{\cos\frac{s\pi}{4}}{\sin\frac{\lambda\pi}{2}}+\frac{\sin\frac{s\pi}{4}}{\cos\frac{\lambda\pi}{2}}\right\}(T-1)^{\lambda-1}$$

$$+\frac{\pi}{4\Gamma(\lambda)}\left\{\frac{\cos\frac{s\pi}{4}}{\sin\frac{\lambda\pi}{2}}-\frac{\sin\frac{s\pi}{4}}{\cos\frac{\lambda\pi}{2}}\right\}(T+1)^{\lambda-1}.$$

Hieraus findet man sehr leicht mittelst des Werthes $\lambda = 3 - \frac{s}{2}$, dass diese Summe

$$= -\frac{\pi}{2\Gamma(3-\frac{s}{2})}(1-T)^{2-\frac{s}{2}} \quad \text{oder} \quad = 0$$

ist, je nachdem $T$ unter oder über der Einheit liegt, was wir so zusammenfassen wollen, dass wir

$$-\frac{\pi}{2\Gamma(3-\frac{s}{2})}\Phi(T) \tag{17}$$

für jene Summe schreiben, wobei

$$\text{für } T<1, \quad \Phi(T) = (1-T)^{2-\frac{s}{2}}$$
$$\text{„ } T>1, \quad \Phi(T) = 0$$

ist. Bemerken wir nun, dass der Ausdruck in (17) der Werth des nach $\omega$ genommenen Integrales in Nr. (15) ist, und setzen wir zur Abkürzung

$$\frac{\tau^{1-\frac{s}{2}}}{\sqrt{\left(1+\frac{\tau}{a^2}\right)\left(1+\frac{\tau}{b^2}\right)\left(1+\frac{\tau}{c^2}\right)}} = F(\tau)$$

so folgt jetzt:



Digitized by Google

$$S = -\frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{2\Gamma\left(\frac{s+1}{2}\right)\Gamma\left(3-\frac{s}{2}\right)}\int_0^\infty F(\tau)\,d\tau\;\Phi(T) \qquad (18)$$

wo es sich nun noch um die Entscheidung von $T \lessgtr 1$ oder $T > 1$ handelt. Diese kann sehr leicht auf folgende Weise gegeben werden. Der Ausdruck

$$T = \frac{\alpha^2}{\alpha^2+\tau} + \frac{\beta^2}{b^2+\tau} + \frac{\gamma^2}{c^2+\tau}$$

in welchem $\tau$ von 0 bis $\infty$ gehen muss, bleibt ganz sicher $< 1$, wenn schon für $\tau = 0$

$$\left(\frac{\alpha}{a}\right)^2 + \left(\frac{\beta}{b}\right)^2 + \left(\frac{\gamma}{c}\right)^2 < 1 \qquad (19)$$

ist, und man hat dann

$$S = -\frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{2\Gamma\left(\frac{s+1}{2}\right)\Gamma\left(3-\frac{s}{2}\right)}\int_0^\infty F(\tau)\,d\tau\,(1-T)^{2-\frac{s}{2}}. \qquad (20)$$

Wäre dagegen

$$\left(\frac{\alpha}{a}\right)^2 + \left(\frac{\beta}{b}\right)^2 + \left(\frac{\gamma}{c}\right)^2 > 1 \qquad (21)$$

so ist für sehr kleine $\tau$ auch noch $T > 1$; wenn aber $\tau$ unbegränzt wächst, so nimmt $T$ continuirlich bis zur Gränze Null ab und folglich muss es einen aber auch nur einen Werth von $\tau$ geben, für welchen $T = 1$ wird; heisst $\tau_1$ derselbe, so ist er nichts Anderes als die einzige positive reelle Wurzel der Gleichung:

$$\frac{\alpha^2}{\alpha^2+\tau} + \frac{\beta^2}{b^2+\tau} + \frac{\gamma^2}{c^2+\tau} = 1 \qquad (22)$$

und zugleich wird für $\tau < \tau_1$, $T > 1$ und $\tau > \tau_1$, $T < 1$. Zerlegen wir nun das Integral:

Digitized by Google

$$\int_0^\infty F(\tau)d\tau\ \Phi(T)$$

in die beiden folgenden

$$\int_0^{\tau_1} F(\tau)d\tau\ \Phi(T) + \int_{\tau_1}^\infty F(\tau)d\tau\ \Phi(T)$$

so ist im ersten Integrale $\tau < \tau_1$, mithin $T > 1$ und $\Phi(T) = 0$, wodurch sich das ganze Integral annullirt. Es bleibt daher blos das zweite Integral übrig, worin $\tau > \tau_1$, $T < 1$ und folglich für $\Phi(T)$ der früher angegebene Werth zu setzen ist. In diesem Falle haben wir

$$S = -\frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{2\Gamma\left(\frac{s+1}{2}\right)\Gamma\left(3-\frac{s}{2}\right)} \int_{\tau_1}^\infty F(\tau)d\tau\,(1-T)^{2-\frac{s}{2}}.$$

Beide Werthe von $S$ lassen sich, wenn man noch für $F(\tau)$ seinen Werth setzt, in der folgenden Formel zusammenfassen:

$$\left.\begin{aligned} S = &-\frac{\pi^{\frac{3}{2}}}{2\Gamma\left(\frac{s+1}{2}\right)\Gamma\left(3-\frac{s}{2}\right)} \\ &\times \int_t^\infty \frac{\tau^{1-\frac{s}{2}}d\tau}{\sqrt{\left(1+\frac{\tau}{a^2}\right)\left(1+\frac{\tau}{b^2}\right)\left(1+\frac{\tau}{c^2}\right)}}\,(1-T)^{2-\frac{s}{2}} \end{aligned}\right\} \quad (23)$$

worin für die untere Gränze $t$ entweder 0 oder die reelle positive Wurzel der Gleichung

$$\frac{a^2}{a^2+\tau} + \frac{\beta^2}{b^2+\tau} + \frac{\gamma^2}{c^2+\tau} = 1$$

zu setzen ist, je nachdem die Summe

$$\left(\frac{a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\beta}{b}\right)^2 + \left(\frac{\gamma}{c}\right)^2$$

unter oder über der Einheit liegt.

Digitized by Google

Vermöge des ursprünglichen Werthes von $S$ und der Formel

$$\Gamma\left(\frac{s+1}{2}\right) = \frac{s-1}{2}\,\Gamma\left(\frac{s-1}{2}\right)$$

können wir nun auch die Gleichung aufstellen:

$$\left.\begin{aligned}&\iiint \frac{dx\,dy\,dz}{\sqrt{(x-a)^2+(y-\beta)^2+(z-\gamma)^2}^{(s-1)}}\\ &= \frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{s-1}{2}\right)\Gamma\left(3-\frac{s}{2}\right)}\int_t^{\infty} \frac{\tau^{1-\frac{s}{2}}\,d\tau}{\sqrt{\left(1+\frac{\tau}{a^2}\right)\left(1+\frac{\tau}{b^2}\right)\left(1+\frac{\tau}{c^2}\right)}}(1-T)^{2-\frac{s}{2}}\end{aligned}\right\} (24)$$

worin $t$ die nämliche Bedeutung hat wie oben und sich die Integrationen der linken Seite auf alle positiven und negativen Werthe von $x$, $y$, $z$ erstrecken, welche der Ungleichung

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 < 1$$

Genüge leisten *).

*) Es ist jetzt auch sehr leicht, die in der vorigen Note betrachteten Componenten $A$, $B$, $C$ zu bestimmen. Die erste findet man durch Differenziation der Gleichung (23) nach $a$, wobei zu bemerken ist, dass $a$ nur in $T$ vorkommt und vermöge des Werthes von $T$

$$\frac{d(1-T)^{2-\frac{s}{2}}}{da} = -\frac{2a(2-\frac{s}{2})}{a^2}\,\frac{1}{1+\frac{\tau}{a^2}}(1-T)^{1-\frac{s}{2}}$$

wird, was sich leicht substituiren lässt.

Digitized by Google

## Cap. V.

## *Reihen, welche mit Hülfe der Gammafunktionen summirt werden können.*

### §. 23.

Von besonderer Wichtigkeit wird uns die schon oft gebrauchte Formel

$$\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\,dx = \frac{\Gamma(p)\,\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} \qquad (1)$$

noch dadurch, dass sich von ihr ein vielfacher Gebrauch zur Summirung verschiedener Reihen machen lässt; so kann man z. B. mit ihrer Hülfe leicht zeigen, wie man die Summe der Reihe

$$\frac{A_0}{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)\ldots(\alpha+p-1)} + \frac{A_1 u}{(\alpha+\beta)(\alpha+\beta+1)\ldots(\alpha+\beta+p-1)}$$
$$+ \frac{A_2 u^2}{(\alpha+2\beta)(\alpha+2\beta+1)\ldots(\alpha+2\beta+p-1)} + \ldots\ldots$$

findet, wenn die der einfacheren

$$A_0 + A_1 u + A_2 u^2 + A_3 u^3 + \ldots.$$

bekannt ist. Da diese Reduktion eine reiche Quelle von Reihensummirungen bildet, so möge eine genauere Exposition derselben folgen.

Vertauscht man in der Formel (1) $p$ und $q$ gegen einander, so ist auch

$$\int_0^1 x^{q-1}(1-x)^{p-1}\,dx = \frac{\Gamma(q)\,\Gamma(p)}{\Gamma(q+p)}$$

und wenn $p$ als ganze positive Zahl vorausgesetzt wird

$$\int_0^1 x^{q-1}(1-x)^{p-1}\,dx = \frac{1\cdot 2\ldots(p-1)}{q(q+1)(q+2)\ldots(q+p-1)}$$

Digitized by Google

und wenn wir das beliebige $q = \alpha + n\beta$ setzen und $1 . 2 \ldots (p-1)$ zur Abkürzung mit $(p-1)'$ bezeichnen

$$\frac{1}{(p-1)'} \int_0^1 x^{\alpha+n\beta-1} (1-x)^{p-1} dx$$

$$= \frac{1}{(\alpha+n\beta)(\alpha+n\beta+1) \ldots (\alpha+n\beta+p-1)}$$

und durch Multiplikation mit $A_n u^n$

$$\frac{1}{(p-1)'} \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{p-1} dx \; A_n (u x^\beta)^n$$

$$= \frac{A_n u^n}{(\alpha+n\beta)(\alpha+n\beta+1) \ldots (\alpha+n\beta+p-1)}.$$

Setzen wir in dieser Gleichung $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$ und addiren alle so entstehenden Glieder, so ergiebt sich

$$\frac{1}{(p-1)'} \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{p-1} dx \; \{A_0 + A_1 u x^\beta + A_2 (u x^\beta)^2 + \ldots .\}$$

$$= \frac{A_0}{\alpha(\alpha+1) \ldots (\alpha+p-1)} + \frac{A_1 u^2}{(\alpha+\beta)(\alpha+\beta+1) \ldots (\alpha+\beta+p-1)}$$

$$+ \frac{A_2 u^2}{(\alpha+2\beta)(\alpha+2\beta+1) \ldots (\alpha+2\beta+p-1)} + \ldots \quad (2)$$

Ist nun die Summe der Reihe

$$A_0 + A_1 u + A_2 u^2 + A_3 u^3 + \ldots . \quad (3)$$

bekannt und heisst $F(u)$ dieselbe, so lässt sich auch die unter dem Integralzeichen vorkommende Reihe summiren, vorausgesetzt nämlich, dass $\beta$ eine positive Grösse ist. Denn wenn die Reihe in (3) überhaupt eine Summe haben soll, so muss sie convergiren, und wenn $\beta$ positiv ist, so wird $x^\beta < x$ d. i. $< 1$ folglich $u x^\beta < u$, und mithin convergirt dann auch die fragliche Reihe auf der linken Seite und hat $F(u x^\beta)$ zur Summe. Diess giebt den Satz: wenn

$$F(u) = A_0 + A_1 u + A_2 u^2 + \ldots . \quad (4)$$

Digitized by Google

ist, so findet unter denselben Bedingungen, unter welchen diese Gleichung besteht, die Relation

$$\frac{1}{(p-1)!}\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{p-1}F(ux^\beta)\,dx$$

$$= \frac{A_0}{\alpha(\alpha+1)\ldots(\alpha+p-1)} + \frac{A_1 u}{(\alpha+\beta)(\alpha+\beta+1)\ldots(\alpha+\beta+p-1)}$$

$$+ \frac{A_2 u^2}{(\alpha+2\beta)(\alpha+2\beta+1)\ldots(\alpha+2\beta+p-1)} + \ldots. \quad (5)$$

statt, sobald $\beta$ eine positive Grösse bezeichnet.

Die noch übrige Integration auf der linken Seite kann man in vielen Fällen dadurch bewerkstelligen, dass $(1-x)^{p-1}$, worin $p-1$ eine positive ganze Zahl ist, in eine nach steigenden Potenzen von $x$ fortgehende Reihe verwandelt, wodurch das fragliche Integral in $p$ andere Integrale von der Form

$$\int_0^1 x^{\alpha+m-1}F(ux^\beta)\,dx$$

zerfällt; dieses letztere reduzirt sich mittelst der Substitution $x^\beta = z$ auf das einfachere

$$\int_0^1 z^{\mu-1}F(uz)\,dz$$

worin $\mu$ zur Abkürzung für $\frac{\alpha+m}{\beta}$ dient. Kann man nun den Werth des vorstehenden Integrales finden, so gelangt man bei diesem Verfahren zu völlig entwickelten Formeln.

Ein bemerkenswerthes Beispiel hierzu bildet die Annahme $A_0 = 1$, $A_1 = \gamma_1$, $A_2 = \gamma_2$ etc. wo $\gamma_1$, $\gamma_2$ etc. die Binomialkoeffizienten des Exponenten $\gamma$ bedeuten mögen; es ist dann $F(u) = (1+u)^\gamma$ und mithin:

Digitized by Google

$$\frac{1}{(p-1)!}\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{p-1}(1+ux^{\beta})^{\gamma}\,dx$$

$$= \frac{1}{\alpha(\alpha+1)\dots(\alpha+p-1)} + \frac{\gamma_1 u}{(\alpha+\beta)(\alpha+\beta+1)\dots(\alpha+\beta+p-1)}$$

$$+ \frac{\gamma_2 u^2}{(\alpha+2\beta)(\alpha+2\beta+1)\dots(\alpha+2\beta+p-1)} + \dots. \quad (6)$$

wozu nun noch die Bedingung $1 > u > -1$ zu fügen ist, weil die Reihe $1 + \gamma_1 u + \gamma_2 u^2 + \dots$, von der wir ausgingen, nur für solche $u$ im Allgemeinen convergirt. Wendet man die vorhin beschriebene Reduktionsmethode hier an, so zerfällt das Integral links in eine Reihe anderer unter der gemeinschaftlichen Form

$$\int_0^1 z^{\mu-1}(1+uz)^{\nu}\,dz$$

stehender, deren weitere Behandlung mittelst bekannter Reduktionsformeln sehr leicht ist. So findet man z. B. für $\alpha=\beta=1$, $\gamma=-1$, $p=3$

$$\frac{(1+u)^2}{2u^3}l(1+u) - \frac{1}{2u^2} - \frac{3}{4u}$$

$$= \frac{1}{1.2.3} - \frac{u}{2.3.4} + \frac{u^2}{3.4.5} - \frac{u^3}{4.5.6} + \dots.$$

$$1 > u > -1$$

und hieraus liessen sich dadurch wieder zwei neue Reihen ableiten, dass man

$$u = v(\cos\omega + \sqrt{-1}\sin\omega), \quad 1 > v > -1$$

setzte und die reellen Partieen beider Seiten der Gleichung identifizirte.

Es verdient noch bemerkt zu werden, dass die Gleichung (6) auch noch für $u = \pm 1$ gilt, wenn $p+\gamma$ eine positive Grösse ist; man erkennt diess, ganz abgesehen von der Herleitung der genannten Formel, leicht aus dem folgenden Satze: wenn die beiden beliebigen Funktionen $\Phi(u)$ und $\Psi(u)$ für jeden Werth von $u < u_1$ identisch

Digitized by Google

sind und sowohl $\Phi(u)$ als $^1\Psi(u)$ für $u = u_1$ noch stetig und endlich bleibt, so ist nothwendig auch $\Phi(u_1) = {}^1\Psi(u_1)$. Denn sollte diess nicht der Fall sein, so können nur zwei Möglichkeiten vorkommen: entweder nämlich besteht die Gleichung $\Phi(u) = {}^1\Psi(u)$ zwar bis zur Stelle $u = u_1$ und verliert hier plötzlich ihre Gültigkeit, oder es hat schon vorher einen Werth $u' < u_1$ gegeben, bei welchem die Identität von $\Phi(u)$ und $^1\Psi(u)$ aufhörte. Der erste Fall würde voraussetzen, dass eine der betrachteten Funktionen sich für $u = u_1$ sprungweis änderte, d. h. eine Unterbrechung der Stetigkeit erlitte, was der gemachten Supposition der Stetigkeit von $\Phi(u)$ und $^1\Psi(u)$ widerspricht; im zweiten Falle gäbe es eine Reihe Werthe von $u$ (nämlich alle zwischen $u'$ und $u_1$ liegenden), zwar $< u_1$, für die aber nicht $\Phi(u) = {}^1\Psi(u)$ wäre und diess würde gegen die Voraussetzung streiten, dass für jedes $u < u_1$ $\Phi(u) = {}^1\Psi(u)$ sein soll. In der Anwendung auf die Gleichung (6) haben wir für $\Phi(u)$ das Integral links und für $^1\Psi(u)$ die Reihe rechts zu setzen. Da wir nun $\alpha$ und $\beta$ als positiv annehmen, so erhellt augenblicklich, dass für positive $\gamma$ das Integral $\Phi(u)$ sowohl für $u = +1$ als für $u = -1$ noch eine stetige und endliche Funktion bleibt, ebenso für negative $\gamma$, wenn $u = +1$ ist, nur bedarf noch der Fall, dass $\gamma$ negativ und $u = -1$ ist, einer besonderen Untersuchung, denn für $\gamma = -\gamma'$ geht dann das Integral in

$$\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}\frac{dx}{(1-x^\beta)^{\gamma'}}$$

über und hier könnte allerdings ein Unendlich- oder Unstetigwerden vorkommen, weil der Quotient

$$\frac{1}{(1-x^\beta)^{\gamma'}}$$

für den noch im Bereiche der Integration liegenden Werth $x = 1$ unendlich und diskontinuirlich wird. Da nun aber $\beta$ positiv ist und $x$ die Gränzen 0 und 1 nicht überschreitet, so ist für das ganze Intervall der Integration $x^\beta \leqq x$ folglich

$$(1-x^\beta)^{\gamma'} \geqq (1-x)^{\gamma'}, \quad \frac{1}{(1-x^\beta)^{\gamma'}} \leqq \frac{1}{(1-x)^{\gamma'}}$$



Digitized by Google

und folglich kann das in Rede stehende Integral nicht mehr als das folgende

$$\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{p-\gamma'-1}\,dx$$

betragen, dessen Werth eine endliche Grösse ist, sobald $p-\gamma'$ d. h. $p+\gamma$ positiv ausfällt. Was ferner die mit $\Psi(u)$ bezeichnete Reihe in Nr. (6) betrifft, so erhellt sehr leicht, dass dieselbe für $u=\pm 1$ convergirt, sobald $p+\gamma$ eine positive Grösse ist; denn zuvörderst braucht man blos zu beachten, dass sie jedenfalls convergirt, wenn die folgende

$$\frac{1}{\alpha(\alpha+1)\ldots(\alpha+p-1)} + \frac{\frac{\gamma}{1}}{(\alpha+\beta)(\alpha+\beta+1)\ldots(\alpha+\beta+p-1)} + \frac{\frac{\gamma(\gamma+1)}{1.2}}{(\alpha+2\beta)(\alpha+2\beta+1)\ldots(\alpha+2\beta+p-1)} + \ldots.$$

diese Eigenschaft besitzt; die Convergenz der letzteren ist aber leicht durch die Bemerkung festzustellen, dass jede Reihe von der Form

$$t_0 + t_1 + t_2 + t_3 + \ldots$$

convergirt, sobald

$$Lim\left[n\left(\frac{t_n}{t_{n+1}} - 1\right)\right] > 1 \qquad (7)$$

wird*), woraus sich in unserem Falle $p+\gamma+1>1$, d. i. wie früher $p+\gamma>0$ ergiebt. Nach diesen Feststellungen erhalten wir nun aus der Gleichung (6) für $u=+1$

$$\frac{1}{(p-1)!}\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{p-1}(1+x^\beta)^\gamma\,dx$$
$$= \frac{1}{\alpha(\alpha+1)\ldots(\alpha+p-1)} + \frac{\gamma_1}{(\alpha+\beta)(\alpha+\beta+1)\ldots(\alpha+\beta+p-1)} + \frac{\gamma_2}{(\alpha+2\beta)(\alpha+2\beta+1)\ldots(\alpha+2\beta+p-1)} + \ldots. \qquad (8)$$

*) M. s. mein *Handb. d. Differ. u. Integralr. S.* 268.

und ebenso für $u = -1$

$$\frac{1}{(p-1)!}\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{p-1}(1-x^\beta)^\gamma dx$$

$$= \frac{1}{\alpha(\alpha+1)\dots(\alpha+p-1)} - \frac{\gamma_1}{(\alpha+\beta)(\alpha+\beta+1)\dots(\alpha+\beta+p-1)}$$

$$+ \frac{\gamma_2}{(\alpha+2\beta)(\alpha+2\beta+1)\dots(\alpha+2\beta+p-1)} - \dots \quad (9)$$

wobei aber $p+\gamma$ positiv sein muss.

Die letztere Gleichung bietet noch einen interessanten speziellen Fall dar; wenn nämlich $\beta = 1$ ist, so giebt die Ausführung der Integration links:

$$\frac{\Gamma(\alpha)\,\Gamma(p+\gamma)}{\Gamma(p)\,\Gamma(\alpha+p+\gamma)}$$

$$= \frac{1}{\alpha(\alpha+1)\dots(\alpha+p-1)} - \frac{\gamma_1}{(\alpha+1)(\alpha+2)\dots(\alpha+p)}$$

$$+ \frac{\gamma_2}{(\alpha+2)(\alpha+3)\dots(\alpha+p+1)} - \dots \quad (10)$$

wobei der Symmetrie wegen $\Gamma(p)$ an der Stelle von $(p-1)!$ steht. Spezialisirt man $\gamma$ zu einer negativen ganzen Zahl, so reduzirt sich die linke Seite auf rein algebraische Grössen.

## §. 24.

Ganz analog den Betrachtungen des vorigen Paragraphen lässt sich auch leicht zeigen, wie man aus der als bekannt vorausgesetzten Reihensumme

$$F(u) = A_0 + A_1 u + A_2 u^2 + \dots$$

die Summe der complizirteren Reihe

$$A_0 + \frac{\beta}{\gamma} A_1 u + \frac{\beta(\beta+1)}{\gamma(\gamma+1)} A_2 u^2 + \dots$$

ableiten kann. Hierzu sind folgende Schritte nöthig.

Digitized by Google

Man hat erstlich bei ganzen positiven $n$

$$\int_0^1 x^{\beta+n-1}(1-x)^{\gamma-\beta-1}\,dx = \frac{\Gamma(\beta+n)\,\Gamma(\gamma-\beta)}{\Gamma(\gamma+n)}$$

$$= \frac{\beta(\beta+1)\ldots(\beta+n-1)}{\gamma(\gamma+1)\ldots(\gamma+n-1)} \cdot \frac{\Gamma(\beta)\,\Gamma(\gamma-\beta)}{\Gamma(\gamma)}$$

und hieraus durch Multiplikation mit $A_n u^n$

$$\frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\beta)\,\Gamma(\gamma-\beta)} \int_0^1 x^{\beta-1}(1-x)^{\gamma-\beta-1}\,dx\,A_n (ux)^n$$

$$= \frac{\beta(\beta+1)(\beta+2)\ldots(\beta+n-1)}{\gamma(\gamma+1)(\gamma+2)\ldots(\gamma+n-1)} A_n u^n.$$

Addirt man nun alles Dasjenige, was sich für $n = 0, 1, 2, \ldots$ aus dieser Gleichung ergiebt, so findet man sogleich:

$$\frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\beta)\,\Gamma(\gamma-\beta)} \int_0^1 x^{\beta-1}(1-x)^{\gamma-\beta-1} F(ux)\,dx$$

$$= A_0 + \frac{\beta}{\gamma} A_1 u + \frac{\beta(\beta+1)}{\gamma(\gamma+1)} A_2 u^2$$

$$+ \frac{\beta(\beta+1)(\beta+2)}{\gamma(\gamma+1)(\gamma+2)} A_3 u^3 + \ldots. \qquad (1)$$

Ein brauchbares Beispiel hierzu bildet die Annahme

$$A_n = \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)\ldots(\alpha+n-1)}{1.2.3\ldots n}$$

woraus

$$F(u) = (1-u)^{-\alpha}$$

folgt, wenn man voraussetzt, dass $u$ innerhalb der Gränzen $+1$ und $-1$ liegt. Die Gleichung (1) giebt dann:

Digitized by Google

$$\frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\beta)\,\Gamma(\gamma-\beta)}\int_0^1 x^{\beta-1}(1-x)^{\gamma-\beta-1}(1-ux)^{-\alpha}\,dx$$

$$= 1 + \frac{\alpha\ \beta}{1\,.\,\gamma}u + \frac{\alpha(\alpha+1)\,.\,\beta(\beta+1)}{1\,.\,2\,.\,\gamma(\gamma+1)}u^2$$

$$+ \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)\,.\,\beta(\beta+1)(\beta+2)}{1\,.\,2\,.\,3\,.\,\gamma(\gamma+1)(\gamma+2)}u^3 + \ldots. \qquad (2)$$

womit die Summe der sogenannten hypergeometrischen Reihe bestimmt ist. — Diese Gleichung lässt sich, ganz abgesehen von ihrer Herleitung, auch noch auf den Fall $u=1$ ausdehnen, wenn man nämlich $\alpha$, $\beta$, $\gamma$ so wählt, dass beide Seiten der Gleichung als Funktionen von $u$ betrachtet, für $u=1$ weder unendlich noch unstetig werden. Die linke Seite geht nun für $u=1$ in

$$\int_0^1 x^{\beta-1}(1-x)^{\gamma-\beta-\alpha-1}\,dx$$

über und das ist noch eine endliche bestimmte Grösse, wenn $\gamma-\beta-\alpha$ positiv ausfällt. Die rechte Seite von (2) verwandelt sich für $u=1$ in

$$1 + \frac{\alpha\,.\,\beta}{1\,.\,\gamma} + \frac{\alpha(\alpha+1)\,.\,\beta(\beta+1)}{1\,.\,2\,.\,\gamma(\gamma+1)} + \ldots.$$

und wenn man auf dieselbe das Theorem (7) im vorigen Paragraphen anwendet, so findet man, dass dieselbe für $\gamma-\alpha-\beta+1>1$ d. i. $\gamma-\alpha-\beta>0$ convergirt, also eine endliche Grösse zur Summe hat. Wir gelangen nun durch Anwendung desselben Prinzips wie im vorigen Paragraphen und unter der Bemerkung, dass

$$\int_0^1 x^{\beta-1}(1-x)^{\gamma-\beta-\alpha-1}\,dx = \frac{\Gamma(\beta)\,\Gamma(\gamma-\beta-\alpha)}{\Gamma(\gamma-\alpha)}$$

ist, zu der folgenden sehr eleganten und von Gauss zuerst bewiesenen Formel:

$$\left.\begin{aligned}\frac{\Gamma(\gamma)\,\Gamma(\gamma-\beta-\alpha)}{\Gamma(\gamma-\alpha)\,\Gamma(\gamma-\beta)} &= 1 + \frac{\alpha\,.\,\beta}{1\,.\,\gamma} + \frac{\alpha(\alpha+1)\,.\,\beta(\beta+1)}{1\,.\,2\,.\,\gamma(\gamma+1)} \\ &\quad + \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)\,.\,\beta(\beta+1)(\beta+2)}{1\,.\,2\,.\,3\,.\,\gamma(\gamma+1)(\gamma+2)} + \ldots \\ \gamma &> \alpha+\beta\,.\end{aligned}\right\} \qquad (3)$$

Digitized by Google

Da $\alpha$, $\beta$, $\gamma$ bis auf die letzte Bedingung willkührlich sind, so enthält diese Gleichung eine Menge anderer Summenformeln in sich; so wird z. B. für $\alpha = 1$

$$\frac{\gamma-1}{\gamma-\beta-1} = 1 + \frac{\beta}{\gamma} + \frac{\beta(\beta+1)}{\gamma(\gamma+1)} + \ldots.$$

$$\gamma > \beta + 1$$

wie man auch auf elementarem Wege finden kann.

Ein zweites Beispiel für das Theorem in (1) liefert die Supposition

$$A_n = \frac{(-1)^n}{1 \cdot 2 \ldots (2n)}$$

woraus $F(u) = \cos\sqrt{u}$ folgt und:

$$\frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma-\beta)} \int_0^1 x^{\beta-1}(1-x)^{\gamma-\beta-1} \cos\sqrt{ux}\, dx$$

$$= 1 + \frac{\beta u}{1.2.\gamma} + \frac{\beta(\beta+1)u^2}{1.2.3.4.\gamma(\gamma+1)} - \ldots\ldots$$

oder $u^2$ für $u$ und $x = \vartheta^2$ gesetzt

$$\frac{2\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma-\beta)} \int_0^1 \vartheta^{2\beta-1}(1-\vartheta^2)^{\gamma-\beta-1} \cos u\vartheta\, d\vartheta$$

$$= 1 - \frac{\beta u^2}{1.2.\gamma} + \frac{\beta(\beta+1)u^4}{1.2.3.4.\gamma(\gamma+1)} - \frac{\beta(\beta+1)(\beta+2)u^6}{1.2..6.\gamma(\gamma+1)(\gamma+2)} + \ldots.$$

Hieraus folgt zum Exempel für $\beta = \frac{1}{2}$ wenn man $2u$ für $u$ setzt

$$\frac{2\Gamma(\gamma)}{\sqrt{\pi}\,\Gamma(\gamma-\frac{1}{2})} \int_0^1 (1-\vartheta^2)^{\gamma-\frac{3}{2}} \cos 2u\vartheta\, d\vartheta$$

$$= 1 - \frac{u^2}{1.\gamma} + \frac{u^4}{1.2.\gamma(\gamma+1)} - \frac{u^6}{1.2.3\ \gamma(\gamma+1)(\gamma+2)} + \ldots..$$

Digitized by Google

Man kann dieser Gleichung noch ein paar andere Gestalten verleihen, wenn man erst

$$\gamma = \frac{\mu+1}{\mu+2}, \quad u^2 = \frac{ab\,x^{\mu+2}}{(\mu+2)^2}$$

und dann

$$\gamma = \frac{\mu+3}{\mu+2}, \quad u^2 = \frac{ab\,x^{\mu+2}}{(\mu+2)^2}$$

nimmt, wo $x$ die Rolle einer arbiträren Constanten spielt.

Man findet so:

$$\frac{2\Gamma\left(\frac{\mu+1}{\mu+2}\right)}{\sqrt{\pi}\,\Gamma\left(\frac{\mu}{2\mu+4}\right)} \int_0^1 (1-\vartheta^2)^{-\frac{\mu+4}{2\mu+4}} \cos\left(\frac{2\vartheta\sqrt{ab\,x^{\mu+2}}}{\mu+2}\right) d\vartheta$$

$$= 1 - \frac{ab\,x^{\mu+2}}{(\mu+1)(\mu+2)} + \frac{a^2b^2x^{2\mu+4}}{(\mu+1)(\mu+2)(2\mu+3)(2\mu+4)}$$

$$- \frac{a^3b^3x^{3\mu+6}}{(\mu+1)(\mu+2)(2\mu+3)(2\mu+4)(3\mu+5)(3\mu+6)} + \ldots. \quad (4)$$

und

$$\frac{2\Gamma\left(\frac{\mu+3}{\mu+2}\right)}{\sqrt{\pi}\,\Gamma\left(\frac{\mu+4}{2\mu+4}\right)} \int_0^1 (1-\vartheta^2)^{-\frac{\mu}{2\mu+4}} \cos\left(\frac{2\vartheta\sqrt{ab\,x^{\mu+2}}}{\mu+2}\right) d\vartheta$$

$$= 1 - \frac{ab\,x^{\mu+2}}{(\mu+2)(\mu+3)} + \frac{a^2b^2x^{2\mu+4}}{(\mu+2)(\mu+3)(2\mu+4)(2\mu+5)}$$

$$- \frac{a^3b^3x^{3\mu+6}}{(\mu+2)(\mu+3)(2\mu+4)(2\mu+5)(3\mu+6)(3\mu+7)} + \ldots. \quad (5)$$

Von Summenformeln dieser Art lässt sich oft ein sehr vortheilhafter Gebrauch zur Integration von Differenzialgleichungen machen.

Digitized by Google

In vielen Fällen nämlich ist es bekanntlich nicht leicht, das Integral einer Differenzialgleichung in geschlossener Form anzugeben und dann begnügt man sich damit, dasselbe mittelst der Methode der unbestimmten Coeffizienten in eine Reihe zu verwandeln. Diese Reihen lassen sich aber oft mit Hülfe solcher Formeln, wie wir sie oben entwickelt haben, summiren und hierdurch gelangt man dann wieder zu einer geschlossenen Form des Integrales, welche das Eigenthümliche hat, dass die unabhängige Variable der Differenzialgleichung als arbiträre Constante des Integrales auftritt. Um diess an einem Beispiele zu zeigen, sei

$$\frac{d^2y}{dx^2} = kx^\mu y \tag{6}$$

die zu integrirende Differenzialgleichung und darin $k$ eine Constante. Setzt man hier

$$y = Ax^\lambda + A_1 x^{\lambda_1} + A_2 x^{\lambda_2} + A_3 x^{\lambda_3} + \ldots.$$

so muss nach dem Vorigen

$$A\lambda(\lambda-1)x^{\lambda-2} + A_1\lambda_1(\lambda_1-1)x^{\lambda_1-2} + A_2\lambda_2(\lambda_2-1)x^{\lambda_2-2} + \ldots.$$
$$= kx^\mu\{Ax^\lambda + A_1x^{\lambda_1} + A_2x^{\lambda_2} + A_3x^{\lambda_3} + \ldots.\}$$

sein, woraus, wenn $A_m$ und $\lambda_m$ irgend einen Coeffizienten und Exponenten der Reihe bezeichnen, die Gleichungen:

$$\lambda(\lambda-1) = 0$$
$$\lambda_m - 2 = \lambda_{m-1} + \mu, \quad A_m\lambda_m(\lambda_m-1) = kA_{m-1}$$

folgen; bestimmt man hieraus die Grössen $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, A_1, A_2, \ldots$ und bemerkt, dass wegen der ersten Gleichung $\lambda$ ebensowohl $=0$ als $=1$ sein kann, so findet man für $y$ die beiden verschiedenen Werthe

$$y = A + \frac{kAx^{\mu+2}}{(\mu+1)(\mu+2)} + \frac{k^2Ax^{2\mu+4}}{(\mu+1)(\mu+2)(2\mu+3)(2\mu+4)}$$
$$+ \frac{k^3Ax^{3\mu+6}}{(\mu+1)(\mu+2)(2\mu+3)(2\mu+4)(3\mu+5)(3\mu+6)} + \ldots.$$

Digitized by Google

und

$$y = Ax + \frac{kAx^{\mu+3}}{(\mu+2)(\mu+3)} + \frac{k^2Ax^{2\mu+5}}{(\mu+2)(\mu+3)(2\mu+4)(2\mu+5)} + \frac{k^3Ax^{3\mu+7}}{(\mu+2)(\mu+3)(2\mu+4)(2\mu+5)(3\mu+6)(3\mu+7)} + \ldots.$$

und diess sind die beiden partikulären Auflösungen der Differenzialgleichung. Giebt man in der zweiten dem $A$ einen anderen Werth als in der ersten, indem man etwa $B$ für $A$ schreibt, so ist jetzt das allgemeine Integral

$$y = A\left\{1 + \frac{kx^{\mu+2}}{(\mu+1)(\mu+2)} + \frac{k^2x^{2\mu+4}}{(\mu+1)(\mu+2)(2\mu+3)(2\mu+4)} + \ldots.\right\}$$
$$+ Bx\left\{1 + \frac{kx^{\mu+2}}{(\mu+2)(\mu+3)} + \frac{k^2x^{2\mu+4}}{(\mu+2)(\mu+3)(2\mu+4)(2\mu+5)} + \ldots.\right\}$$

worin $A$ und $B$ die Integrationsconstanten sind. Nehmen wir noch $k = -ab$, so gehen die eingeklammerten Reihen in diejenigen über, welche wir in Nr. (5) und (6) summirt haben; substituiren wir ihre dort bestimmten Summen und rechnen die constanten Faktoren der Integrale in (5) und (6) mit in die Constanten $A$ und $B$ ein, so ergiebt sich, dass das vollständige Integral der Differenzialgleichung

$$\frac{d^2y}{dx^2} + abx^\mu y = 0 \qquad (7)$$

durch folgende Formel dargestellt wird:

$$y = A\int_0^1 (1-\vartheta^2)^{-\frac{\mu+4}{2\mu+4}} \cos\left(\frac{2\vartheta\sqrt{abx^{\mu+2}}}{\mu+2}\right) d\vartheta + Bx\int_0^1 (1-\vartheta^2)^{-\frac{\mu}{2\mu+4}} \cos\left(\frac{2\vartheta\sqrt{abx^{\mu+2}}}{\mu+2}\right) d\vartheta \qquad (8)^*)$$

*) Diese sehr elegante Entwickelung giebt Kummer im 12ten Bande des *Crelle*'schen *Journals* S. 144.



Digitized by Google

die sich noch viel besser gestaltet, wenn man zur Abkürzung

$$\frac{\mu+2}{2} = m, \quad \frac{2\sqrt{ab}}{\mu+2} = k$$

setzt und statt $\vartheta$ eine neue Variable $\vartheta = \sin t$ einführt; es wird dann

$$\left.\begin{aligned} y \;=\; & A \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t)^{-\frac{1}{m}} \cos(k x^m t)\, dt \\ & + Bx \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t)^{+\frac{1}{m}} \cos(k x^m t)\, dt \;. \end{aligned}\right\} \quad (9)$$

Hieraus lässt sich auch noch das Integral der Riccatischen Differenzialgleichung ableiten; setzt man nämlich

$$y = e^{a\int z\, dx}$$

so geht die Differenzialgleichung (7) in die folgende über

$$\frac{dz}{dx} + az^2 + bx^\mu = 0 \qquad (10)$$

welche eben die Riccatische ist; da aber aus dem Vorigen

$$z = \frac{1}{a}\,\frac{dly}{dx} = \frac{1}{ay}\,\frac{dy}{dx}$$

folgt, so giebt die vorstehende Formel das Integral von (10), wenn man in ihr für $y$ den durch Nr. (9) bestimmten Werth setzt.

Bei aller Nettigkeit, welche diese Integrationsmethode auszeichnet, darf man sich jedoch nicht verhehlen, dass das Verfahren ein sehr indirektes ist, in so fern man den Umweg über eine unendliche Reihe macht und dass man damit, wie bei indirekten Methoden immer, auf grosse Unbequemlichkeiten stossen kann, sobald nämlich die für die Reihencoeffizienten und Exponenten entwickelte Rekursionsformel das independente Gesetz derselben nur schwer übersehen lässt. Es ist daher besser, das gesuchte Integral $y$ gleich von vornherein in die Form:

Digitized by Google

$$y = \int \varphi(x, t)\, dt$$

zu stellen und aus der ursprünglichen Differenzialgleichung eine zweite für $\varphi(x, t)$ abzuleiten, deren Integration oft viel leichter ist *).

Die Formel (1) kann auch zur Auffindung bestimmter Integrale dienen, wenn man die Coeffizienten $A_0$, $A_1$, $A_2$, etc. so zu wählen weiss, dass sich die Reihen

$$A_0 + A_1 u + A_2 u^2 + \ldots.$$

$$A_0 + \frac{\beta}{\gamma} A_1 u + \frac{\beta(\beta+1)}{\gamma(\gamma+1)} A_2 u^2 + \ldots.$$

gleichzeitig summiren lassen, also in (1) sowohl die linke als rechte Seite eine geschlossene Form annimmt. In dieser Beziehung ist besonders ein Fall von Interesse; setzt man nämlich $\alpha$ für $\gamma$, $u = 1$, $x = sin^2 z$ und zur Abkürzung $F(sin^2 z) = \Phi(z)$, so geht die Gleichung (1) in die folgende über:

$$\left.\begin{aligned} &\frac{2\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\beta)\,\Gamma(\alpha-\beta)} \int_0^{\frac{\pi}{2}} sin^{2\beta-1} z\, cos^{2\alpha-2\beta-1} z\, \Phi(z)\, dz \\ &= A_0 + \frac{\beta}{\alpha} A_1 + \frac{\beta(\beta+1)}{\alpha(\alpha+1)} A_2 + \frac{\beta(\beta+1)(\beta+2)}{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)} A_3 + \ldots. \end{aligned}\right\} \quad (11)$$

wo nun

$$\Phi(z) = A_0 + A_1 sin^2 z + A_2 sin^4 z + A_3 sin^6 z + \ldots \quad (12)$$

ist. Nimmt man nun z. B.

$$A_0 = 1, \quad A_1 = -\frac{\alpha \cdot \alpha}{\frac{1}{2} \cdot 1}, \quad A_2 = +\frac{\alpha(\alpha-1) \cdot \alpha(\alpha+1)}{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot 1 \cdot 2},$$

$$A_3 = -\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \cdot \alpha(\alpha+1)(\alpha+2)}{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3}, \text{ u. s. f.}$$

so wird:

---

*) Einige geschickte Ausführungen dieses Gedankens giebt Lobatto in *Crelle's Journal, Band* 17, *S.* 363, wo auch die Formel (9) entwickelt wird.

Digitized by Google

$$\Phi(z) = 1 - \frac{\alpha^2}{1.2}(2\sin z)^2 + \frac{\alpha^2(\alpha^2-1^2)}{1.2.3.4}(2\sin z)^4 - \frac{\alpha^2(\alpha^2-1^2)(\alpha^2-2^2)}{1.2.3.4.5.6}(2\sin z)^6 + \ldots.$$

d. i. nach einer sehr bekannten Formel $\Phi(z) = \cos 2\alpha z$. Die rechte Seite der Gleichung (11) wird ferner:

$$1 - \frac{\alpha.\beta}{\frac{1}{2}.1} + \frac{\alpha(\alpha-1).\beta(\beta+1)}{\frac{1}{2}.\frac{3}{2}.1.2} - \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2).\beta(\beta+1)(\beta+2)}{\frac{1}{2}.\frac{3}{2}.\frac{5}{2}.1.2.3} + \ldots..$$

und diese Reihe kann mit Hülfe der Formel (3) summirt werden, wenn man daselbst $-\alpha$ für $\alpha$ und $\gamma = \frac{1}{2}$ setzt. Nach diesen Bemerkungen ergiebt sich

$$\frac{2\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\beta)\,\Gamma(\alpha-\beta)} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2\beta-1} z \cos^{2\alpha-2\beta-1} z \cos 2\alpha z\, dz$$

$$= \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\,\Gamma(\frac{1}{2}-\beta+\alpha)}{\Gamma(\frac{1}{2}+\alpha)\,\Gamma(\frac{1}{2}-\beta)}$$

wobei nun $\frac{1}{2} > \beta > 0$ sein muss, wenn keine der Gammafunktionen unendlich werden soll. Setzt man noch

$$\beta = \frac{\mu}{2}, \quad \alpha = \frac{\mu+\nu}{2}$$

und berücksichtigt die Formel

$$\Gamma(\gamma)\,\Gamma(\gamma+\tfrac{1}{2}) = 2^{\frac{1}{2}-2\gamma}\sqrt{2\pi}\,\Gamma(2\gamma)$$

so findet man jetzt sehr leicht

$$\left.\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\mu-1} z \cos^{\nu-1} z \cos(\mu+\nu)z\, dz &= \frac{\Gamma(\mu)\,\Gamma(\nu)}{\Gamma(\mu+\nu)} \cos\tfrac{1}{2}\mu\pi \\ 1 > \tfrac{1}{2}\mu > 0 &. \end{aligned}\right\} \quad (13)$$

Man kann hieraus gleich noch ein ähnlich gebildetes Integral ableiten. Führt man nämlich statt $z$ die neue Variable $\frac{\pi}{2} - y$ ein und

Digitized by Google

vertauscht $\mu$ und $\nu$ gegeneinander, so geht das obige Integral in das folgende über

$$\cos(\mu+\nu)\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{\nu-1}y\sin^{\mu-1}y\cos(\mu+\nu)y\,dy$$

$$+\sin(\mu+\nu)\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{\nu-1}y\sin^{\mu-1}y\sin(\mu+\nu)y\,dy$$

$$=\frac{\Gamma(\mu)\,\Gamma(\nu)}{\Gamma(\mu+\nu)}\cos\tfrac{1}{2}\nu\pi\,.$$

Bestimmt man den Werth des zweiten Integrales links nach Formel (13), so giebt die Transposition, wenn wieder $z$ für $y$ geschrieben wird

$$\left.\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{\mu-1}z\cos^{\nu-1}z\sin(\mu+\nu)z\,dz &= \frac{\Gamma(\mu)\,\Gamma(\nu)}{\Gamma(\mu+\nu)}\sin\tfrac{1}{2}\mu\pi\\ 1>\tfrac{1}{2}\mu>0\,.&\end{aligned}\right\}\quad(14)$$

Eine zweite derartige Anwendung der Formel (11) bildet die Annahme $\beta=\frac{1}{2}$, $\alpha=\nu$

$$A_0=1,\quad A_1=-\frac{\frac{\mu}{2}\cdot\frac{\mu}{2}}{\frac{1}{2}\cdot 1},\quad A_2=+\frac{\frac{\mu}{2}\left(\frac{\mu}{2}-1\right)\frac{\mu}{2}\left(\frac{\mu}{2}+1\right)}{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot 1\cdot 2},$$

$$A_3=-\frac{\frac{\mu}{2}\left(\frac{\mu}{2}-1\right)\left(\frac{\mu}{2}-2\right)\frac{\mu}{2}\left(\frac{\mu}{2}+1\right)\left(\frac{\mu}{2}+2\right)}{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{5}{2}\cdot 1\cdot 2\cdot 3},\ \text{u. s. f.}$$

es wird hierdurch ähnlich wie vorhin $\Phi(z)=\cos\mu z$, und die rechte Seite der Gleichung (11) geht über in

$$1-\frac{\frac{\mu}{2}\cdot\frac{\mu}{2}}{1\cdot\nu}+\frac{\frac{\mu}{2}\left(\frac{\mu}{2}-1\right)\frac{\mu}{2}\left(\frac{\mu}{2}+1\right)}{1\cdot 2\cdot\nu(\nu+1)}-\ldots\ldots$$

Digitized by Google

und die Summe dieser Reihe ist nach Formel (3) für $\alpha = -\frac{\mu}{2}$, $\beta = +\frac{\mu}{2}$, $\gamma = \nu$,

$$\frac{\Gamma(\nu)\,\Gamma(\nu)}{\Gamma\left(\nu+\frac{\mu}{2}\right)\,\Gamma\left(\nu-\frac{\mu}{2}\right)}.$$

Nach Formel (11) ist jetzt

$$\frac{2\Gamma(\nu)}{\Gamma(\frac{1}{2})\,\Gamma(\nu-\frac{1}{2})}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2\nu-2} z\cos\mu z\,dz = \frac{\Gamma(\nu)\,\Gamma(\nu)}{\Gamma\left(\nu+\frac{\mu}{2}\right)\,\Gamma\left(\nu-\frac{\mu}{2}\right)}$$

woraus man für $\nu = \frac{\lambda+2}{2}$ leicht findet:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{\lambda} z\cos\mu z\,dz = \frac{\pi\Gamma(\lambda+1)}{\Gamma\left(1+\frac{\lambda+\mu}{2}\right)\,\Gamma\left(1+\frac{\lambda-\mu}{2}\right)}. \quad (15)^*)$$

## §. 25.

Von besonderem Interesse ist noch ein Theorem, wonach man aus einer bereits bekannten Reihensumme von der Form:

$$F(r,z) = A_0 + A_1 r\cos z + A_2 r^3\cos 2z + \ldots \quad (1)$$

die Summe der Reihe

$$A_0 + A_1 rq + A_2 r^3 q^4 + A_3 r^3 q^9 + \ldots.$$

ableiten kann, worin $q$ einen beliebigen ächten Bruch bedeutet. Man hat nämlich nach der Formel (8) in §. 12 für $\alpha = 1$, $\beta = 2nk$:

---

*) Grossen Reichthum an solchen Reihenvergleichungen, die wieder zur Kenntniss bestimmter Integrale führen, entfaltet Kummer in *Crelle's Journal, Bd.* 17, *S.* 210 u. *S.* 288; *Bd.* 20, *S.* 1.

Digitized by Google

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \cos 2nkx\, e^{-x^2} dx = e^{-(nk)^2}$$

und wenn man diese Gleichung mit $A_n r^n$ multiplizirt, darauf $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$ setzt und Alles addirt

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \{A_0 + A_1 r \cos 2kx + A_2 r^2 \cos 4kx + \ldots\} e^{-x^2} dx$$

$$= A_0 + A_1 r e^{-k^2} + A_2 r^2 e^{-(2k)^2} + A_3 r^3 e^{-(3k)^2} + \ldots.$$

wobei sich die linke Seite vermöge der in Nr. (1) gemachten Voraussetzung kürzer durch

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty F(r, 2kx)\, e^{-x^2} dx$$

ausdrücken lässt. Setzt man noch $e^{-k^2} = q$, also $k = \sqrt{l\left(\frac{1}{q}\right)}$, so wird das allgemeine Glied der vorigen Reihe

$$e^{-(nk)^2} = (e^{-k^2})^{n^2} = q^{n^2}$$

und folglich

$$\left.\begin{aligned} &\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty F\left(r, 2x\sqrt{l\left(\frac{1}{q}\right)}\right) e^{-x^2} dx \\ &= A_0 + A_1 rq + A_2 r^2 q^4 + A_3 r^3 q^9 + \ldots. \end{aligned}\right\} \quad (2)$$

Diess Theorem ist deswegen bemerkenswerth, weil hier die Coefficienten von $q$ eine arithmetische Reihe zweiter Ordnung bilden. Nimmt man beispielsweis $A_0 = 0$, $A_1 = 1$, $A_2 = \frac{1}{2}$, $A_3 = \frac{1}{3}$ etc. oder

$$\tfrac{1}{2} l(1 - 2r\cos z + r^2) = r\cos z + \tfrac{1}{2} r^2 \cos 2z + \ldots. \quad (3)$$

so wird

$$\left.\begin{aligned} &\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty l(1 - 2r\cos 2kx + r^2)\, e^{-x^2} dx \\ &= rq + \tfrac{1}{2} r^2 q^4 + \tfrac{1}{3} r^3 q^9 + \tfrac{1}{4} r^4 q^{16} + \ldots.. \end{aligned}\right\} \quad (4)$$

Digitized by Google

wobei $k$ wieder zur Abkürzung für $\sqrt{l\left(\frac{1}{q}\right)}$ dient. Da die Gleichung (3) auch für $r=1$ noch besteht, für alle $x$ von $x=0$ bis $x=\infty$, so ist noch

$$\left.\begin{aligned}&\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_0^\infty l(2\sin kx)^2\, e^{-x^2}\,dx\\ &= q + \tfrac{1}{2}q^4 + \tfrac{1}{3}q^9 + \tfrac{1}{4}q^{16} + \ldots.\end{aligned}\right\} \quad (5)$$

ebenso für $r=-1$

$$\left.\begin{aligned}&-\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_0^\infty l(2\cos kx)^2\, e^{-x^2}\,dx\\ &= q - \tfrac{1}{2}q^4 + \tfrac{1}{3}q^9 - \tfrac{1}{4}q^{16} + \ldots..\end{aligned}\right\} \quad (6)$$

In vielen Fällen ist die Spezialisirung $r=1$, welche wir in diesem Beispiele vornehmen durften, nicht erlaubt, weil dabei die Reihe für $F(r,z)$ convergent zu sein aufhört, wie z. B. in

$$\frac{1-r\cos z}{1-2r\cos z+r^2} = 1 + r\cos z + r^2\cos 2z + \ldots..$$

und man findet dann auf die vorige Weise den Werth von

$$A_0 + A_1 q + A_2 q^4 + A_3 q^9 + \ldots.$$

nicht. Für solche Fälle dient die folgende Rechnung. Sei

$$\Phi(r,z) = A_1 r\cos z + A_2 r^2\cos 3z + A_3 r^3\cos 5z + \ldots. \quad (7)$$

so findet man ebenso leicht wie früher

$$\left.\begin{aligned}&\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^\infty \Phi(r,2kx)\, e^{-x^2}\,dx\\ &= A_1 r\, e^{-k^2} + A_2 r^2\, e^{-(3k)^2} + A_3 r^3\, e^{-(5k)^2} + \ldots...\end{aligned}\right\} \quad (8)$$

wobei die Glieder der Reihe unter der Form

$$A_n r^n\, e^{-(\overline{2n-1}\,k)^2} = A_n r^n\,(e^{-k^2})^{4n^2-4n+1}$$

stehen. Nehmen wir jetzt:

Digitized by Google

$$e^{-k^2} = r^{\frac{1}{4}}$$

woraus folgt

$$k = \tfrac{1}{2}\sqrt{l\left(\frac{1}{r}\right)}$$

so geht das vorige allgemeine Glied in

$$A_n r^{n^2+\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{r}\, A_n r^{n^2}$$

über, und die Gleichung (8) giebt

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \Phi\left(r, x\sqrt{l\left(\frac{1}{r}\right)}\right) e^{-x^2} dx$$

$$= \sqrt[4]{r}\left\{A_1 r + A_2 r^4 + A_3 r^9 + \ldots\ldots\right\}$$

oder $q$ für $r$ geschrieben

$$\left.\begin{aligned} &\frac{2}{\sqrt{\pi}\sqrt[4]{q}} \int_0^\infty \Phi\left(q, x\sqrt{l\left(\frac{1}{q}\right)}\right) e^{-x^2} dx \\ &= A_1 q + A_2 q^4 + A_3 q^9 + A_4 q^{16} + \ldots\ldots \end{aligned}\right\} \quad (9)$$

wobei

$$\Phi(q, z) = A_1 q \cos z + A_2 q^2 \cos 3z + A_3 q^3 \cos 5z + \ldots\ldots \quad (10)$$

und $q$ vermöge seiner Bedeutung $= r = e^{-4k^2}$ ein ächter Bruch ist.

Ein sehr einfaches Beispiel hierzu liefert die Annahme $A_1 = A_2 = A_3 \ldots$ $\ldots = 1$; sie giebt, wie man leicht findet

$$\Phi(q, z) = \frac{(1-q)q\cos z}{1 - 2q\cos 2z + q^2}$$

und folglich wenn $h$ zur Abkürzung für $\sqrt{l\left(\frac{1}{q}\right)}$ dient

$$\left.\begin{aligned} &\frac{2}{\sqrt{\pi}}(1-q)\sqrt[4]{q^3} \int_0^\infty \frac{\cos hx\, dx}{1 - 2q\cos 2hx + q^2} e^{-x^2} \\ &= q + q^4 + q^9 + q^{16} + q^{25} + \ldots\ldots \end{aligned}\right\} \quad (11)$$



Digitized by Google

Für $A_1 = 1$, $A_2 = -1$, $A_3 = +1$, $A_4 = -1$ etc. Dagegen wird

$$\Phi(q, z) = \frac{(1+q)q\cos z}{1 + 2q\cos 2z + q^2}$$

und folglich

$$\left.\begin{aligned} &\frac{2}{\sqrt{\pi}}(1+q)\sqrt[4]{q^3}\int_0^\infty \frac{\cos hx\,dx}{1 + 2q\cos 2hx + q^2} e^{-x^2} \\ &= q - q^4 + q^9 - q^{16} + q^{25} - \ldots\ldots \end{aligned}\right\} \quad (12)$$

In so fern man ein einfaches bestimmtes Integral stets als eine bekannte Grösse ansehen kann, die sich näherungsweis berechnen lässt, sind hiermit auch die Summen jener Reihen als gefunden zu betrachten. Man wird übrigens leicht bemerken, dass die so eben angestellten Untersuchungen noch einer Verallgemeinerung fähig sind, bei welcher man aus der Summe der Reihe $A_0 + A_1 u + A_2 u^2 + \ldots$. die Summe derjenigen ableitet, wovon das allgemeine Glied durch $A_n q^{n^2\alpha + n\beta}$ dargestellt wird, worin also die Exponenten eine beliebige arithmetische Reihe zweiter Ordnung bilden. Andererseits ist auch bekannt, dass der berühmte Verfasser der *Fundamenta nova* schon mehrere Reihen der Art durch elliptische Funktionen summirt hat, und diess gestattet dann wieder eine Vergleichung der verschiedenen Formen, unter welchen sich jene Summen darstellen, je nachdem man sich der einen oder anderen Methode bedient.

Digitized by Google

# II.

# Berechnung und Gebrauch

der

# Gammafunktionentafel.

---

Digitized by Google

Digitized by Google

## *Berechnung und Gebrauch der Gammafunktionentafel.*

Für die Aufstellung eines Canons, welcher die Werthe von $\Gamma(\mu)$ enthalten soll, sind zunächst zwei Bemerkungen von Gewicht; die erste besteht, wie schon früher angegeben wurde, in dem Satze, dass sich die Werthe von $\Gamma(\mu)$ für jedes beliebige $\mu$ leicht auffinden lassen, wenn man die dem Intervalle $\mu = 0$ bis $\mu = 1$ entsprechenden Werthe von $\Gamma(\mu)$ kennt, und dieses Theorem lässt sich ohne Schwierigkeit noch dahin erweitern, dass man sagt: die Werthe von $\Gamma(\mu)$ sind sämmtlich als bekannt anzusehen, sobald die dem Intervalle $\mu = n$ bis $\mu = n + 1$, wo $n$ eine positive ganze Zahl ist, entsprechenden Werthe von $\Gamma(\mu)$ berechnet vorliegen. Richten wir nun weiter unsere Aufmerksamkeit auf diejenigen Formeln, mittelst deren $\Gamma(\mu)$ für $\mu < n$ oder $\mu > n + 1$ auf den Werth von $\Gamma(\mu)$ für den Fall $n + 1 > \mu > n$ reduzirt wird, erinnern wir uns mit einem Worte an die Beziehungen

$$\Gamma(\mu+1) = \mu\,\Gamma(\mu), \quad \Gamma(\mu+2) = \mu(\mu+1)\,\Gamma(\mu), \quad \ldots\ldots$$

$$\Gamma(\mu-1) = \frac{\Gamma(\mu)}{\mu-1}, \quad \Gamma(\mu-2) = \frac{\Gamma(\mu)}{(\mu-1)(\mu-2)}, \quad \ldots\ldots$$

so lässt das Vorkommen von blosen Multiplikationen und Divisionen in ihnen gleich erkennen, dass es für die Praxis am vortheilhaftesten sein werde, nicht eine Tafel für $\Gamma(\mu)$ selbst, sondern für die Logarithmen dieser Funktion eine solche aufzustellen und zwar nach dem Briggischen Systeme berechnet, um die Tafel selbst mit den gewöhnlichen logarithmischen Tafeln gleichzeitig benutzen zu können. Um aber eine bequeme Bezeichnung zu haben, wollen wir ein für allemal

$$log\,\Gamma(\mu) = \mathcal{M}(\mu) \qquad (1)$$

setzen, wobei 10 die Basis des logarithmischen Systems ist.

Digitized by Google

Wenn es nun zunächst darauf ankäme, eine kleinere Tafel für $\Delta(\mu)$ unter der Voraussetzung zu berechnen, dass $\mu$ der Reihe nach $= \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \frac{3}{n}, \ldots \frac{n-1}{n}$ gesetzt wird, ein Fall, der bei mehreren höheren Untersuchungen vorkommt, so leisten die verschiedenen Reduktionsformeln, welche wir für die Gammafunktionen entwickelt haben, in so fern die trefflichsten Dienste, als sie die Berechnung jener $n-1$ verschiedenen $\Delta$, auf die Berechnung einer ungleich geringeren Zahl solcher Funktionen zurückführen. Nehmen wir z. B. von der Gleichung

$$\Gamma\left(\frac{k}{n}\right)\Gamma\left(1-\frac{k}{n}\right) = \frac{\pi}{\sin\frac{k}{n}\pi}$$

die Logarithmen, so ergiebt sich nach unserer in Nr. (1) eingeführten Bezeichnung

$$\Delta\left(\frac{k}{n}\right) + \Delta\left(1-\frac{k}{n}\right) = \log\pi - \log\sin\frac{k}{n}\pi$$

oder

$$\Delta\left(\frac{n-k}{n}\right) = \log\pi - \log\sin\frac{k}{n}\pi - \Delta\left(\frac{k}{n}\right) \qquad (2)$$

und hieraus geht hervor, dass man $\Delta(\mu)$ nur für die dem Intervalle $\mu = 0$ bis $\mu = \frac{1}{2}$ angehörigen Werthe von $\mu$ zu berechnen braucht, weil dann für $\mu > \frac{1}{2}$ und $< 1$ die obige Formel sogleich die übrigen $\Delta$ angiebt. Man würde also für ein gerades $n$ nur

$$\Delta\left(\frac{1}{n}\right),\ \Delta\left(\frac{2}{n}\right),\ \ldots\ \Delta\left(\frac{\frac{1}{2}n-1}{n}\right), \qquad (3)$$

und für ein ungerades nur

$$\Delta\left(\frac{1}{n}\right),\ \Delta\left(\frac{2}{n}\right),\ \ldots\ldots\ \Delta\left(\frac{\frac{1}{2}(n-1)}{n}\right) \qquad (4)$$

zu berechnen haben und dann mittelst der Formel (2) die Werthe von $\Delta\left(\frac{n-1}{n}\right)$, $\Delta\left(\frac{n-2}{n}\right)$, .... ableiten. Aber selbst zwischen diesen unter (3) und (4) aufgeführten Funktionen finden Beziehungen statt,

Digitized by Google

welche die Zahl der unmittelbar zu berechnenden $\Delta$ noch mehr verringern. Aus der Formel

$$\Gamma(\mu)\,\Gamma(\mu+\tfrac{1}{2}) = \Gamma(2\mu)\,2^{1-2\mu}\sqrt{\pi}$$

ergiebt sich nämlich, wenn man die Logarithmen nimmt und $\mu = \frac{k}{n}$ setzt

$$\Delta\left(\frac{k}{n}\right) + \Delta\left(\frac{1}{2}+\frac{k}{n}\right) = \Delta\left(\frac{2k}{n}\right) + \left(1-\frac{2k}{n}\right) log\,2 + \tfrac{1}{2} log\,\pi\,.$$

Andererseits ergiebt sich aber aus der Gleichung

$$\Delta(\mu) + \Delta(1-\mu) = log\,\pi - log\,sin\,\mu\pi$$

für $\mu = \frac{1}{2}+\frac{k}{n}$,

$$\Delta\left(\frac{1}{2}+\frac{k}{n}\right) + \Delta\left(\frac{1}{2}-\frac{k}{n}\right) = log\,\pi - log\,cos\frac{k}{n}\pi$$

und wenn man diese Gleichung von der vorhin aufgestellten subtrahirt, so findet man

$$\left.\begin{aligned}\Delta\left(\frac{k}{n}\right) - \Delta\left(\frac{n-2k}{2n}\right) = \Delta\left(\frac{2k}{n}\right) + \left(1-\frac{2k}{n}\right) log\,2 \\ - \tfrac{1}{2} log\,\pi + log\,cos\frac{k}{n}\pi\end{aligned}\right\} \quad (5)$$

d. h. eine Relation zwischen drei Funktionen $\Delta$, deren Argumente $< \frac{1}{2}$ sind, sobald $2k < n$ genommen wird. Ebenso leicht würde sich eine Beziehung zwischen 4 verschiedenen $\Delta$, deren Argumente $< \frac{1}{2}$ sind, aufstellen lassen; man brauchte sich zu diesem Zwecke nur an die Formel

$$\Gamma(\mu)\,\Gamma(\mu+\tfrac{1}{3})\,\Gamma(\mu+\tfrac{2}{3}) = \Gamma(3\mu)\,3^{\frac{1}{2}-3\mu}\,2\pi \qquad (6)$$

zu wenden, darin $\mu = \frac{k}{n}$ zu setzen, die Logarithmen zu nehmen und diejenigen $\Delta$, deren Argumente $> \frac{1}{2}$ ausfallen sollten $\left[\text{z. B. } \Delta\left(\frac{2}{3}+\frac{k}{n}\right)\right]$

Digitized by Google

dadurch heraus zu schaffen, dass man die schon vorhin benutzte Relation zwischen $\Delta(\mu)$ und $\Delta(1-\mu)$ für sie in Anwendung brächte. Wie man auf diese Weise, vom Légendre'schen Theoreme geleitet, weiter gehen kann, ist unmittelbar einleuchtend, und man wird sich nach dieser Methode immer soviel Reduktionsformeln verschaffen, als man braucht, um die Berechnung von $\Delta\left(\frac{1}{n}\right)$, $\Delta\left(\frac{2}{n}\right)$ etc. auf die möglichst kleinste Anzahl solcher $\Delta$ zurückzuführen. Wir wollen diess an dem Beispiele $n=12$ zeigen. Hier kommt es zunächst blos darauf an die Funktionen

$$\Delta(\tfrac{1}{12}),\ \Delta(\tfrac{2}{12}),\ \Delta(\tfrac{3}{12}),\ \Delta(\tfrac{4}{12}),\ \Delta(\tfrac{5}{12}) \qquad (7)$$

zu finden, denn weiterhin ist

$$\Delta(\tfrac{6}{12}) = \Delta(\tfrac{1}{2}) = \tfrac{1}{2}\log\pi$$

und nach Formel (2) für $k=5, 4, 3, 2, 1$:

$$\begin{aligned}
\Delta(\tfrac{7}{12}) &= \log\pi - \log\sin\tfrac{5}{12}\pi - \Delta(\tfrac{5}{12})\\
\Delta(\tfrac{8}{12}) &= \log\pi - \log\sin\tfrac{4}{12}\pi - \Delta(\tfrac{4}{12})\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\\
\Delta(\tfrac{11}{12}) &= \log\pi - \log\sin\tfrac{1}{12}\pi - \Delta(\tfrac{1}{12}).
\end{aligned}$$

Um nun zwischen den unter Nr. (7) aufgeführten Funktionen Beziehungen zu haben, benutzen wir zuerst die Formel (5) für $n=12$, $k=1$ und $k=2$; diess giebt

$$\begin{aligned}
\Delta(\tfrac{1}{12}) - \Delta(\tfrac{5}{12}) &= \Delta(\tfrac{2}{12}) + \tfrac{5}{6}\log 2\\
&\quad - \tfrac{1}{2}\log\pi + \log\cos\tfrac{1}{12}\pi\\
\Delta(\tfrac{3}{12}) - \Delta(\tfrac{4}{12}) &= \Delta(\tfrac{4}{12}) + \tfrac{2}{3}\log 2\\
&\quad - \tfrac{1}{2}\log\pi + \log\cos\tfrac{2}{12}\pi.
\end{aligned}$$

Sieht man einstweilen $\Delta(\frac{4}{12}) = \Delta(\frac{1}{3})$ als bekannt an, so erhalten wir aus der letzten Gleichung

$$\Delta(\tfrac{3}{12}) = 2\Delta(\tfrac{1}{3}) - \tfrac{1}{2}\log\pi - \tfrac{1}{3}\log 2 + \tfrac{1}{2}\log 3 \qquad (8)$$

wobei für $\log\cos\frac{2}{12}\pi = \log\cos 30°$ sein Werth gesetzt worden ist. Substituiren wir den jetzt bestimmten Werth von $\Delta(\frac{3}{12})$ in die Relation zwischen $\Delta(\frac{1}{12})$ und $\Delta(\frac{5}{12})$ unter der Bemerkung, dass

$$2\cos\tfrac{1}{12}\pi\sin\tfrac{1}{12}\pi = \sin\tfrac{2}{12}\pi = \tfrac{1}{2}$$

Digitized by Google

folglich

$$log\cos\tfrac{1}{12}\pi = -2\log 2 - \log\sin\tfrac{1}{12}\pi$$

ist, so erhalten wir jetzt

$$\left.\begin{aligned} \Delta(\tfrac{1}{12}) - \Delta(\tfrac{5}{12}) = 2\Delta(\tfrac{1}{3}) - \tfrac{1}{2}\log\pi \\ - \tfrac{3}{2}\log 2 + \tfrac{1}{2}\log 3 - \log\sin\frac{\pi}{12}. \end{aligned}\right\} \quad (9)$$

Um eine zweite Relation zwischen $\Delta(\frac{1}{12})$ und $\Delta(\frac{5}{12})$ zu bekommen, setzen wir in der Formel (6) $\mu = \frac{1}{12}$ und nehmen beiderseits die Logarithmen; diess giebt

$$\Delta(\tfrac{1}{12}) + \Delta(\tfrac{5}{12}) + \Delta(\tfrac{9}{12}) = \Delta(\tfrac{3}{12}) + \tfrac{1}{4}\log 3 + \log 2 + \log\pi.$$

Es ist aber $\Delta(\frac{9}{12}) = \Delta(\frac{3}{4}) = \log\pi - \log\sin\frac{1}{4}\pi - \Delta(\frac{1}{4}) = \log\pi + \frac{1}{2}\log 2 - \Delta(\frac{1}{4})$ und jetzt wird

$$\Delta(\tfrac{1}{12}) + \Delta(\tfrac{5}{12}) = 2\Delta(\tfrac{1}{4}) + \tfrac{1}{2}\log 2 + \tfrac{1}{4}\log 3.$$

Aus dieser Gleichung und der in (9) verzeichneten lassen sich nun auch $\Delta(\frac{1}{12})$ und $\Delta(\frac{5}{12})$ bestimmen, vorausgesetzt, dass man $\Delta(\frac{1}{3})$ und $\Delta(\frac{1}{4})$ als schon bekannt ansieht. Das Endresultat ist dann folgendes:

$$\begin{aligned}
\Delta(\tfrac{1}{12}) &= \Delta(\tfrac{1}{4}) + \Delta(\tfrac{1}{3}) - \tfrac{1}{2}\log\pi \\
&\quad - \tfrac{1}{2}\log 2 + \tfrac{3}{8}\log 3 - \tfrac{1}{2}\log\sin\frac{\pi}{12} \\
\Delta(\tfrac{2}{12}) &= 2\Delta(\tfrac{1}{3}) - \tfrac{1}{2}\log\pi - \tfrac{1}{3}\log 2 + \tfrac{1}{2}\log 3 \\
\Delta(\tfrac{3}{12}) &= \Delta(\tfrac{1}{4}) \\
\Delta(\tfrac{4}{12}) &= \Delta(\tfrac{1}{3}) \\
\Delta(\tfrac{5}{12}) &= \Delta(\tfrac{1}{4}) - \Delta(\tfrac{1}{3}) + \tfrac{1}{2}\log\pi \\
&\quad + \log 2 - \tfrac{1}{6}\log 3 + \tfrac{1}{2}\log\sin\frac{\pi}{12} \\
\Delta(\tfrac{6}{12}) &= \tfrac{1}{2}\log\pi \\
\Delta(\tfrac{7}{12}) &= \Delta(\tfrac{1}{3}) - \Delta(\tfrac{1}{4}) + \tfrac{1}{2}\log\pi \\
&\quad + \log 2 + \tfrac{1}{6}\log 3 + \tfrac{1}{2}\log\sin\frac{\pi}{12} \\
\Delta(\tfrac{8}{12}) &= -\Delta(\tfrac{1}{3}) + \log\pi + \log 2 - \tfrac{1}{2}\log 3 \\
\Delta(\tfrac{9}{12}) &= -\Delta(\tfrac{1}{4}) + \log\pi + \tfrac{1}{2}\log 2 \\
\Delta(\tfrac{10}{12}) &= -2\Delta(\tfrac{1}{3}) + \tfrac{3}{2}\log\pi + \tfrac{1}{3}\log 2 - \tfrac{1}{2}\log 3 \\
\Delta(\tfrac{11}{12}) &= -\Delta(\tfrac{1}{4}) - \Delta(\tfrac{1}{3}) + \tfrac{3}{2}\log\pi \\
&\quad + \tfrac{1}{2}\log 2 - \tfrac{3}{8}\log 3 - \tfrac{1}{2}\log\sin\frac{\pi}{12}.
\end{aligned}$$



Digitized by Google

Sowie es nun in diesem Beispiele noch auf die Berechnung von $\Delta(\frac{1}{3})$ und $\Delta(\frac{1}{4})$ ankommt, ebenso wird in jedem Falle unter den Funktionen $\Delta(\frac{1}{n})$, $\Delta(\frac{2}{n})$, $\Delta(\frac{3}{n})$, ... eine Anzahl übrig bleiben, welche direkt aufgesucht werden müssen. Hierzu dient nun folgender Kunstgriff. Es war

$$\left.\begin{array}{c} l\Gamma(1+\mu) = \frac{1}{2}l\left(\frac{\mu\pi}{\sin\mu\pi}\right) - C\mu - \frac{1}{3}S_3\mu^3 - \frac{1}{5}S_5\mu^5 - \ldots. \\ 1>\mu>0 \end{array}\right\} \quad (10)$$

wobei $C = 0.5772156\ldots$ und $S_n = \frac{1}{1^n} + \frac{1}{2^n} + \ldots.$ war. Hieraus geht hervor, dass die Grössen $S$ sich fortwährend der Einheit nähern und folglich die Reihe in ihren entfernten Gliedern etwas weniger als die folgende

$$\mu + \tfrac{1}{3}\mu^3 + \tfrac{1}{5}\mu^5 + \ldots.$$

convergiren wird. Dieser für die praktische Berechnung nicht sehr vortheilhafte Umstand lässt sich leicht dadurch beseitigen, dass man zu der Gleichung (10) die nachstehende

$$0 = -\tfrac{1}{2}l\left(\frac{1+\mu}{1-\mu}\right) + \mu + \tfrac{1}{3}\mu^3 + \tfrac{1}{5}\mu^5 + \ldots.$$

addirt, wodurch man

$$l\Gamma(1+\mu) = \tfrac{1}{2}l\left(\frac{\mu\pi}{\sin\mu\pi}\right) - \tfrac{1}{2}l\left(\frac{1+\mu}{1-\mu}\right) + (1-C)\mu - \tfrac{1}{3}(S_3-1)\mu^3 - \tfrac{1}{5}(S_5-1)\mu^5 - \ldots.$$

und auf der rechten Seite eine ungleich stärkere convergirende Reihe erhält. Multiplizirt man noch, um die natürlichen Logarithmen in Briggische zu verwandeln, mit dem Modulus $M = 0.43429448190\ldots$ und setzt zur Abkürzung

$$M(1-C) = T_1, \quad \frac{1}{n}(S_n - 1) = T_n \quad (n>1)$$

so ergiebt sich die sehr brauchbare Formel:

Digitized by Google

$$\left.\begin{aligned} log\,\Gamma(1+\mu) &= \tfrac{1}{2}log\left(\frac{\mu\pi}{sin\,\mu\pi}\right) - \tfrac{1}{2}log\left(\frac{1+\mu}{1-\mu}\right) \\ &\quad + T_1\mu - T_3\mu^3 - T_5\mu^5 - \ldots\ldots \end{aligned}\right\} \quad (11)$$

mittelst deren sich leicht $log\,\Gamma(1+\mu) = \mathcal{A}(1+\mu)$ und ebenso $\mathcal{A}(\mu) = \mathcal{A}(1+\mu) - log\,\mu$ bestimmen lässt. Zur möglichsten Erleichterung dieser Rechnung dient die nachstehende Tabelle der Werthe von $T$, welche eine für das praktische Bedürfniss mehr als hinreichende Ausdehnung besitzt.

| $n$ | $T_n$ | $log\,T_n$ |
|---|---|---|
| 1 | 0.18361 29037 6840 | 9.26390 31988 6135 |
| 3 | 0.02925 07326 917 | 8.46613 67490 379 |
| 5 | 0.00320 75040 58 | 7.50616 72144 |
| 7 | 0.00051 80064 42 | 6.71433 51608 |
| 9 | 0.00009 69148 80 | 5.98639 04633 |
| 11 | 0.00001 95112 17 | 5.29028 43534 |
| 13 | 0.00000 40995 17 | 4.61273 27627 |
| 15 | 0.00000 08856 20 | 3.94724 74888 |

Berechnet man mit diesen Hülfsmitteln z. B. $\mathcal{A}(\frac{1}{3})$ und $\mathcal{A}(\frac{1}{4})$, so lässt sich nach den früher entwickelten Relationen zwischen $\mathcal{A}(\frac{1}{12})$, $\mathcal{A}(\frac{2}{12})$ etc. folgende Tafel aufstellen:

| $\mu$ | $log\,\Gamma(\mu)$ | $log\,\Gamma(1+\mu)$ |
|---|---|---|
| $\frac{1}{12}$ | 1.06067 62454 1387 | 9.98149 49993 6625 |
| $\frac{2}{12}$ | 0.74556 78577 5330 | 9.96741 66073 6966 |
| $\frac{3}{12}$ | 0.55938 10750 4347 | 9.95732 10837 1551 |
| $\frac{4}{12}$ | 0.42796 27493 1426 | 9.95084 14945 9460 |
| $\frac{5}{12}$ | 0.32788 12161 8498 | 9.94766 99744 7338 |
| $\frac{6}{12}$ | 0.24857 49363 4707 | 9.94754 49406 8309 |
| $\frac{7}{12}$ | 0.18432 48784 0648 | 9.95024 16723 7311 |
| $\frac{8}{12}$ | 0.13165 64916 8402 | 9.95556 52326 2834 |
| $\frac{9}{12}$ | 0.08828 37954 8265 | 9.96334 50588 7435 |
| $\frac{10}{12}$ | 0.05261 20106 0482 | 9.97343 07645 5719 |
| $\frac{11}{12}$ | 0.02347 73967 1089 | 9.98568 88358 2149 |

Digitized by Google

Dieser Tafel ganz ähnlich ist die grössere von Légendre für $n = 1000$ berechnete, aus welcher sich unmittelbar die Werthe von $log\,\Gamma(1+\frac{1}{1000})$, $log\,\Gamma(1+\frac{2}{1000})$ u. s. w. entnehmen lassen. Ueber die Einrichtung und den Gebrauch dieses für die praktischen Anwendungen völlig ausreichenden Canons mögen hier die nöthigen Andeutungen und diesen die fragliche Zahlenreihe selbst folgen.

Bezeichnen wir wie bisher $log\,\Gamma$ mit $\mathcal{A}$ und die Differenz 0.001 mit $\omega$, so giebt die Colonne mit der Ueberschrift $log\,\Gamma(a)$ unmittelbar die Werthe von $\mathcal{A}(a)$ für das Intervall $a = 1$ bis $a = 2$ von Tausendtheil zu Tausendtheil; dahinter stehen die drei ersten Differenzenreihen von $\mathcal{A}(a)$, so dass also in einer Horizontallinie die Grössen

$$a,\ \mathcal{A}(a),\ \Delta\mathcal{A}(a),\ \Delta^2\mathcal{A}(a),\ \Delta^3\mathcal{A}(a)$$

nebeneinander liegen. Dabei ist

$$\begin{aligned}
\Delta\mathcal{A}(a) &= \mathcal{A}(a+\omega) - \mathcal{A}(a)\\
\Delta^2\mathcal{A}(a) &= \Delta\mathcal{A}(a+\omega) - \Delta\mathcal{A}(a)\\
&= \mathcal{A}(a+2\omega) - 2\mathcal{A}(a+\omega) + \mathcal{A}(a)\\
\Delta^3\mathcal{A}(a) &= \Delta^2\mathcal{A}(a+\omega) - \Delta^2\mathcal{A}(a)\\
&= \mathcal{A}(a+3\omega) - 3\mathcal{A}(a+2\omega) + 3\mathcal{A}(a+\omega) - \mathcal{A}(a)
\end{aligned}$$

indem $\omega$ die constante Differenz des Argumentes $a$ bezeichnet. Die Differenzen $\Delta\mathcal{A}(a)$, $\Delta^2\mathcal{A}(a)$, $\Delta^3\mathcal{A}(a)$ bieten ein leichtes Mittel zur Controlle der Tafel selbst dar, indem sich durch ihre Prüfung etwaige Fehler derselben leicht entdecken lassen und es ist daher beim Gebrauche der Tafel immer anzurathen, jede angegebene Differenz durch wirkliche Subtraktion vorerst zu verifiziren. In Bezug auf die Vorzeichen der 3 Differenzen muss man sich merken, dass $\Delta\mathcal{A}(a)$ negativ ist von $a = 1.000$ bis $a = 1.461$ und positiv von $a = 1.462$ bis $a = 2.000$, ferner $\Delta^2\mathcal{A}(a)$ positiv und $\Delta^3\mathcal{A}(a)$ negativ während des ganzen Intervalles $a = 1$ bis $a = 2$. Nach diesen allgemeinen Bemerkungen gehen wir nun zur Lösung der verschiedenen Aufgaben über, welche der Gebrauch der Tafel von selbst mit sich bringt.

**1.** Will man zu einer Zahl, welche selbst nicht unter der Rubrik $a$ steht, aber zwischen zwei daselbst vorkommenden Zahlen liegt, das zugehörige $\mathcal{A}(a)$ finden, so ergiebt sich die Regel für eine solche Interpolation aus einem sehr bekannten Theoreme, welches man

Digitized by Google

den Taylor'schen Satz für Differenzen genannt hat; nach demselben ist nämlich wenn $\omega$ das Inkrement von $a$ bezeichnet

$$q(a+h) = q(a) + \frac{h}{1}\frac{\Delta q(a)}{\omega} + \frac{h(h-\omega)}{1.2}\frac{\Delta^2 q(a)}{\omega^2} + \ldots$$
$$\ldots + \frac{h(h-\omega)(h-2\omega)\ldots(h-\overline{n-1}\,\omega)}{1.2\ldots n}\frac{\Delta^n q(a)}{\omega^n}$$
$$+ \frac{h(h-\omega)(h-2\omega)\ldots(h-n\omega)}{1.2.3\ldots n}\frac{\Delta^n {}^1F(a)}{\omega^n}.$$

Setzen wir hier $h = p\omega$, wo $\omega$ die vorhin angegebene Bedeutung hat und $q(x) = \Delta(x)$, so wird

$$\Delta(a+p\omega) = \Delta(a) + \frac{p}{1}\Delta\Delta(a) + \frac{p(p-1)}{1.2}\Delta^2\Delta(a) + \ldots.$$
$$\ldots + \frac{p(p-1)\ldots(p-n+1)}{1.2\ldots n}\Delta^n\Delta(a)$$
$$+ \omega\frac{p(p-1)\ldots.(p-n)}{1.2\ldots n}\Delta^n {}^1F(a).$$

Ist nun $a$ eines von den in der Tafel vorkommenden Argumenten, so kennt man $\Delta(a)$ und $\Delta(a+\omega)$, und wenn man dazwischen $\Delta(a+p\omega)$ einschalten will, so muss $1 > p > 0$ sein. Berücksichtigen wir noch, dass bereits $\Delta^3\Delta(a)$ innerhalb unserer Tafel $< \frac{1}{10^9}$, so erhellt leicht, dass die Glieder der obigen Reihe, welche $\Delta^4\Delta(a)$, $\Delta^5\Delta(a)$ etc. enthalten, keinen Einfluss auf die $12^{te}$ Dezimalstelle ausüben würden und dass wir folglich für unseren Fall

$$\Delta(a+p\omega) = \Delta(a) + \frac{p}{1}\Delta\Delta(a) + \frac{p(p-1)}{1.2}\Delta^2\Delta(a)$$
$$+ \frac{p(p-1)(p-2)}{1.2.3}\Delta^3\Delta(a)$$

setzen dürfen. Bezeichnen wir zur Abkürzung wie folgt

$$\Delta(a) = log\,\Gamma(a) = A$$
$$\Delta(a+p\omega) = log\,\Gamma(a+p\omega) = B$$

Digitized by Google

so können wir die obige Gleichung in der Form

$$B = A + p\left\{\Delta A + \frac{p-1}{2}\left(\Delta^2 A + \frac{p-2}{3}\Delta^3 A\right)\right\} \qquad (12)$$

darstellen und hieraus ergiebt sich sogleich folgende Regel: „Um zu einer Zahl $b$ zwischen 1 und 2 die zugehörige Funktion $log\,\Gamma(b) = B$ zu finden, suche man zuerst die in der Tafel vorkommende nächst kleinere Zahl $a$ und die zugehörigen Zahlen $A$, $\Delta A$, $\Delta^2 A$, $\Delta^3 A$. Man bestimme darauf die Zahl $p$ mittelst der Formel

$$p = \frac{b-a}{\omega} = \frac{b-a}{1000}$$

und bilde daraus (natürlich mit gehöriger Rücksicht auf die Vorzeichen) den Ausdruck $\Delta^2 A - \frac{1}{2}(2-p)\Delta^3 A$, welcher die zweite corrigirte Differenz von $A$ etwa $\Theta^2 A$ heissen möge, berechne ferner die Grösse $\Delta A - \frac{1}{2}(1-p)\Theta^2 A$: die erste corrigirte Differenz von $A$, in Zeichen: $\Theta A$, so ist dann $B = A + p\Theta A$." Z. B. für $b = 1\frac{1}{12} = 1.083333\ldots$. wird $a = 1.083$, und

| $A$ | $\Delta A$ | $\Delta^2 A$ | $\Delta^3 A$ |
|---|---|---|---|
| 9.981 559 875 655 | — 194 416 822 | 635 664 | — 838 |

wobei in den Differenzen die vorhergehenden 0.000 ... weggelassen worden sind. Ferner wird $p = \frac{1}{3}$ und daraus ergiebt sich der Reihe nach

$$\begin{aligned} \Theta^2 A &= \Delta^2 A - \tfrac{5}{9}\Delta^3 A = && 636{\cdot}130, \\ \Theta A &= \Delta A - \tfrac{1}{3}\Theta^2 A = && -\ 194\ 628\ 865, \\ B &= A + \tfrac{1}{3}\Theta A = && 9.981\ 494\ 999\ 367, \end{aligned}$$

und diess stimmt in der That mit dem früher gefundenen Werthe von $log\,\Gamma(1\frac{1}{12})$ überein. Hiernach hat es also nicht die mindeste Schwierigkeit für jedes zwischen 1 und 2 liegende $b$ das zugehörige $log\,\Gamma(b) = B$, und zufolge der früheren Bemerkung überhaupt zu jedem $b$ das entsprechende $B$ auf 12 Dezimalstellen anzugeben.

2. Will man umgekehrt zu einer Funktion $B$, welche selbst nicht in der Tafel steht, aber zwischen zwei daselbst vorkommenden Funktionen enthalten ist, das zugehörige Argument $b$ suchen, so schlage

Digitized by Google

man zuerst die nächst kleinere Funktion $A$ auf und lese ihr Argument $a$ ab. Um hierauf $b = a + p\omega$ zu bestimmen, muss man in der Gleichung

$$B - A = p\left\{\Delta A - \frac{1-p}{2}\left(\Delta^2 A - \frac{2-p}{3}\Delta^3 A\right)\right\}$$

$p$ als Unbekannte ansehen und die Gleichung selbst nach $p$ auflösen. Diess kann auf folgende Weise geschehen. Man vernachlässige das wegen des ächtgebrochenen $p$ sehr kleine Glied

$$\frac{p(1-p)(2-p)}{1.2.3}\Delta^3 A$$

und schreibe also

$$D = p\left\{\Delta A - \frac{1-p}{2}\Delta^2 A\right\} \tag{13}$$

wobei $D$ zur Abkürzung für $B - A$ dient. Es ist dann

$$p = \frac{D}{\Delta A - \frac{1}{2}(1-p)\Delta^2 A} \tag{14}$$

woraus man mit Vernachlässigung des negativen Gliedes im Nenner einen ersten Näherungswerth für $p$ nämlich $D : \Delta A$ findet, der in die Formel selbst substituirt wieder einen zweiten giebt. Formirt man mit Hülfe dieses letzteren, der $p'$ heissen möge, eine Zahl $D'$ nach der Formel

$$D' = p'\left\{\Delta A - \frac{1-p'}{2}\Delta^2 A\right\} \tag{15}$$

so erhält man durch Subtraktion von (13)

$$D - D' = (p-p')\Delta A - \tfrac{1}{2}(p-p')\Delta^2 A + \tfrac{1}{2}(p+p')(p-p')\Delta^2 A$$

oder wenn man $p'$ für $\frac{1}{2}(p+p')$ setzt

$$p - p' = \frac{D - D'}{\Delta A + (p' - \frac{1}{2})\Delta^2 A} \tag{16}$$

woraus sich dann der genauere Werth von $p$ findet. Sei z. B. $B = 9.950\,241\,672\,373$, so ist die zunächst kommende Funktion nebst ihren Differenzen:

Digitized by Google

| $A$ | $\Delta A$ | $\Delta^2 A$ |
|---|---|---|
| 9.950 225 531 586 | 48 548 340 | 377 764 |

und ihr entspricht das Argument $a = 1.583$. Ferner ist $D = B - A = 16\,140\,787$ und hieraus findet man als Näherungswerth $p' = 0.333$. Nach Formel (15) wird ferner

$$\begin{aligned} D' &= 16\ 124\ 625 \\ D - D' &= 16\ 162 \\ \Delta A + (p' - \tfrac{1}{2})\Delta^2 A &= 48\ 485\ 264 \end{aligned}$$

$$p - p' = \frac{16\ 162}{48\ 485\ 264} = 0.000\ 333\ 34$$

folglich vermöge des Werthes von $p'$

$$p = 0.333\ 333\ 34.$$

Da endlich $b = a + p\omega = a + \frac{\omega}{1000}$ ist, so ergiebt sich für das gesuchte Argument $b$ der Werth $1.583\,333\,333\,34 = 1\frac{1}{12}$, was mit der früheren Angabe von $log\ \Gamma(1\frac{1}{12})$ übereinstimmt. Uebrigens giebt es noch einen zweiten Werth von $b$, welcher der Gleichung $log\ \Gamma(b) = 9.950\ \ldots$ genügt, und dieser liegt zwischen 1.344 und 1.345. Für $a = 1.344$ ist nämlich

| $A$ | $\Delta A$ | $\Delta^2 A$ |
|---|---|---|
| 9.950 256 821 818 | − 52 058 495 | 470 189 |

und als Näherungswerth für $p$ findet sich $p' = 0.290$. Ferner hat man

$$\begin{aligned} D &= -\ 15\ 149\ 445 \\ D' &= -\ 15\ 145\ 397 \\ D - D' &= -\ 4\ 048 \\ \Delta A + (p' - \tfrac{1}{2})\Delta^2 A &= -\ 52\ 157\ 235 \end{aligned}$$

$$p - p' = \frac{4048}{52\ 157\ 235} = 0.000\ 077\ 61$$

und folglich

$$b = a + \frac{p}{1000} = 1.344\ 290\ 077\ 61.$$

Ganz ähnlich ist das Verfahren in dem Falle, wo die gegebene Funktion $B$ nicht in den Tafeln steht. Hier muss man durch Versuche

Digitized by Google

das nächstliegende $A$ mit seinem zugehörigen Argumente $a$ ausmitteln und die Differenzen $\Delta A$, $\Delta^2 A$ selbst berechnen; von dieser Stelle an bleibt sich aber die Rechnung gleich. Verlangt man z. B. dasjenige $b$, für welches $\Gamma(b) = \pi$, also $log\,\Gamma(b) = 0.497\,149\,872\,694$ ist, so findet man durch einige Versuche, dass $b$ zwischen 3.448 und 3.449 liegt; denn man erhält mit Hülfe der Formel $log\,\Gamma(\mu+2) = log\,\mu + log(\mu+1) + log\,\Gamma(\mu+1)$ für $\mu = 0.448$

$$\Gamma(3.448) = 0.496\,858\,362\,178$$

ferner für $\mu = 0.449$, $\mu = 0.450$

$$\Gamma(3.449) = 0.497\,330\,005\,160$$
$$log\,\Gamma(3.450) = 0.497\,801\,794\,051$$

und hieraus ergeben sich die Differenzen

$$\Delta A = 0.000\,471\,642\,982$$
$$\Delta^2 A = \quad 145\,909$$

als Näherungswerth für $p$ findet man $p' = 0.6181$,

$$D = 291\,510\,516$$
$$D' = 291\,505\,306$$
$$D - D' = \quad 5\,210$$
$$\Delta A + (p' - \tfrac{1}{2})\Delta^2 A = 471\,625\,750$$
$$p - p' + \frac{5210}{471\,625\,750} = 0.000\,011\,047$$

woraus $p = 0.618\,111\,047$ und $b = 3.448\,618\,111\,047$ folgt.

Die zweite Wurzel der Gleichung $\Gamma(b) = \pi$ ist $b = 0.286\,3641$, wie man auf demselben Wege findet.

Die Tabelle für $log\,\Gamma(a) = A(a)$ kann übrigens auch zur Entwickelung der Werthe von $\frac{dA(a)}{da}$, $\frac{d^2A(a)}{da^2}$, ... benutzt werden und diess ist in so fern wichtig, als diese Transscendenten nicht selten vorkommen. Differenziren wir nämlich die Gleichung

$$A(a + p\omega) = A(a) + \frac{p}{1}\Delta A(a) + \frac{p(p-1)}{1.2}\Delta^2 A(a) + \frac{p(p-1)(p-2)}{1.2.3}\Delta^3 A(a)$$



Digitized by Google

oder für $a + p\omega = b$, $A(a) = A$, $A(a + p\omega) = B$,

$$B = A + p\Delta A + \tfrac{1}{2}(p^2 - p)\Delta^2 A + \tfrac{1}{6}(p^3 - 3p^2 + 2p)\Delta^3 A$$

in Bezug auf $p$ und bemerken dabei, dass vermöge der Gleichung $a + p\omega = b$, $\omega\, dp = db$, folglich

$$\frac{dB}{dp} = \frac{dB}{db} \cdot \frac{db}{dp} = \frac{dB}{db} \cdot \omega$$

ist, so ergeben sich ohne Mühe die Gleichungen

$$\left.\begin{aligned} \omega \frac{dB}{db} &= \Delta A + (p - \tfrac{1}{2})\Delta^2 A + (\tfrac{1}{2}p^2 - p + \tfrac{1}{3})\Delta^3 A \\ \omega^2 \frac{d^2 B}{db^2} &= \Delta^2 A + (p - 1)\Delta^3 A \\ \omega^3 \frac{d^3 B}{db^3} &= \Delta^3 A . \end{aligned}\right\} \quad (17)$$

Diese Formeln dienen zur unmittelbaren Bestimmung von

$$\frac{d \log \Gamma(b)}{db}, \quad \frac{d^2 \log \Gamma(b)}{db^2}, \quad \frac{d^3 \log \Gamma(b)}{db^3}$$

vorausgesetzt, dass $b$ zwischen 1 und 2 liegt, und wie immer $\omega = 0.001$ ist. Man nimmt dann aus den Tafeln das nächst kleinere Argument $a$ und die zugehörigen $\Delta A$, $\Delta^2 A$, $\Delta^3 A$, bestimmt darauf $p$ mittelst der Formel $\frac{b - a}{\omega} = p$ und kann jetzt die obigen Formeln anwenden. Wäre noch $p = 0$, also $B = A$, $b = a$, d. h. steht das Argument unmittelbar in den Tafeln, so hat man einfacher

$$\left.\begin{aligned} \omega \frac{dA}{da} &= \Delta A - \tfrac{1}{2}\Delta^2 A + \tfrac{1}{3}\Delta^3 A \\ \omega^2 \frac{d^2 A}{da^2} &= \Delta^2 A - \Delta^3 A \\ \omega^3 \frac{d^3 A}{da^3} &= \Delta^3 A . \end{aligned}\right\} \quad (18)$$

Um endlich zu einer Zahl, welche ausserhalb der Gränzen 1 und 2 liegt, die zugehörigen Differenzialquotienten zu finden, zerlege man

Digitized by Google

sie in eine ganze Zahl $n$ und eine andere Zahl $b$, welche zwischen 1 und 2 enthalten ist. Man hat dann

$$log\,\Gamma(b+n) = log\,b + log(b+1) + \ldots + log(b+n-1) + log\,\Gamma(b)$$

folglich

$$\frac{d\,log\,\Gamma(b+n)}{db} = M\left\{\frac{1}{b} + \frac{1}{b+1} + \ldots + \frac{1}{b+n-1}\right\} + \frac{dB}{db}$$

$$\frac{d^2\,log\,\Gamma(b+n)}{db^2} = -M\left\{\frac{1}{b^2} + \frac{1}{(b+1)^2} + \ldots + \frac{1}{(b+n-1)^2}\right\} + \frac{d^2B}{db^2}$$

$$\frac{d^3\,log\,\Gamma(b+n)}{db^3} = 2M\left\{\frac{1}{b^3} + \frac{1}{(b+1)^3} + \ldots + \frac{1}{(b+n-1)^3}\right\} + \frac{d^3B}{db^3}$$

wobei $M$ den Modulus der Briggischen Logarithmen bezeichnet. Da nun die Grössen auf der rechten Seite sämmtlich bekannt sind, so erhält man hieraus leicht die Werthe der Differenzialquotienten von $log\,\Gamma(b+n)$.

Um diese Regeln durch Beispiele zu erläutern und den Grad der Genauigkeit, welchen die Rechnung bietet, zu erkennen, nehmen wir zuerst $a = 1{,}500$ in der einfachen Formel (18). Es wird dann

$$\Delta A = 16\ 050\ 324, \quad \Delta^2 A = 405\ 620, \quad \Delta^3 A = -\ 359$$

und daraus erhält man

$$\frac{dA}{da} = 0{,}015\ 847\ 394, \quad \frac{d^2A}{da^2} = 0{,}405\ 979$$

$$\frac{d^3A}{da^3} = -\ 0{,}359\,.$$

Das erste dieser Resultate ist leicht zu verifiziren. Setzt man nämlich in der Formel

$$\frac{d\,l\Gamma(1+\mu)}{d\mu} = -\ C + \int_0^1 \frac{1-x^\mu}{1-x}\,dx \qquad (19)$$

$\mu = \frac{1}{2}$, multiplizirt beiderseits mit dem Modulus $M$ und nimmt $x = z^2$, so wird

$$\frac{dA}{da} = -\ MC + 2M\int_0^1 \frac{1-z}{1-z^2}\,z\,dz$$

$$= -\ MC + 2M - 2M\,l2 = M + M(1-C) - log\,4$$

Digitized by Google

und hieraus erhält man vermöge des bekannten Werthes $M(1-C) = T_1$,

$$\frac{dA}{da} = 0.015\ 847\ 394\ 343\ 69$$

was mit dem Obigen auf 9 Dezimalstellen übereinstimmt.

Ebenso leicht ist es, mittelst der Formel (17) für $b = 1.33333\ldots$ die Differenzialquotienten von $log\,\Gamma(1+\frac{1}{3})$ zu berechnen. Hier ist $a = 1.333$ und $p = \frac{1}{3}$

$$\Delta A = -\ 57\ 262\ 267\,,\quad \Delta^2 A = 475\ 486\,,\quad \Delta^3 A = -\ 483$$

und mittelst der Formeln (18) erhält man hieraus

$$\frac{dB}{db} = -\ 0.057\ 341\ 541\ 5$$

$$\frac{d^2B}{db^2} = \quad 0.475\ 808$$

$$\frac{d^3B}{db^3} = -\ 0.483.$$

Das erste Resultat lässt sich hier wieder durch die Formel (19) controlliren, indem man $\mu = \frac{1}{3}$ setzt, woraus man für $M(1-C) = T_1$

$$\frac{dB}{db} = T_1 + 2M - \tfrac{1}{2} log\,27 - \frac{M\pi}{12}$$
$$= -\ 0.057\ 341\ 542\ 008\ 65$$

findet, was wieder sehr gut übereinstimmt. Ueberhaupt giebt die Bestimmung von $\frac{dB}{db}$ immer wenigstens 8 richtige Dezimalstellen, die von $\frac{d^2B}{db^2}$ giebt deren wenigstens 5 und endlich die von $\frac{d^3B}{db^3}$ nur 2 bis 3. Bei der nicht unbedeutenden Genauigkeit, welche die erste dieser Zahlen besitzt, kann man von ihr einen vortheilhaften Gebrauch zur Verwerthung des Integrales

$$S = \int_0^1 \frac{1-x^\mu}{1-x}\,dx$$

machen. Dasselbe lässt sich zwar für jedes rationale $\mu$ auf logarithmische und cyklometrische Funktionen reduziren, aber diese würden

Digitized by Google

oft zu verwickelt ausfallen, als dass sie eine bequeme numerische Rechnung gestatteten. Wäre aber $\mu$ irrational, so müsste man sich doch wieder mit Näherungen behelfen. Kürzer kommt man hier immer mittelst der aus der Gleichung (19) folgenden Formel

$$S = C + \frac{1}{M} \frac{d \log \Gamma(1+\mu)}{d\mu}$$

zum Ziele, wobei $\frac{1}{M} = 2.302585092994$ ist.

Wir wollen von den so eben entwickelten Regeln schliesslich noch eine Anwendung mittheilen, die nicht ohne Interesse sein wird, nämlich die Bestimmung desjenigen Werthes $\mu = b$, für welchen die Funktion $\Gamma(\mu)$ und ebenso $\log \Gamma(\mu)$ innerhalb des Intervalles $\mu = 1$ bis $\mu = 2$ ihr Minimum erreicht. Die Tafel selbst zeigt, dass dieser Werth zwischen 1.461 und 1.462 liegt und dass man demnach für $a = 1.461$, $b = a + \varepsilon$ setzen darf, wo $\varepsilon$ eine noch hinzuzufügende Correktion bezeichnet. Ferner giebt die Tafel

$$\begin{aligned} \Delta \log \Gamma(a) &= - \ 0.000\ 000\ 055\ 554 \\ \Delta^2 \log \Gamma(a) &= + \ 420\ 113 \\ \Delta^3 \log \Gamma(a) &= - \ 383 \end{aligned}$$

und hieraus erhält man mit Hülfe der Formeln (18)

$$\begin{aligned} \frac{d \log \Gamma(a)}{da} &= - \ 0.000\ 265\ 737 \\ \frac{d^2 \log \Gamma(a)}{da^2} &= + \ 0.420\ 496 \\ \frac{d^3 \log \Gamma(a)}{da^3} &= - \ 0.383. \end{aligned}$$

Um nun $\varepsilon$ zu bestimmen, halten wir uns an den Taylor'schen Satz, wonach

$$\log \Gamma(a+\varepsilon) = \log \Gamma(a) + \frac{d \log \Gamma(a)}{da} \frac{\varepsilon}{1} + \frac{d^2 \log \Gamma(a)}{da^2} \frac{\varepsilon^2}{1.2} + \frac{d^3 \log \Gamma(a)}{da^3} \cdot \frac{\varepsilon^3}{1.2.3} + \ldots\ldots \qquad (20)$$

Digitized by Google

ist, wenigstens in der Nachbarschaft von $a$, wegen der Stetigkeit und Endlichkeit von $log\,\Gamma(a)$ und ihren Differenzialquotienten in jener Gegend. Da $\varepsilon < \frac{1}{1000}$ ist, so können wir $\varepsilon^4$, $\varepsilon^5$ etc. weglassen und erhalten jetzt, wenn wir in Bezug auf $\varepsilon$ differenziren, wobei links $d\varepsilon = d(b-a) = db$ zu setzen ist

$$\frac{d\,log\,\Gamma(b)}{db} = \frac{d\,log\,\Gamma(a)}{da} + \frac{d^2\,log\,\Gamma(a)}{da^2}\varepsilon + \frac{1}{2}\frac{d^3\,log\,\Gamma(a)}{da^3}\varepsilon^2.$$

Soll nun $b$ das dem Minimum von $log\,\Gamma(b)$ entsprechende Argument sein, so muss sich die linke Seite annulliren und daraus ergiebt sich

$$0 = -\,0.000\;265\;737 + (0.420\;496)\,\varepsilon - \tfrac{1}{2}(0.383)\,\varepsilon^2.$$

Durch Auflösung dieser quadratischen Gleichung findet man

$$\varepsilon = 0.000\;632\;1$$

und mithin weil $b = a + \varepsilon$ war

$$b = 1.461\;632\;1.$$

Substituiren wir noch den Werth von $\varepsilon$ in die Gleichung (20), so erhalten wir $log\,\Gamma(a+\varepsilon)$, d. h.

$$log\,\Gamma(b) = 9.947\;2392.$$

Innerhalb des Intervalles $\mu = 1$ bis $\mu = 2$ erreicht also die Funktion $\Gamma(\mu)$ für $\mu = 1.461\;6321$ ihr Minimum $\Gamma(\mu) = 0.885\;6032$.

Digitized by Google

# Tafel

der

# Logarithmen der Gammafunktionen

*von* 1.000 *bis* 2.000.

---

Digitized by Google

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | diff I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 0.000 000 000 000 | 250 324 559 | 713 343 | 1039 |
| 1.001 | 9.999 749 675 441 | 249 611 216 | 712 304 | 1038 |
| 1.002 | 9.999 500 064 225 | 248 898 912 | 711 266 | 1034 |
| 1.003 | 9.999 251 165 313 | 248 187 646 | 710 232 | 1031 |
| 1.004 | 9.999 002 977 667 | 247 477 414 | 709 201 | 1030 |
| 1.005 | 9.998 755 500 253 | 246 768 213 | 708 171 | 1024 |
| 1.006 | 9.998 508 732 040 | 246 060 042 | 707 147 | 1025 |
| 1.007 | 9.998 262 671 998 | 245 352 895 | 706 122 | 1020 |
| 1.008 | 9.998 017 319 103 | 244 646 773 | 705 102 | 1018 |
| 1.009 | 9.997 772 672 330 | 243 941 671 | 704 084 | 1014 |
| 1.010 | 9.997 528 730 659 | 243 237 587 | 703 070 | 1014 |
| 1.011 | 9.997 285 493 072 | 242 534 517 | 702 056 | 1008 |
| 1.012 | 9.997 042 958 555 | 241 832 461 | 701 048 | 1008 |
| 1.013 | 9.996 801 126 094 | 241 131 413 | 700 040 | 1004 |
| 1.014 | 9.996 559 994 681 | 240 431 373 | 699 036 | 1002 |
| 1.015 | 9.996 319 563 308 | 239 732 337 | 698 034 | 998 |
| 1.016 | 9.996 079 830 971 | 239 034 303 | 697 036 | 998 |
| 1.017 | 9.995 840 796 668 | 238 337 267 | 696 038 | 992 |
| 1.018 | 9.995 602 459 401 | 237 641 229 | 695 046 | 992 |
| 1.019 | 9.995 364 818 172 | 236 946 183 | 694 054 | 989 |
| 1.020 | 9.995 127 871 989 | 236 252 129 | 693 065 | 985 |
| 1.021 | 9.994 891 619 860 | 235 559 064 | 692 080 | 983 |
| 1.022 | 9.994 656 060 796 | 234 866 984 | 691 097 | 982 |
| 1.023 | 9.994 421 193 812 | 234 175 887 | 690 115 | 977 |
| 1.024 | 9.994 187 017 925 | 233 485 772 | 689 138 | 975 |
| 1.025 | 9.993 953 532 153 | 232 796 634 | 688 163 | 974 |
| 1.026 | 9.993 720 735 519 | 232 108 471 | 687 189 | 971 |
| 1.027 | 9.993 488 627 048 | 231 421 282 | 686 218 | 967 |
| 1.028 | 9.993 257 205 766 | 230 735 064 | 685 251 | 966 |
| 1.029 | 9.993 026 470 702 | 230 049 813 | 684 285 | 962 |
| 1.030 | 9.992 796 420 889 | 229 365 528 | 683 323 | 961 |
| 1.031 | 9.992 567 055 361 | 228 682 205 | 682 362 | 957 |
| 1.032 | 9.992 338 373 156 | 227 999 843 | 681 405 | 956 |
| 1.033 | 9.992 110 373 313 | 227 318 438 | 680 449 | 954 |
| 1.034 | 9.991 883 054 875 | 226 637 989 | 679 495 | 948 |
| 1.035 | 9.991 656 416 886 | 225 958 494 | 678 547 | 950 |
| 1.036 | 9.991 430 458 392 | 225 279 947 | 677 597 | 945 |
| 1.037 | 9.991 205 178 445 | 224 602 350 | 676 652 | 942 |
| 1.038 | 9.990 980 576 095 | 223 925 698 | 675 710 | 942 |
| 1.039 | 9.990 756 650 397 | 223 249 988 | 674 768 | 938 |
| 1.040 | 9.990 533 400 409 | 222 575 220 | 673 830 | 935 |



Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | $diff\ I$ | $II$ | $III$ |
|---|---|---|---|---|
| 1.041 | 9.990 310 825 189 | 221 901 390 | 672 895 | 934 |
| 1.042 | 9.990 088 923 799 | 221 228 495 | 671 961 | 930 |
| 1.043 | 9.989 867 695 304 | 220 556 534 | 671 031 | 929 |
| 1.044 | 9.989 647 138 770 | 219 885 503 | 670 102 | 927 |
| 1.045 | 9.989 427 253 267 | 219 215 401 | 669 175 | 923 |
| 1.046 | 9.989 208 037 866 | 218 546 226 | 668 252 | 922 |
| 1.047 | 9.988 989 491 640 | 217 877 974 | 667 330 | 918 |
| 1.048 | 9.988 771 613 666 | 217 210 644 | 666 412 | 918 |
| 1.049 | 9.988 554 403 022 | 216 544 232 | 665 494 | 914 |
| 1.050 | 9.988 337 858 790 | 215 878 738 | 664 580 | 911 |
| 1.051 | 9.988 121 980 052 | 215 214 158 | 663 669 | 911 |
| 1.052 | 9.987 906 765 894 | 214 550 489 | 662 758 | 908 |
| 1.053 | 9.987 692 215 405 | 213 887 731 | 661 850 | 904 |
| 1.054 | 9.987 478 327 674 | 213 225 881 | 660 946 | 902 |
| 1.055 | 9.987 265 101 793 | 212 564 935 | 660 044 | 902 |
| 1.056 | 9.987 052 536 858 | 211 904 891 | 659 142 | 898 |
| 1.057 | 9.986 840 631 967 | 211 245 749 | 658 244 | 896 |
| 1.058 | 9.986 629 386 218 | 210 587 505 | 657 348 | 893 |
| 1.059 | 9.986 418 798 713 | 209 930 157 | 656 455 | 893 |
| 1.060 | 9.986 208 868 556 | 209 273 702 | 655 562 | 887 |
| 1.061 | 9.985 999 594 854 | 208 618 140 | 654 675 | 888 |
| 1.062 | 9.985 790 976 714 | 207 963 465 | 653 787 | 886 |
| 1.063 | 9.985 583 013 249 | 207 309 678 | 652 901 | 880 |
| 1.064 | 9.985 375 703 571 | 206 656 777 | 652 021 | 882 |
| 1.065 | 9.985 169 046 794 | 206 004 756 | 651 139 | 878 |
| 1.066 | 9.984 963 042 038 | 205 353 617 | 650 261 | 876 |
| 1.067 | 9.984 757 688 421 | 204 703 356 | 649 385 | 873 |
| 1.068 | 9.984 552 985 065 | 204 053 971 | 648 512 | 871 |
| 1.069 | 9.984 348 931 094 | 203 405 459 | 647 641 | 871 |
| 1.070 | 9.984 145 525 635 | 202 757 818 | 646 770 | 866 |
| 1.071 | 9.983 942 767 817 | 202 111 048 | 645 904 | 865 |
| 1.072 | 9.983 740 656 769 | 201 465 144 | 645 039 | 863 |
| 1.073 | 9.983 539 191 625 | 200 820 105 | 644 176 | 861 |
| 1.074 | 9.983 338 371 520 | 200 175 929 | 643 315 | 859 |
| 1.075 | 9.983 138 195 591 | 199 532 614 | 642 456 | 855 |
| 1.076 | 9.982 938 662 977 | 198 890 158 | 641 601 | 855 |
| 1.077 | 9.982 739 772 819 | 198 248 557 | 640 746 | 852 |
| 1.078 | 9.982 541 524 262 | 197 607 811 | 639 894 | 851 |
| 1.079 | 9.982 343 916 451 | 196 967 917 | 639 043 | 846 |
| 1.080 | 9.982 146 948 534 | 196 328 874 | 638 197 | 848 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | $diff\ I$ | $II$ | $III$ |
|---|---|---|---|---|
| 1.081 | 9.981 950 619 660 | 195 690 677 | 637 349 | 843 |
| 1.082 | 9.981 754 928 983 | 195 053 328 | 636 506 | 842 |
| 1.083 | 9.981 559 875 655 | 194 416 822 | 635 664 | 838 |
| 1.084 | 9.981 365 458 833 | 193 781 158 | 634 826 | 839 |
| 1.085 | 9.981 171 677 675 | 193 146 332 | 633 987 | 836 |
| 1.086 | 9.980 978 531 343 | 192 512 345 | 633 151 | 833 |
| 1.087 | 9.980 786 018 998 | 191 879 194 | 632 318 | 830 |
| 1.088 | 9.980 594 139 804 | 191 246 876 | 631 488 | 831 |
| 1.089 | 9.980 402 892 928 | 190 615 388 | 630 657 | 828 |
| 1.090 | 9.980 212 277 540 | 189 984 731 | 629 829 | 824 |
| 1.091 | 9.980 022 292 809 | 189 354 902 | 629 005 | 822 |
| 1.092 | 9.979 832 937 907 | 188 725 897 | 628 183 | 824 |
| 1.093 | 9.979 644 212 010 | 188 097 714 | 627 359 | 819 |
| 1.094 | 9.979 456 114 296 | 187 470 355 | 626 540 | 816 |
| 1.095 | 9.979 268 643 941 | 186 843 815 | 625 724 | 815 |
| 1.096 | 9.979 081 800 126 | 186 218 091 | 624 909 | 814 |
| 1.097 | 9.978 895 582 035 | 185 593 182 | 624 095 | 812 |
| 1.098 | 9.978 709 988 853 | 184 969 087 | 623 283 | 809 |
| 1.099 | 9.978 525 019 766 | 184 345 804 | 622 474 | 807 |
| 1.100 | 9.978 340 673 962 | 183 723 330 | 621 667 | 806 |
| 1.101 | 9.978 156 950 632 | 183 101 663 | 620 861 | 804 |
| 1.102 | 9.977 973 848 969 | 182 480 802 | 620 057 | 801 |
| 1.103 | 9.977 791 368 167 | 181 860 745 | 619 256 | 799 |
| 1.104 | 9.977 609 507 422 | 181 241 489 | 618 457 | 799 |
| 1.105 | 9.977 428 265 933 | 180 623 032 | 617 658 | 795 |
| 1.106 | 9.977 247 642 901 | 180 005 374 | 616 863 | 794 |
| 1.107 | 9.977 067 637 527 | 179 388 511 | 616 069 | 792 |
| 1.108 | 9.976 888 249 016 | 178 772 442 | 615 277 | 791 |
| 1.109 | 9.976 709 476 574 | 178 157 165 | 614 486 | 787 |
| 1.110 | 9.976 531 319 409 | 177 542 679 | 613 699 | 787 |
| 1.111 | 9.976 353 776 730 | 176 928 980 | 612 912 | 784 |
| 1.112 | 9.976 176 847 750 | 176 316 068 | 612 128 | 783 |
| 1.113 | 9.976 000 531 682 | 175 703 940 | 611 345 | 780 |
| 1.114 | 9.975 824 827 742 | 175 092 595 | 610 565 | 779 |
| 1.115 | 9.975 649 735 147 | 174 482 030 | 609 786 | 778 |
| 1.116 | 9.975 475 253 117 | 173 872 244 | 609 008 | 775 |
| 1.117 | 9.975 301 380 873 | 173 263 236 | 608 233 | 772 |
| 1.118 | 9.975 128 117 637 | 172 655 003 | 607 461 | 772 |
| 1.119 | 9.974 955 462 634 | 172 047 542 | 606 689 | 770 |
| 1.120 | 9.974 783 415 092 | 171 440 853 | 605 919 | 768 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | diff I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1.121 | 9.974 611 974 239 | 170 834 934 | 605 151 | 766 |
| 1.122 | 9.974 441 139 305 | 170 229 783 | 604 385 | 763 |
| 1.123 | 9.974 270 909 522 | 169 625 398 | 603 622 | 764 |
| 1.124 | 9.974 101 284 124 | 169 021 776 | 602 858 | 759 |
| 1.125 | 9.973 932 262 348 | 168 418 918 | 602 099 | 759 |
| 1.126 | 9.973 763 843 430 | 167 816 819 | 601 340 | 758 |
| 1.127 | 9.973 596 026 611 | 167 215 479 | 600 582 | 755 |
| 1.128 | 9.973 428 811 132 | 166 614 897 | 599 827 | 753 |
| 1.129 | 9.973 262 196 235 | 166 015 070 | 599 074 | 752 |
| 1.130 | 9.973 096 181 165 | 165 415 996 | 598 322 | 749 |
| 1.131 | 9.972 930 765 169 | 164 817 674 | 597 573 | 749 |
| 1.132 | 9.972 765 947 495 | 164 220 101 | 596 824 | 747 |
| 1.133 | 9.972 601 727 394 | 163 623 277 | 596 077 | 743 |
| 1.134 | 9.972 438 104 117 | 163 027 200 | 595 334 | 744 |
| 1.135 | 9.972 275 076 917 | 162 431 866 | 594 590 | 741 |
| 1.136 | 9.972 112 645 051 | 161 837 276 | 593 849 | 739 |
| 1.137 | 9.971 950 807 775 | 161 243 427 | 593 110 | 738 |
| 1.138 | 9.971 789 564 348 | 160 650 317 | 592 372 | 736 |
| 1.139 | 9.971 628 914 031 | 160 057 945 | 591 636 | 735 |
| 1.140 | 9.971 468 856 086 | 159 466 309 | 590 901 | 732 |
| 1.141 | 9.971 309 389 777 | 158 875 408 | 590 169 | 730 |
| 1.142 | 9.971 150 514 369 | 158 285 239 | 589 439 | 731 |
| 1.143 | 9.970 992 229 130 | 157 695 800 | 588 708 | 726 |
| 1.144 | 9.970 834 533 330 | 157 107 092 | 587 982 | 726 |
| 1.145 | 9.970 677 426 238 | 156 519 110 | 587 256 | 724 |
| 1.146 | 9.970 520 907 128 | 155 931 854 | 586 532 | 724 |
| 1.147 | 9.970 364 975 274 | 155 345 322 | 585 808 | 720 |
| 1.148 | 9.970 209 629 952 | 154 759 514 | 585 088 | 718 |
| 1.149 | 9.970 054 870 438 | 154 174 426 | 584 370 | 718 |
| 1.150 | 9.969 900 696 012 | 153 590 056 | 583 652 | 717 |
| 1.151 | 9.969 747 105 956 | 153 006 404 | 582 935 | 712 |
| 1.152 | 9.969 594 099 552 | 152 423 469 | 582 223 | 715 |
| 1.153 | 9.969 441 676 083 | 151 841 246 | 581 508 | 711 |
| 1.154 | 9.969 289 834 837 | 151 259 738 | 580 797 | 707 |
| 1.155 | 9.969 138 575 099 | 150 678 941 | 580 090 | 708 |
| 1.156 | 9.968 987 896 158 | 150 098 851 | 579 382 | 708 |
| 1.157 | 9.968 837 797 307 | 149 519 469 | 578 674 | 703 |
| 1.158 | 9.968 688 277 838 | 148 940 795 | 577 971 | 703 |
| 1.159 | 9.968 539 337 043 | 148 362 824 | 577 268 | 701 |
| 1.160 | 9.968 390 974 219 | 147 785 556 | 576 567 | 700 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | *diff I* | *II* | *III* |
|---|---|---|---|---|
| 1.161 | 9.968 243 188 663 | 147 208 989 | 575 867 | 698 |
| 1.162 | 9.968 095 979 674 | 146 633 122 | 575 169 | 697 |
| 1.163 | 9.967 949 346 552 | 146 057 953 | 574 472 | 694 |
| 1.164 | 9.967 803 288 599 | 145 483 481 | 573 778 | 693 |
| 1.165 | 9.967 657 805 118 | 144 909 703 | 573 085 | 693 |
| 1.166 | 9.967 512 895 415 | 144 336 618 | 572 392 | 689 |
| 1.167 | 9.967 368 558 797 | 143 764 226 | 571 703 | 689 |
| 1.168 | 9.967 224 794 571 | 143 192 523 | 571 014 | 688 |
| 1.169 | 9.967 081 602 048 | 142 621 509 | 570 326 | 684 |
| 1.170 | 9.966 938 980 539 | 142 051 183 | 569 642 | 684 |
| 1.171 | 9.966 796 929 356 | 141 481 541 | 568 958 | 684 |
| 1.172 | 9.966 655 447 815 | 140 912 583 | 568 274 | 679 |
| 1.173 | 9.966 514 535 232 | 140 344 309 | 567 595 | 680 |
| 1.174 | 9.966 374 190 923 | 139 776 714 | 566 915 | 678 |
| 1.175 | 9.966 234 414 209 | 139 209 799 | 566 237 | 677 |
| 1.176 | 9.966 095 204 410 | 138 643 562 | 565 560 | 673 |
| 1.177 | 9.965 956 560 848 | 138 078 002 | 564 887 | 675 |
| 1.178 | 9.965 818 482 846 | 137 513 115 | 564 212 | 671 |
| 1.179 | 9.965 680 969 731 | 136 948 903 | 563 541 | 671 |
| 1.180 | 9.965 544 020 828 | 136 385 362 | 562 870 | 666 |
| 1.181 | 9.965 407 635 466 | 135 822 492 | 562 204 | 670 |
| 1.182 | 9.965 271 812 974 | 135 260 288 | 561 534 | 665 |
| 1.183 | 9.965 136 552 686 | 134 698 754 | 560 869 | 665 |
| 1.184 | 9.965 001 853 932 | 134 137 885 | 560 204 | 662 |
| 1.185 | 9.964 867 716 047 | 133 577 681 | 559 542 | 661 |
| 1.186 | 9.964 734 138 366 | 133 018 139 | 558 881 | 660 |
| 1.187 | 9.964 601 120 227 | 132 459 258 | 558 221 | 659 |
| 1.188 | 9.964 468 660 969 | 131 901 037 | 557 562 | 657 |
| 1.189 | 9.964 336 759 932 | 131 343 475 | 556 905 | 656 |
| 1.190 | 9.964 205 416 457 | 130 786 570 | 556 249 | 652 |
| 1.191 | 9.964 074 629 887 | 130 230 321 | 555 597 | 654 |
| 1.192 | 9.963 944 399 566 | 129 674 724 | 554 943 | 652 |
| 1.193 | 9.963 814 724 842 | 129 119 781 | 554 291 | 648 |
| 1.194 | 9.963 685 605 061 | 128 565 490 | 553 643 | 649 |
| 1.195 | 9.963 557 039 571 | 128 011 847 | 552 994 | 647 |
| 1.196 | 9.963 429 027 724 | 127 458 853 | 552 317 | 645 |
| 1.197 | 9.963 301 568 871 | 126 906 506 | 551 702 | 645 |
| 1.198 | 9.963 174 662 365 | 126 354 804 | 551 057 | 642 |
| 1.199 | 9.963 048 307 561 | 125 803 747 | 550 415 | 640 |
| 1.200 | 9.962 922 503 814 | 125 253 332 | 549 775 | 642 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | $diff\ I$ | $II$ | $III$ |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | 9.962 797 250 482 | 124 703 557 | 549 133 | 637 |
| 1.202 | 9.962 672 546 925 | 124 154 424 | 548 496 | 637 |
| 1.203 | 9.962 548 392 501 | 123 605 928 | 547 859 | 637 |
| 1.204 | 9.962 424 786 573 | 123 058 069 | 547 222 | 632 |
| 1.205 | 9.962 301 728 504 | 122 510 847 | 546 590 | 635 |
| 1.206 | 9.962 179 217 657 | 121 964 257 | 545 955 | 630 |
| 1.207 | 9.962 057 253 400 | 121 418 302 | 545 325 | 630 |
| 1.208 | 9.961 935 835 098 | 120 872 977 | 544 695 | 630 |
| 1.209 | 9.961 814 962 121 | 120 328 282 | 544 065 | 626 |
| 1.210 | 9.961 694 633 839 | 119 784 217 | 543 439 | 627 |
| 1.211 | 9.961 574 849 622 | 119 240 778 | 542 812 | 625 |
| 1.212 | 9.961 455 608 844 | 118 697 966 | 542 187 | 621 |
| 1.213 | 9.961 336 910 878 | 118 155 779 | 541 566 | 624 |
| 1.214 | 9.961 218 755 099 | 117 614 213 | 540 942 | 620 |
| 1.215 | 9.961 101 140 886 | 117 073 271 | 540 322 | 620 |
| 1.216 | 9.960 984 067 615 | 116 532 949 | 539 702 | 616 |
| 1.217 | 9.960 867 534 666 | 115 993 247 | 539 086 | 618 |
| 1.218 | 9.960 751 541 419 | 115 454 161 | 538 468 | 616 |
| 1.219 | 9.960 636 087 258 | 114 915 693 | 537 852 | 612 |
| 1.220 | 9.960 521 171 565 | 114 377 841 | 537 240 | 613 |
| 1.221 | 9.960 406 793 724 | 113 840 601 | 536 627 | 612 |
| 1.222 | 9.960 292 953 123 | 113 303 974 | 536 015 | 610 |
| 1.223 | 9.960 179 649 149 | 112 767 959 | 535 405 | 609 |
| 1.224 | 9.960 066 881 190 | 112 232 554 | 534 796 | 606 |
| 1.225 | 9.959 954 648 636 | 111 697 758 | 534 190 | 607 |
| 1.226 | 9.959 842 950 878 | 111 163 568 | 533 583 | 605 |
| 1.227 | 9.959 731 787 310 | 110 629 985 | 532 978 | 602 |
| 1.228 | 9.959 621 157 325 | 110 097 007 | 532 376 | 604 |
| 1.229 | 9.959 511 060 318 | 109 564 631 | 531 772 | 600 |
| 1.230 | 9.959 401 495 687 | 109 032 859 | 531 172 | 600 |
| 1.231 | 9.959 292 462 828 | 108 501 687 | 530 572 | 598 |
| 1.232 | 9.959 183 961 141 | 107 971 115 | 529 974 | 597 |
| 1.233 | 9.959 075 990 026 | 107 441 141 | 529 377 | 596 |
| 1.234 | 9.958 968 548 885 | 106 911 764 | 528 781 | 595 |
| 1.235 | 9.958 861 637 121 | 106 382 983 | 528 186 | 592 |
| 1.236 | 9.958 755 254 138 | 105 854 797 | 527 594 | 593 |
| 1.237 | 9.958 649 399 341 | 105 327 203 | 527 001 | 591 |
| 1.238 | 9.958 544 072 138 | 104 800 202 | 526 410 | 589 |
| 1.239 | 9.958 439 271 936 | 104 273 792 | 525 821 | 589 |
| 1.240 | 9.958 334 998 144 | 103 747 971 | 525 232 | 586 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | $diff\ I$ | $II$ | $III$ |
|---|---|---|---|---|
| 1.241 | 9.958 231 250 173 | 103 222 739 | 524 646 | 586 |
| 1.242 | 9.958 128 027 434 | 102 698 093 | 524 060 | 585 |
| 1.243 | 9.958 025 329 341 | 102 174 033 | 523 475 | 583 |
| 1.244 | 9.957 923 155 308 | 101 650 558 | 522 892 | 582 |
| 1.245 | 9.957 821 504 750 | 101 127 666 | 522 310 | 582 |
| 1.246 | 9.957 720 377 084 | 100 605 356 | 521 728 | 577 |
| 1.247 | 9.957 619 771 728 | 100 083 628 | 521 151 | 581 |
| 1.248 | 9.957 519 688 100 | 99 562 477 | 520 570 | 577 |
| 1.249 | 9.957 420 125 623 | 99 041 907 | 519 993 | 576 |
| 1.250 | 9.957 321 083 716 | 98 521 914 | 519 417 | 575 |
| 1.251 | 9.957 222 561 802 | 98 002 497 | 518 842 | 575 |
| 1.252 | 9.957 124 559 305 | 97 483 655 | 518 270 | 572 |
| 1.253 | 9.957 027 075 650 | 96 965 385 | 517 698 | 572 |
| 1.254 | 9.956 930 110 265 | 96 447 687 | 517 126 | 571 |
| 1.255 | 9.956 833 662 578 | 95 930 561 | 516 555 | 570 |
| 1.256 | 9.956 737 732 017 | 95 414 006 | 515 985 | 563 |
| 1.257 | 9.956 642 318 011 | 94 898 021 | 515 420 | 568 |
| 1.258 | 9.956 547 419 990 | 94 382 601 | 514 852 | 566 |
| 1.259 | 9.956 453 037 389 | 93 867 749 | 514 286 | 563 |
| 1.260 | 9.956 359 169 640 | 93 353 463 | 513 723 | 563 |
| 1.261 | 9.956 265 816 177 | 92 839 740 | 513 160 | 561 |
| 1.262 | 9.956 172 976 437 | 92 326 580 | 512 599 | 561 |
| 1.263 | 9.956 080 649 857 | 91 813 981 | 512 038 | 561 |
| 1.264 | 9.955 988 835 876 | 91 301 943 | 511 477 | 557 |
| 1.265 | 9.955 897 533 933 | 90 790 466 | 510 920 | 557 |
| 1.266 | 9.955 806 743 467 | 90 279 546 | 510 363 | 558 |
| 1.267 | 9.955 716 463 921 | 89 769 183 | 509 805 | 553 |
| 1.268 | 9.955 626 694 738 | 89 259 378 | 509 252 | 553 |
| 1.269 | 9.955 537 435 360 | 88 750 126 | 508 699 | 553 |
| 1.270 | 9.955 448 685 234 | 88 241 427 | 508 146 | 554 |
| 1.271 | 9.955 360 443 807 | 87 733 281 | 507 592 | 549 |
| 1.272 | 9.955 272 710 526 | 87 225 689 | 507 043 | 548 |
| 1.273 | 9.955 185 484 837 | 86 718 646 | 506 495 | 548 |
| 1.274 | 9.955 098 766 191 | 86 212 151 | 505 947 | 549 |
| 1.275 | 9.955 012 554 040 | 85 706 204 | 505 398 | 545 |
| 1.276 | 9.954 926 847 836 | 85 200 806 | 504 853 | 545 |
| 1.277 | 9.954 841 647 030 | 84 695 953 | 504 308 | 542 |
| 1.278 | 9.954 756 951 077 | 84 191 645 | 503 766 | 543 |
| 1.279 | 9.954 672 759 432 | 83 687 879 | 503 223 | 543 |
| 1.280 | 9.954 589 071 553 | 83 184 656 | 502 680 | 539 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | *diff I* | *II* | *III* |
|---|---|---|---|---|
| 1.281 | 9.954 505 886 897 | 82 681 976 | 502 141 | 539 |
| 1.282 | 9.954 423 204 921 | 82 179 835 | 501 602 | 538 |
| 1.283 | 9.954 341 025 086 | 81 678 233 | 501 064 | 538 |
| 1.284 | 9.954 259 346 853 | 81 177 169 | 500 526 | 536 |
| 1.285 | 9.954 178 169 684 | 80 676 643 | 499 990 | 535 |
| 1.286 | 9.954 097 493 041 | 80 176 653 | 499 455 | 532 |
| 1.287 | 9.954 017 316 388 | 79 677 198 | 498 923 | 534 |
| 1.288 | 9.953 937 639 190 | 79 178 275 | 498 389 | 532 |
| 1.289 | 9.953 858 460 915 | 78 679 886 | 497 857 | 529 |
| 1.290 | 9.953 779 781 029 | 78 182 029 | 497 328 | 531 |
| 1.291 | 9.953 701 599 000 | 77 684 701 | 496 797 | 528 |
| 1.292 | 9.953 623 914 299 | 77 187 904 | 496 269 | 526 |
| 1.293 | 9.953 546 726 395 | 76 691 635 | 495 743 | 528 |
| 1.294 | 9.953 470 034 760 | 76 195 892 | 495 215 | 525 |
| 1.295 | 9.953 393 838 868 | 75 700 677 | 494 690 | 523 |
| 1.296 | 9.953 318 138 191 | 75 205 987 | 494 167 | 525 |
| 1.297 | 9.953 242 932 204 | 74 711 820 | 493 642 | 520 |
| 1.298 | 9.953 168 220 384 | 74 218 178 | 493 122 | 523 |
| 1.299 | 9.953 094 002 206 | 73 725 056 | 492 599 | 518 |
| 1.300 | 9.953 020 277 150 | 73 232 457 | 492 081 | 519 |
| 1.301 | 9.952 947 044 693 | 72 740 376 | 491 562 | 519 |
| 1.302 | 9.952 874 304 317 | 72 248 814 | 491 043 | 518 |
| 1.303 | 9.952 802 055 503 | 71 757 771 | 490 525 | 513 |
| 1.304 | 9.952 730 297 732 | 71 267 246 | 490 012 | 517 |
| 1.305 | 9.952 659 030 486 | 70 777 234 | 489 495 | 512 |
| 1.306 | 9.952 588 253 252 | 70 287 739 | 488 983 | 514 |
| 1.307 | 9.952 517 965 513 | 69 798 756 | 488 469 | 511 |
| 1.308 | 9.952 448 166 757 | 69 310 287 | 487 958 | 512 |
| 1.309 | 9.952 378 856 470 | 68 822 329 | 487 446 | 509 |
| 1.310 | 9.952 310 034 141 | 68 334 883 | 486 937 | 508 |
| 1.311 | 9.952 241 699 258 | 67 847 946 | 486 429 | 509 |
| 1.312 | 9.952 173 851 312 | 67 361 517 | 485 920 | 506 |
| 1.313 | 9.952 106 489 795 | 66 875 597 | 485 414 | 504 |
| 1.314 | 9.952 039 614 198 | 66 390 183 | 484 910 | 505 |
| 1.315 | 9.951 973 224 015 | 65 905 273 | 484 405 | 506 |
| 1.316 | 9.951 907 318 742 | 65 420 868 | 483 899 | 502 |
| 1 317 | 9.951 841 897 874 | 64 936 969 | 483 397 | 503 |
| 1.318 | 9.951 776 960 905 | 64 453 572 | 482 894 | 499 |
| 1.319 | 9.951 712 507 333 | 63 970 678 | 482 395 | 498 |
| 1.320 | 9.951 648 536 655 | 63 488 283 | 481 897 | 501 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | $diff\ I$ | $II$ | $III$ |
|---|---|---|---|---|
| 1.321 | 9.951 585 048 372 | 63 006 386 | 481 396 | 497 |
| 1.322 | 9.951 522 041 986 | 62 524 990 | 480 899 | 497 |
| 1.323 | 9.951 459 516 996 | 62 044 091 | 480 402 | 495 |
| 1.324 | 9.951 397 472 905 | 61 563 689 | 479 907 | 497 |
| 1.325 | 9.951 335 909 216 | 61 083 782 | 479 410 | 493 |
| 1.326 | 9.951 274 825 434 | 60 604 372 | 478 917 | 492 |
| 1.327 | 9.951 214 221 062 | 60 125 455 | 478 425 | 491 |
| 1.328 | 9.951 154 095 607 | 59 647 030 | 477 934 | 494 |
| 1.329 | 9.951 094 448 577 | 59 169 096 | 477 440 | 489 |
| 1.330 | 9.951 035 279 481 | 58 691 656 | 476 951 | 487 |
| 1.331 | 9.950 976 587 825 | 58 214 705 | 476 464 | 490 |
| 1.332 | 9.950 918 373 120 | 57 738 241 | 475 974 | 488 |
| 1.333 | 9.950 860 634 879 | 57 262 267 | 475 486 | 483 |
| 1.334 | 9.950 803 372 612 | 56 786 781 | 475 003 | 488 |
| 1.335 | 9.950 746 585 831 | 56 311 778 | 474 515 | 484 |
| 1.336 | 9.950 690 274 053 | 55 837 263 | 474 031 | 484 |
| 1.337 | 9.950 634 436 790 | 55 363 232 | 473 547 | 483 |
| 1.338 | 9.950 579 073 558 | 54 889 685 | 473 066 | 480 |
| 1.339 | 9.950 524 183 873 | 54 416 619 | 472 586 | 484 |
| 1.340 | 9.950 469 767 254 | 53 944 033 | 472 102 | 480 |
| 1.341 | 9.950 415 823 221 | 53 471 931 | 471 622 | 476 |
| 1.342 | 9.950 362 351 290 | 53 000 309 | 471 146 | 478 |
| 1.343 | 9.950 309 350 981 | 52 529 163 | 470 668 | 479 |
| 1.344 | 9.950 256 821 818 | 52 058 495 | 470 189 | 475 |
| 1.345 | 9.950 204 763 323 | 51 588 306 | 469 714 | 474 |
| 1.346 | 9.950 153 175 017 | 51 118 592 | 469 240 | 475 |
| 1.347 | 9.950 102 056 425 | 50 649 352 | 468 765 | 473 |
| 1.348 | 9.950 051 407 073 | 50 180 587 | 468 292 | 474 |
| 1.349 | 9.950 001 226 486 | 49 712 295 | 467 818 | 469 |
| 1.350 | 9.949 951 514 191 | 49 244 477 | 467 349 | 472 |
| 1.351 | 9.949 902 269 714 | 48 777 128 | 466 877 | 470 |
| 1.352 | 9.949 853 492 586 | 48 310 251 | 466 407 | 466 |
| 1.353 | 9.949 805 182 335 | 47 843 844 | 465 941 | 470 |
| 1.354 | 9.949 757 338 491 | 47 377 903 | 465 471 | 468 |
| 1.355 | 9.949 709 960 588 | 46 912 432 | 465 003 | 464 |
| 1.356 | 9.949 663 048 156 | 46 447 429 | 464 539 | 466 |
| 1.357 | 9.949 616 600 727 | 45 982 890 | 464 073 | 465 |
| 1.358 | 9.949 570 617 837 | 45 518 817 | 463 608 | 464 |
| 1.359 | 9.949 525 099 020 | 45 055 209 | 463 144 | 460 |
| 1.360 | 9.949 480 043 811 | 44 592 065 | 462 684 | 462 |



Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | diff I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1.361 | 9.949 435 451 746 | 44 129 381 | 462 222 | 462 |
| 1.362 | 9.949 391 322 365 | 43 667 159 | 461 760 | 459 |
| 1.363 | 9.949 347 655 206 | 43 205 399 | 461 301 | 459 |
| 1.364 | 9.949 304 449 807 | 42 744 098 | 460 842 | 458 |
| 1.365 | 9.949 261 705 709 | 42 283 256 | 460 384 | 459 |
| 1.366 | 9.949 219 422 453 | 41 822 872 | 459 925 | 456 |
| 1.367 | 9.949 177 599 581 | 41 362 947 | 459 469 | 455 |
| 1.368 | 9.949 136 236 634 | 40 903 478 | 459 014 | 454 |
| 1.369 | 9.949 095 333 156 | 40 444 464 | 458 560 | 454 |
| 1.370 | 9.949 054 888 692 | 39 985 904 | 458 106 | 454 |
| 1.371 | 9.949 014 902 788 | 39 527 798 | 457 652 | 452 |
| 1.372 | 9.948 975 374 990 | 39 070 146 | 457 200 | 450 |
| 1.373 | 9.948 936 304 844 | 38 612 946 | 456 750 | 451 |
| 1.374 | 9.948 897 691 898 | 38 156 196 | 456 299 | 450 |
| 1.375 | 9.948 859 535 702 | 37 699 897 | 455 849 | 449 |
| 1.376 | 9.948 821 835 805 | 37 244 048 | 455 400 | 447 |
| 1.377 | 9.948 784 591 757 | 36 788 648 | 454 953 | 449 |
| 1.378 | 9.948 747 803 109 | 36 333 695 | 454 504 | 444 |
| 1.379 | 9.948 711 469 414 | 35 879 191 | 454 060 | 445 |
| 1.380 | 9.948 675 590 223 | 35 425 131 | 453 615 | 447 |
| 1.381 | 9.948 640 165 092 | 34 971 516 | 453 168 | 443 |
| 1.382 | 9.948 605 193 576 | 34 518 348 | 452 725 | 442 |
| 1.383 | 9.948 570 675 228 | 34 065 623 | 452 283 | 442 |
| 1.384 | 9.948 536 609 605 | 33 613 340 | 451 841 | 442 |
| 1.385 | 9.948 502 996 265 | 33 161 499 | 451 399 | 440 |
| 1.386 | 9.948 469 834 766 | 32 710 100 | 450 959 | 439 |
| 1.387 | 9.948 437 124 666 | 32 259 141 | 450 520 | 440 |
| 1.388 | 9.948 404 865 525 | 31 808 621 | 450 080 | 438 |
| 1.389 | 9.948 373 056 904 | 31 358 541 | 449 642 | 437 |
| 1.390 | 9.948 341 698 363 | 30 908 899 | 449 205 | 436 |
| 1.391 | 9.948 310 789 464 | 30 459 694 | 448 769 | 436 |
| 1.392 | 9.948 280 329 770 | 30 010 925 | 448 333 | 435 |
| 1.393 | 9.948 250 318 845 | 29 562 592 | 447 898 | 432 |
| 1.394 | 9.948 220 756 253 | 29 114 694 | 447 466 | 435 |
| 1.395 | 9.948 191 641 559 | 28 667 228 | 447 031 | 432 |
| 1.396 | 9.948 162 974 331 | 28 220 197 | 446 599 | 432 |
| 1.397 | 9.948 134 754 134 | 27 773 598 | 446 167 | 430 |
| 1.398 | 9.948 106 980 536 | 27 327 431 | 445 737 | 431 |
| 1.399 | 9.948 079 653 105 | 26 881 694 | 445 306 | 428 |
| 1.400 | 9.948 052 771 411 | 26 436 388 | 444 878 | 429 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | $diff\ I$ | $II$ | $III$ |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | 9.948 026 335 023 | 25 991 510 | 444 449 | 426 |
| 1.402 | 9.948 000 343 513 | 25 547 061 | 444 023 | 428 |
| 1.403 | 9.947 974 796 452 | 25 103 038 | 443 595 | 427 |
| 1.404 | 9.947 949 693 414 | 24 659 443 | 443 168 | 425 |
| 1.405 | 9.947 925 033 971 | 24 216 275 | 442 743 | 424 |
| 1.406 | 9.947 900 817 696 | 23 773 532 | 442 319 | 423 |
| 1.407 | 9.947 877 044 164 | 23 331 213 | 441 896 | 424 |
| 1.408 | 9.947 853 712 951 | 22 889 317 | 441 472 | 423 |
| 1.409 | 9.947 830 823 634 | 22 447 845 | 441 049 | 419 |
| 1.410 | 9.947 808 375 789 | 22 006 796 | 440 630 | 421 |
| 1.411 | 9.947 786 368 993 | 21 566 166 | 440 209 | 422 |
| 1.412 | 9.947 764 802 827 | 21 125 957 | 439 787 | 418 |
| 1.413 | 9.947 743 676 870 | 20 686 170 | 439 369 | 417 |
| 1.414 | 9.947 722 990 700 | 20 246 801 | 438 952 | 418 |
| 1.415 | 9.947 702 743 899 | 19 807 849 | 438 534 | 418 |
| 1.416 | 9.947 682 936 050 | 19 369 315 | 438 116 | 416 |
| 1.417 | 9.947 663 566 735 | 18 931 199 | 437 700 | 415 |
| 1.418 | 9.947 644 635 536 | 18 493 499 | 437 285 | 414 |
| 1.419 | 9.947 626 142 037 | 18 056 214 | 436 871 | 414 |
| 1.420 | 9.947 608 085 823 | 17 619 343 | 436 457 | 414 |
| 1.421 | 9.947 590 466 480 | 17 182 886 | 436 043 | 410 |
| 1.422 | 9.947 573 283 594 | 16 746 843 | 435 633 | 414 |
| 1.423 | 9.947 556 536 751 | 16 311 210 | 435 219 | 410 |
| 1.424 | 9.947 540 225 541 | 15 875 991 | 434 809 | 409 |
| 1.425 | 9.947 524 349 550 | 15 441 182 | 434 400 | 411 |
| 1.426 | 9.947 508 908 368 | 15 006 782 | 433 989 | 408 |
| 1.427 | 9.947 493 901 586 | 14 572 793 | 433 581 | 408 |
| 1.428 | 9.947 479 328 793 | 14 139 212 | 433 173 | 406 |
| 1.429 | 9.947 465 189 581 | 13 706 039 | 432 767 | 407 |
| 1.430 | 9.947 451 483 542 | 13 273 272 | 432 360 | 407 |
| 1.431 | 9.947 438 210 270 | 12 840 912 | 431 953 | 404 |
| 1.432 | 9.947 425 369 358 | 12 408 959 | 431 549 | 404 |
| 1.433 | 9.947 412 960 399 | 11 977 410 | 431 145 | 403 |
| 1.434 | 9.947 400 982 989 | 11 546 265 | 430 742 | 404 |
| 1.435 | 9.947 389 436 724 | 11 115 523 | 430 338 | 402 |
| 1.436 | 9.947 378 321 201 | 10 685 185 | 429 936 | 401 |
| 1.437 | 9.947 367 636 016 | 10 255 249 | 429 535 | 400 |
| 1.438 | 9.947 357 380 767 | 9 825 714 | 429 135 | 400 |
| 1.439 | 9.947 347 555 053 | 9 396 579 | 428 735 | 399 |
| 1.440 | 9.947 338 158 474 | 8 967 844 | 428 336 | 400 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | $diff\ I$ | $II$ | $III$ |
|---|---|---|---|---|
| 1.441 | 9.947 329 190 630 | 8 539 508 | 427 936 | 398 |
| 1.442 | 9.947 320 651 122 | 8 111 572 | 427 538 | 395 |
| 1.443 | 9.947 312 539 550 | 7 684 034 | 427 143 | 398 |
| 1.444 | 9.947 304 855 516 | 7 256 891 | 426 745 | 394 |
| 1.445 | 9.947 297 598 625 | 6 830 146 | 426 351 | 397 |
| 1.446 | 9.947 290 768 479 | 6 403 795 | 425 954 | 392 |
| 1.447 | 9.947 284 364 684 | 5 977 841 | 425 562 | 395 |
| 1.448 | 9.947 278 386 843 | 5 552 279 | 425 167 | 393 |
| 1.449 | 9.947 272 834 564 | 5 127 112 | 424 774 | 392 |
| 1.450 | 9.947 267 707 452 | 4 702 338 | 424 382 | 392 |
| 1.451 | 9.947 263 005 114 | 4 277 956 | 423 990 | 390 |
| 1.452 | 9.947 258 727 158 | 3 853 966 | 423 600 | 390 |
| 1.453 | 9.947 254 873 192 | 3 430 366 | 423 210 | 390 |
| 1.454 | 9.947 251 442 826 | 3 007 156 | 422 820 | 388 |
| 1.455 | 9.947 248 435 670 | 2 584 336 | 422 432 | 388 |
| 1.456 | 9.947 245 851 334 | 2 161 904 | 422 044 | 389 |
| 1.457 | 9.947 243 689 430 | 1 739 860 | 421 655 | 385 |
| 1.458 | 9.947 241 949 570 | 1 318 205 | 421 270 | 387 |
| 1.459 | 9.947 240 631 365 | 896 935 | 420 883 | 385 |
| 1.460 | 9.947 239 734 430 | 476 052 | 420 498 | 385 |
| 1.461 | 9.947 239 258 378 | — 55 554 | 420 113 | 383 |
| 1.462 | 9.947 239 202 824 | + 364 559 | 419 730 | 384 |
| 1.463 | 9.947 239 567 383 | 784 289 | 419 346 | 383 |
| 1.464 | 9.947 240 351 672 | 1 203 635 | 418 963 | 382 |
| 1.465 | 9.947 241 555 307 | 1 622 598 | 418 581 | 380 |
| 1.466 | 9.947 243 177 905 | 2 041 179 | 418 201 | 381 |
| 1.467 | 9.947 245 219 084 | 2 559 380 | 417 820 | 382 |
| 1.468 | 9.947 247 678 464 | 2 877 200 | 417 438 | 378 |
| 1.469 | 9.947 250 555 664 | 3 294 638 | 417 060 | 378 |
| 1.470 | 9.947 253 850 302 | 3 711 698 | 416 682 | 378 |
| 1.471 | 9.947 257 562 000 | 4 128 380 | 416 304 | 378 |
| 1.472 | 9.947 261 690 380 | 4 544 684 | 415 926 | 378 |
| 1.473 | 9.947 266 235 064 | 4 960 610 | 415 548 | 374 |
| 1.474 | 9.947 271 195 674 | 5 376 158 | 415 174 | 376 |
| 1.475 | 9.947 276 571 832 | 5 791 332 | 414 798 | 375 |
| 1.476 | 9.947 282 363 164 | 6 206 130 | 414 423 | 374 |
| 1.477 | 9.947 288 569 294 | 6 620 553 | 414 049 | 374 |
| 1.478 | 9.947 295 189 847 | 7 034 602 | 413 675 | 372 |
| 1.479 | 9.947 302 224 449 | 7 448 277 | 413 303 | 371 |
| 1.480 | 9.947 309 672 726 | 7 861 580 | 412 932 | 374 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | diff I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1.481 | 9.947 317 534 306 | 8 274 512 | 412 558 | 370 |
| 1.482 | 9.947 325 808 818 | 8 687 070 | 412 188 | 370 |
| 1.483 | 9.947 334 495 888 | 9 099 258 | 411 818 | 370 |
| 1.484 | 9.947 343 595 146 | 9 511 076 | 411 448 | 368 |
| 1.485 | 9.947 353 106 222 | 9 922 524 | 411 080 | 368 |
| 1.486 | 9.947 363 028 746 | 10 333 604 | 410 712 | 370 |
| 1.487 | 9.947 373 362 350 | 10 744 316 | 410 342 | 366 |
| 1.488 | 9.947 384 106 666 | 11 154 658 | 409 976 | 366 |
| 1.489 | 9.947 395 261 324 | 11 564 634 | 409 610 | 366 |
| 1.490 | 9.947 406 825 958 | 11 974 244 | 409 244 | 365 |
| 1.491 | 9.947 418 800 202 | 12 383 488 | 408 879 | 365 |
| 1.492 | 9.947 431 183 690 | 12 792 367 | 408 514 | 364 |
| 1.493 | 9.947 443 976 057 | 13 200 881 | 408 150 | 363 |
| 1.494 | 9.947 457 176 938 | 13 609 031 | 407 787 | 363 |
| 1.495 | 9.947 470 785 969 | 14 016 818 | 407 424 | 361 |
| 1.496 | 9.947 484 802 787 | 14 424 242 | 407 063 | 364 |
| 1.497 | 9.947 499 227 029 | 14 831 305 | 406 699 | 358 |
| 1.498 | 9.947 514 058 334 | 15 238 004 | 406 341 | 362 |
| 1.499 | 9.947 529 296 338 | 15 644 345 | 405 979 | 359 |
| 1.500 | 9.947 514 940 683 | 16 050 324 | 405 620 | 359 |
| 1.501 | 9.947 560 991 007 | 16 455 944 | 405 261 | 359 |
| 1.502 | 9.947 577 446 951 | 16 861 205 | 404 902 | 357 |
| 1.503 | 9.947 594 308 156 | 17 266 107 | 404 545 | 358 |
| 1.504 | 9.947 611 574 263 | 17 670 652 | 404 187 | 356 |
| 1.505 | 9.947 629 244 915 | 18 074 839 | 403 831 | 356 |
| 1.506 | 9.947 647 319 754 | 18 478 670 | 403 475 | 356 |
| 1.507 | 9.947 665 798 424 | 18 882 145 | 403 119 | 354 |
| 1.508 | 9.947 684 680 569 | 19 285 264 | 402 765 | 355 |
| 1.509 | 9.947 703 965 833 | 19 688 029 | 402 410 | 353 |
| 1.510 | 9.947 723 653 862 | 20 090 439 | 402 057 | 353 |
| 1.511 | 9.947 743 744 301 | 20 492 496 | 401 704 | 352 |
| 1.512 | 9.947 764 236 797 | 20 894 200 | 401 352 | 354 |
| 1.513 | 9.947 785 130 997 | 21 295 552 | 400 998 | 349 |
| 1.514 | 9.947 806 426 549 | 21 696 550 | 400 649 | 351 |
| 1.515 | 9.947 828 123 099 | 22 097 199 | 400 298 | 350 |
| 1.516 | 9.947 850 220 298 | 22 497 497 | 399 948 | 350 |
| 1.517 | 9.947 872 717 795 | 22 897 445 | 399 598 | 349 |
| 1.518 | 9.947 895 615 240 | 23 297 043 | 399 249 | 348 |
| 1.519 | 9.947 918 912 283 | 23 696 292 | 398 901 | 347 |
| 1.520 | 9.947 942 608 575 | 24 095 193 | 398 554 | 348 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | *diff I* | *II* | *III* |
|---|---|---|---|---|
| 1.521 | 9.947 966 703 768 | 24 493 747 | 398 206 | 347 |
| 1.522 | 9.947 991 197 515 | 24 891 953 | 397 859 | 345 |
| 1.523 | 9.948 016 089 468 | 25 289 812 | 397 514 | 346 |
| 1.524 | 9.948 041 379 280 | 25 687 326 | 397 168 | 344 |
| 1.525 | 9.948 067 066 606 | 26 084 494 | 396 824 | 344 |
| 1.526 | 9.948 093 151 100 | 26 481 318 | 396 480 | 344 |
| 1.527 | 9.948 119 632 418 | 26 877 798 | 396 136 | 345 |
| 1.528 | 9.948 146 510 216 | 27 273 934 | 395 791 | 341 |
| 1.529 | 9.948 173 784 150 | 27 669 725 | 395 450 | 341 |
| 1.530 | 9.948 201 453 875 | 28 065 175 | 395 109 | 342 |
| 1.531 | 9.948 229 519 050 | 28 460 284 | 394 767 | 342 |
| 1.532 | 9.948 257 979 334 | 28 855 051 | 394 425 | 340 |
| 1.533 | 9.948 286 834 385 | 29 249 476 | 394 085 | 339 |
| 1.534 | 9.948 316 083 861 | 29 643 561 | 393 746 | 339 |
| 1.535 | 9.948 345 727 422 | 30 037 307 | 393 407 | 339 |
| 1.536 | 9.948 375 764 729 | 30 430 714 | 393 068 | 338 |
| 1.537 | 9.948 406 195 443 | 30 823 782 | 392 730 | 337 |
| 1.538 | 9.948 437 019 225 | 31 216 512 | 392 393 | 337 |
| 1.539 | 9.948 468 235 737 | 31 608 905 | 392 056 | 336 |
| 1.540 | 9.948 499 844 642 | 32 000 961 | 391 720 | 337 |
| 1.541 | 9.948 531 845 603 | 32 392 681 | 391 383 | 334 |
| 1.542 | 9.948 564 238 284 | 32 784 064 | 391 049 | 336 |
| 1.543 | 9.948 597 022 348 | 33 175 113 | 390 713 | 334 |
| 1.544 | 9.948 630 197 461 | 33 565 826 | 390 379 | 332 |
| 1.545 | 9.948 663 763 287 | 33 956 205 | 390 047 | 335 |
| 1.546 | 9.948 697 719 492 | 34 346 252 | 389 712 | 331 |
| 1.547 | 9.948 732 065 744 | 34 735 964 | 389 381 | 332 |
| 1.548 | 9.948 766 801 708 | 35 125 345 | 389 049 | 332 |
| 1.549 | 9.948 801 927 053 | 35 514 394 | 388 717 | 331 |
| 1.550 | 9.948 837 441 447 | 35 903 111 | 388 386 | 331 |
| 1.551 | 9.948 873 344 558 | 36 291 497 | 388 055 | 327 |
| 1.552 | 9.948 909 636 055 | 36 679 552 | 387 728 | 332 |
| 1.553 | 9.948 946 315 607 | 37 067 280 | 387 396 | 328 |
| 1.554 | 9.948 983 382 887 | 37 454 676 | 387 068 | 329 |
| 1.555 | 9.949 020 837 563 | 37 841 744 | 386 739 | 325 |
| 1.556 | 9.949 058 679 307 | 38 228 483 | 386 414 | 329 |
| 1.557 | 9.949 096 907 790 | 38 614 897 | 386 085 | 326 |
| 1.558 | 9.949 135 522 687 | 39 000 982 | 385 759 | 327 |
| 1.559 | 9.949 174 523 669 | 39 386 741 | 385 432 | 324 |
| 1.560 | 9.949 213 910 410 | 39 772 173 | 385 108 | 327 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | $diff\ I$ | $II$ | $III$ |
|---|---|---|---|---|
| 1.561 | 9.949 253 682 583 | 40 157 281 | 384 781 | 323 |
| 1.562 | 9.949 293 839 864 | 40 542 062 | 384 458 | 323 |
| 1.563 | 9.949 334 381 926 | 40 926 520 | 384 135 | 326 |
| 1.564 | 9.949 375 308 446 | 41 310 655 | 383 809 | 321 |
| 1.565 | 9.949 416 619 101 | 41 694 464 | 383 488 | 323 |
| 1.566 | 9.949 458 313 565 | 42 077 952 | 383 165 | 321 |
| 1.567 | 9.949 500 391 517 | 42 461 117 | 382 844 | 322 |
| 1.568 | 9.949 542 852 634 | 42 843 961 | 382 522 | 322 |
| 1.569 | 9.949 585 696 595 | 43 226 483 | 382 200 | 319 |
| 1.570 | 9.949 628 923 078 | 43 608 683 | 381 881 | 319 |
| 1.571 | 9.949 672 531 761 | 43 990 564 | 381 562 | 320 |
| 1.572 | 9.949 716 522 325 | 44 372 126 | 381 242 | 320 |
| 1.573 | 9.949 760 894 451 | 44 753 368 | 380 922 | 317 |
| 1.574 | 9.949 805 647 819 | 45 134 290 | 380 605 | 317 |
| 1.575 | 9.949 850 782 109 | 45 514 895 | 380 288 | 318 |
| 1.576 | 9.949 896 297 004 | 45 895 183 | 379 970 | 317 |
| 1.577 | 9.949 942 192 187 | 46 275 153 | 379 653 | 316 |
| 1.578 | 9.949 988 467 340 | 46 654 806 | 379 337 | 315 |
| 1.579 | 9.950 035 122 146 | 47 034 143 | 379 022 | 317 |
| 1.580 | 9.950 082 156 289 | 47 413 165 | 378 705 | 313 |
| 1.581 | 9.950 129 569 454 | 47 791 870 | 378 392 | 314 |
| 1.582 | 9.950 177 361 324 | 48 170 262 | 378 078 | 314 |
| 1.583 | 9.950 225 531 586 | 48 548 340 | 377 764 | 315 |
| 1.584 | 9.950 274 079 926 | 48 926 104 | 377 449 | 311 |
| 1.585 | 9.950 323 006 030 | 49 303 553 | 377 138 | 311 |
| 1.586 | 9.950 372 309 583 | 49 680 691 | 376 827 | 313 |
| 1.587 | 9.950 421 990 274 | 50 057 518 | 376 514 | 312 |
| 1.588 | 9.950 472 047 792 | 50 434 032 | 376 202 | 310 |
| 1.589 | 9.950 522 481 824 | 50 810 234 | 375 892 | 309 |
| 1.590 | 9.950 573 292 058 | 51 186 126 | 375 583 | 311 |
| 1.591 | 9.950 624 478 184 | 51 561 709 | 375 272 | 310 |
| 1.592 | 9.950 676 039 893 | 51 936 981 | 374 962 | 307 |
| 1.593 | 9.950 727 976 874 | 52 311 943 | 374 655 | 308 |
| 1.594 | 9.950 780 288 817 | 52 686 598 | 374 347 | 309 |
| 1.595 | 9.950 832 975 415 | 53 060 945 | 374 038 | 308 |
| 1.596 | 9.950 886 036 360 | 53 434 982 | 373 730 | 305 |
| 1.597 | 9.950 939 471 343 | 53 808 713 | 373 425 | 307 |
| 1.598 | 9.950 993 280 056 | 54 182 138 | 373 118 | 306 |
| 1.599 | 9.951 047 462 194 | 54 555 256 | 372 812 | 305 |
| 1.600 | 9.951 102 017 450 | 54 928 068 | 372 507 | 305 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | $diff\ I$ | $II$ | $III$ |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | 9.951 156 945 518 | 55 300 575 | 372 202 | 303 |
| 1.602 | 9.951 212 246 093 | 55 672 777 | 371 899 | 305 |
| 1.603 | 9.951 267 918 870 | 56 044 676 | 371 594 | 304 |
| 1.604 | 9.951 323 963 546 | 56 416 270 | 371 290 | 303 |
| 1.605 | 9.951 380 379 816 | 56 787 560 | 370 987 | 302 |
| 1.606 | 9.951 437 167 376 | 57 158 547 | 370 685 | 302 |
| 1.607 | 9.951 494 325 923 | 57 529 232 | 370 383 | 301 |
| 1.608 | 9.951 551 855 155 | 57 899 615 | 370 082 | 301 |
| 1.609 | 9.951 609 754 770 | 58 269 697 | 369 781 | 300 |
| 1.610 | 9.951 668 024 467 | 58 639 478 | 369 481 | 302 |
| 1.611 | 9.951 726 663 945 | 59 008 959 | 369 179 | 299 |
| 1.612 | 9.951 785 672 904 | 59 378 138 | 368 880 | 298 |
| 1.613 | 9.951 845 051 042 | 59 747 018 | 368 582 | 301 |
| 1.614 | 9.951 904 798 060 | 60 115 600 | 368 281 | 296 |
| 1.615 | 9.951 964 913 660 | 60 483 881 | 367 985 | 298 |
| 1.616 | 9.952 025 397 541 | 60 851 866 | 367 687 | 297 |
| 1.617 | 9.952 086 249 407 | 61 219 553 | 367 390 | 298 |
| 1.618 | 9.952 147 468 960 | 61 586 943 | 367 092 | 297 |
| 1.619 | 9.952 209 055 903 | 61 954 035 | 366 795 | 294 |
| 1.620 | 9.952 271 009 938 | 62 320 830 | 366 501 | 296 |
| 1.621 | 9.952 333 330 768 | 62 687 331 | 366 205 | 295 |
| 1.622 | 9.952 396 018 099 | 63 053 536 | 365 910 | 294 |
| 1.623 | 9.952 459 071 635 | 63 419 446 | 365 616 | 296 |
| 1.624 | 9.952 522 491 081 | 63 785 062 | 365 320 | 293 |
| 1.625 | 9.952 586 276 143 | 64 150 382 | 365 027 | 291 |
| 1.626 | 9.952 650 426 525 | 64 515 409 | 364 736 | 294 |
| 1.627 | 9.952 714 941 934 | 64 880 145 | 364 442 | 293 |
| 1.628 | 9.952 779 822 079 | 65 244 587 | 364 149 | 292 |
| 1.629 | 9.952 845 066 666 | 65 608 735 | 363 857 | 290 |
| 1.630 | 9.952 910 675 402 | 65 972 593 | 363 567 | 291 |
| 1.631 | 9.952 976 647 995 | 66 336 160 | 363 276 | 291 |
| 1.632 | 9.953 042 984 155 | 66 699 436 | 362 985 | 290 |
| 1.633 | 9.953 109 683 591 | 67 062 421 | 362 695 | 289 |
| 1.634 | 9.953 176 746 012 | 67 425 116 | 362 406 | 291 |
| 1.635 | 9.953 244 171 128 | 67 787 522 | 362 115 | 286 |
| 1.636 | 9.953 311 958 650 | 68 149 637 | 361 829 | 291 |
| 1.637 | 9.953 380 108 287 | 68 511 466 | 361 538 | 287 |
| 1.638 | 9.953 448 619 753 | 68 873 004 | 361 251 | 285 |
| 1.639 | 9.953 517 492 757 | 69 234 255 | 360 966 | 288 |
| 1.640 | 9.953 586 727 012 | 69 595 221 | 360 678 | 287 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | diff I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1.641 | 9.953 656 322 233 | 69 955 899 | 360 391 | 286 |
| 1.642 | 9.953 726 278 132 | 70 316 290 | 360 105 | 286 |
| 1.643 | 9.953 796 594 422 | 70 676 395 | 359 819 | 285 |
| 1.644 | 9.953 867 270 817 | 71 036 214 | 359 534 | 284 |
| 1.645 | 9.953 938 307 031 | 71 395 748 | 359 250 | 285 |
| 1.646 | 9.954 009 702 779 | 71 754 998 | 358 965 | 283 |
| 1.647 | 9.954 081 457 777 | 72 113 963 | 358 682 | 284 |
| 1.648 | 9.954 153 571 740 | 72 472 645 | 358 398 | 283 |
| 1.649 | 9.954 226 044 385 | 72 831 043 | 358 115 | 282 |
| 1.650 | 9.954 298 875 428 | 73 189 158 | 357 833 | 283 |
| 1.651 | 9.954 372 064 586 | 73 546 991 | 357 550 | 282 |
| 1.652 | 9.954 445 611 577 | 73 904 541 | 357 268 | 279 |
| 1.653 | 9.954 519 516 118 | 74 261 809 | 356 989 | 282 |
| 1.654 | 9.954 593 777 927 | 74 618 798 | 356 707 | 283 |
| 1.655 | 9.954 668 396 725 | 74 975 505 | 356 424 | 277 |
| 1.656 | 9.954 743 372 230 | 75 331 929 | 356 147 | 278 |
| 1.657 | 9.954 818 704 159 | 75 688 076 | 355 869 | 282 |
| 1.658 | 9.954 894 392 235 | 76 043 945 | 355 587 | 279 |
| 1.659 | 9.954 970 436 180 | 76 399 532 | 355 308 | 277 |
| 1.660 | 9.955 046 835 712 | 76 754 840 | 355 031 | 279 |
| 1.661 | 9.955 123 590 552 | 77 109 871 | 354 752 | 276 |
| 1.662 | 9.955 200 700 423 | 77 464 623 | 354 476 | 277 |
| 1.663 | 9.955 278 165 046 | 77 819 099 | 354 199 | 278 |
| 1.664 | 9.955 355 981 045 | 78 173 298 | 353 921 | 275 |
| 1.665 | 9.955 434 157 443 | 78 527 219 | 353 646 | 276 |
| 1.666 | 9.955 512 684 662 | 78 880 865 | 353 370 | 277 |
| 1.667 | 9.955 591 565 527 | 79 234 235 | 353 093 | 273 |
| 1.668 | 9.955 670 799 762 | 79 587 328 | 352 820 | 275 |
| 1.669 | 9.955 750 387 090 | 79 940 148 | 352 545 | 274 |
| 1.670 | 9.955 830 327 238 | 80 292 693 | 352 271 | 274 |
| 1.671 | 9.955 910 619 931 | 80 644 964 | 351 997 | 273 |
| 1.672 | 9.955 991 264 895 | 80 996 961 | 351 724 | 273 |
| 1.673 | 9.956 072 261 856 | 81 348 685 | 351 451 | 273 |
| 1.674 | 9.956 153 610 541 | 81 700 136 | 351 178 | 271 |
| 1.675 | 9.956 235 310 677 | 82 051 314 | 350 907 | 273 |
| 1.676 | 9.956 317 361 991 | 82 402 221 | 350 634 | 270 |
| 1.677 | 9.956 399 764 212 | 82 752 855 | 350 364 | 273 |
| 1.678 | 9.956 482 517 067 | 83 103 219 | 350 091 | 269 |
| 1.679 | 9.956 565 620 286 | 83 453 310 | 349 822 | 269 |
| 1.680 | 9.956 649 073 596 | 83 803 132 | 349 553 | 269 |



Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | $diff\ I$ | $II$ | $III$ |
|---|---|---|---|---|
| 1.681 | 9.956 732 876 728 | 84 152 685 | 349 284 | 271 |
| 1.682 | 9.956 817 029 413 | 84 501 969 | 349 013 | 269 |
| 1.683 | 9.956 901 531 382 | 84 850 982 | 348 744 | 269 |
| 1.684 | 9.956 986 382 364 | 85 199 726 | 348 475 | 268 |
| 1.685 | 9.957 071 582 090 | 85 548 201 | 348 207 | 266 |
| 1.686 | 9.957 157 130 291 | 85 896 408 | 347 941 | 268 |
| 1.687 | 9.957 243 026 699 | 86 244 349 | 347 673 | 267 |
| 1.688 | 9.957 329 271 048 | 86 592 022 | 347 406 | 265 |
| 1.689 | 9.957 415 863 070 | 86 939 428 | 347 141 | 268 |
| 1.690 | 9.957 502 802 498 | 87 286 569 | 346 873 | 266 |
| 1.691 | 9.957 590 089 067 | 87 633 442 | 346 607 | 265 |
| 1.692 | 9.957 677 722 509 | 87 980 049 | 346 342 | 264 |
| 1.693 | 9.957 765 702 558 | 88 326 392 | 346 078 | 266 |
| 1.694 | 9.957 854 028 950 | 88 672 470 | 345 812 | 261 |
| 1.695 | 9.957 942 701 420 | 89 018 282 | 345 551 | 265 |
| 1.696 | 9.958 031 719 702 | 89 363 833 | 345 286 | 265 |
| 1.697 | 9.958 121 083 535 | 89 709 119 | 345 021 | 263 |
| 1.698 | 9.958 210 792 654 | 90 054 140 | 344 758 | 260 |
| 1.699 | 9.958 300 846 794 | 90 398 898 | 344 498 | 264 |
| 1.700 | 9.958 391 245 692 | 90 743 396 | 344 234 | 261 |
| 1.701 | 9.958 481 989 088 | 91 087 630 | 343 973 | 260 |
| 1.702 | 9.958 573 076 718 | 91 431 603 | 343 712 | 262 |
| 1.703 | 9.958 664 508 321 | 91 775 315 | 343 450 | 260 |
| 1.704 | 9.958 756 283 636 | 92 118 765 | 343 190 | 261 |
| 1.705 | 9.958 848 402 401 | 92 461 955 | 342 929 | 260 |
| 1.706 | 9.958 940 864 356 | 92 804 884 | 342 669 | 258 |
| 1.707 | 9.959 033 669 240 | 93 147 553 | 342 411 | 260 |
| 1.708 | 9.959 126 816 793 | 93 489 964 | 342 151 | 259 |
| 1.709 | 9.959 220 306 757 | 93 832 115 | 341 892 | 257 |
| 1.710 | 9.959 314 138 872 | 94 174 007 | 341 635 | 261 |
| 1.711 | 9.959 408 312 879 | 94 515 642 | 341 374 | 256 |
| 1.712 | 9.959 502 828 521 | 94 857 016 | 341 118 | 254 |
| 1.713 | 9.959 597 685 537 | 95 198 134 | 340 864 | 260 |
| 1.714 | 9.959 692 883 671 | 95 538 998 | 340 604 | 257 |
| 1.715 | 9.959 788 422 669 | 95 879 602 | 340 347 | 255 |
| 1.716 | 9.959 884 302 271 | 96 219 949 | 340 092 | 256 |
| 1.717 | 9.959 980 522 220 | 96 560 041 | 339 836 | 255 |
| 1.718 | 9.960 077 082 261 | 96 899 877 | 339 581 | 255 |
| 1.719 | 9.960 173 982 138 | 97 239 458 | 339 326 | 256 |
| 1.720 | 9.960 271 221 596 | 97 578 784 | 339 070 | 252 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | diff I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1.721 | 9.960 368 800 380 | 97 917 854 | 338 818 | 256 |
| 1.722 | 9.960 466 718 234 | 98 256 672 | 338 562 | 251 |
| 1.723 | 9.960 564 974 906 | 98 595 234 | 338 311 | 254 |
| 1.724 | 9.960 663 570 140 | 98 933 545 | 338 057 | 255 |
| 1.725 | 9.960 762 503 685 | 99 271 602 | 337 802 | 250 |
| 1.726 | 9.960 861 775 287 | 99 609 404 | 337 552 | 252 |
| 1.727 | 9.960 961 384 691 | 99 946 956 | 337 300 | 253 |
| 1.728 | 9.961 061 331 647 | 100 284 256 | 337 047 | 251 |
| 1.729 | 9.961 161 615 903 | 100 621 303 | 336 796 | 251 |
| 1.730 | 9.961 262 237 206 | 100 958 099 | 336 545 | 250 |
| 1.731 | 9.961 363 195 305 | 101 294 644 | 336 295 | 250 |
| 1.732 | 9.961 464 489 949 | 101 630 939 | 336 045 | 251 |
| 1.733 | 9.961 566 120 888 | 101 966 984 | 335 794 | 248 |
| 1.734 | 9.961 668 087 872 | 102 302 778 | 335 546 | 250 |
| 1.735 | 9.961 770 390 650 | 102 638 324 | 335 296 | 250 |
| 1.736 | 9.961 873 028 974 | 102 973 620 | 335 046 | 247 |
| 1.737 | 9.961 976 002 594 | 103 308 666 | 334 799 | 248 |
| 1.738 | 9.962 079 311 260 | 103 643 465 | 334 551 | 247 |
| 1.739 | 9.962 182 954 725 | 103 978 016 | 334 304 | 248 |
| 1.740 | 9.962 286 932 741 | 104 312 320 | 334 056 | 249 |
| 1.741 | 9.962 391 245 061 | 104 646 376 | 333 807 | 244 |
| 1.742 | 9.962 495 891 437 | 104 980 183 | 333 563 | 245 |
| 1.743 | 9.962 600 871 620 | 105 313 746 | 333 318 | 250 |
| 1.744 | 9.962 706 185 366 | 105 647 064 | 333 068 | 246 |
| 1.745 | 9.962 811 832 430 | 105 980 132 | 332 822 | 243 |
| 1.746 | 9.962 917 812 562 | 106 312 954 | 332 579 | 244 |
| 1.747 | 9.963 024 125 516 | 106 645 533 | 332 335 | 246 |
| 1.748 | 9.963 130 771 049 | 106 977 868 | 332 089 | 243 |
| 1.749 | 9.963 237 748 917 | 107 309 957 | 331 846 | 244 |
| 1.750 | 9.963 345 058 874 | 107 641 803 | 331 602 | 245 |
| 1.751 | 9.963 452 700 677 | 107 973 405 | 331 357 | 242 |
| 1.752 | 9.963 560 674 082 | 108 304 762 | 331 115 | 243 |
| 1.753 | 9.963 668 978 844 | 108 635 877 | 330 872 | 243 |
| 1.754 | 9.963 777 614 721 | 108 966 749 | 330 629 | 241 |
| 1.755 | 9.963 886 581 470 | 109 297 378 | 330 388 | 243 |
| 1.756 | 9.963 995 878 848 | 109 627 766 | 330 145 | 241 |
| 1.757 | 9.964 105 506 614 | 109 957 911 | 329 904 | 241 |
| 1.758 | 9.964 215 464 525 | 110 287 815 | 329 663 | 240 |
| 1.759 | 9.964 325 752 340 | 110 617 478 | 329 423 | 241 |
| 1.760 | 9.964 436 369 818 | 110 946 901 | 329 182 | 241 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | diff I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1.761 | 9.964 547 316 719 | 111 276 083 | 328 941 | 239 |
| 1.762 | 9.964 658 592 802 | 111 605 024 | 328 702 | 239 |
| 1.763 | 9.964 770 197 826 | 111 933 726 | 328 463 | 240 |
| 1.764 | 9.964 882 131 552 | 112 262 189 | 328 223 | 238 |
| 1.765 | 9.964 994 393 741 | 112 590 412 | 327 985 | 238 |
| 1.766 | 9.965 106 984 153 | 112 918 397 | 327 747 | 239 |
| 1.767 | 9.965 219 902 550 | 113 246 144 | 327 508 | 237 |
| 1.768 | 9.965 333 148 694 | 113 573 652 | 327 271 | 238 |
| 1.769 | 9.965 446 722 346 | 113 900 923 | 327 033 | 237 |
| 1.770 | 9.965 560 623 269 | 114 227 956 | 326 796 | 237 |
| 1.771 | 9.965 674 851 225 | 114 554 752 | 326 559 | 235 |
| 1.772 | 9.965 789 405 977 | 114 881 311 | 326 324 | 237 |
| 1.773 | 9.965 904 287 288 | 115 207 635 | 326 087 | 236 |
| 1.774 | 9.966 019 494 923 | 115 533 722 | 325 851 | 234 |
| 1.775 | 9.966 135 028 645 | 115 859 573 | 325 617 | 237 |
| 1.776 | 9.966 250 888 218 | 116 185 190 | 325 380 | 234 |
| 1.777 | 9.966 367 073 408 | 116 510 570 | 325 146 | 234 |
| 1.778 | 9.966 483 583 978 | 116 835 716 | 324 912 | 234 |
| 1.779 | 9.966 600 419 694 | 117 160 628 | 324 678 | 235 |
| 1.780 | 9.966 717 580 322 | 117 485 306 | 324 443 | 232 |
| 1.781 | 9.966 835 065 628 | 117 809 749 | 324 211 | 233 |
| 1.782 | 9.966 952 875 377 | 118 133 960 | 323 978 | 234 |
| 1.783 | 9.967 071 009 337 | 118 457 938 | 323 744 | 232 |
| 1.784 | 9.967 189 467 275 | 118 781 682 | 323 512 | 231 |
| 1.785 | 9.967 308 248 957 | 119 105 194 | 323 281 | 234 |
| 1.786 | 9.967 427 354 151 | 119 428 475 | 323 047 | 230 |
| 1.787 | 9.967 546 782 626 | 119 751 522 | 322 817 | 231 |
| 1.788 | 9.967 666 534 148 | 120 074 339 | 322 586 | 231 |
| 1.789 | 9.967 786 608 487 | 120 396 925 | 322 355 | 231 |
| 1.790 | 9.967 907 005 412 | 120 719 280 | 322 124 | 230 |
| 1.791 | 9.968 027 724 692 | 121 041 404 | 321 894 | 230 |
| 1.792 | 9.968 148 766 096 | 121 363 298 | 321 664 | 230 |
| 1.793 | 9.968 270 129 394 | 121 684 962 | 321 434 | 228 |
| 1.794 | 9.968 391 814 356 | 122 006 396 | 321 206 | 230 |
| 1.795 | 9.968 513 820 752 | 122 327 602 | 320 976 | 228 |
| 1.796 | 9.968 636 148 354 | 122 648 578 | 320 748 | 228 |
| 1.797 | 9.968 758 796 932 | 122 969 326 | 320 520 | 229 |
| 1.798 | 9.968 881 766 258 | 123 289 846 | 320 291 | 227 |
| 1.799 | 9.969 005 056 104 | 123 610 137 | 320 064 | 228 |
| 1.800 | 9.969 128 666 241 | 123 930 201 | 319 836 | 226 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | diff I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | 9.969 252 596 412 | 124 250 037 | 319 610 | 228 |
| 1.802 | 9.969 376 846 479 | 124 569 647 | 319 382 | 225 |
| 1.803 | 9.969 501 416 126 | 124 889 029 | 319 157 | 227 |
| 1.804 | 9.969 626 305 155 | 125 208 186 | 318 930 | 225 |
| 1.805 | 9.969 751 513 341 | 125 527 116 | 318 705 | 227 |
| 1.806 | 9.969 877 040 457 | 125 845 821 | 318 478 | 225 |
| 1.807 | 9.970 002 886 278 | 126 164 299 | 318 253 | 223 |
| 1.808 | 9.970 129 050 577 | 126 482 552 | 318 030 | 226 |
| 1.809 | 9.970 255 533 129 | 126 800 582 | 317 804 | 224 |
| 1.810 | 9.970 382 333 711 | 127 118 386 | 317 580 | 224 |
| 1.811 | 9.970 509 452 097 | 127 435 966 | 317 356 | 223 |
| 1.812 | 9.970 636 888 063 | 127 753 322 | 317 133 | 224 |
| 1.813 | 9.970 764 641 385 | 128 070 455 | 316 909 | 223 |
| 1.814 | 9.970 892 711 840 | 128 387 364 | 316 686 | 223 |
| 1.815 | 9.971 021 099 204 | 128 704 050 | 316 463 | 222 |
| 1.816 | 9.971 149 803 254 | 129 020 513 | 316 241 | 222 |
| 1.817 | 9.971 278 823 767 | 129 336 754 | 316 019 | 222 |
| 1.818 | 9.971 408 160 521 | 129 652 773 | 315 797 | 221 |
| 1.819 | 9.971 537 813 294 | 129 968 570 | 315 576 | 222 |
| 1.820 | 9.971 667 781 864 | 130 284 146 | 315 354 | 221 |
| 1.821 | 9.971 798 066 010 | 130 599 500 | 315 133 | 220 |
| 1.822 | 9.971 928 665 510 | 130 914 633 | 314 913 | 221 |
| 1.823 | 9.972 059 580 143 | 131 229 546 | 314 692 | 219 |
| 1.824 | 9.972 190 809 689 | 131 544 238 | 314 473 | 220 |
| 1.825 | 9.972 322 353 927 | 131 858 711 | 314 253 | 220 |
| 1.826 | 9.972 454 212 638 | 132 172 964 | 314 033 | 219 |
| 1.827 | 9.972 586 385 602 | 132 486 997 | 313 814 | 219 |
| 1.828 | 9.972 718 872 599 | 132 800 811 | 313 595 | 217 |
| 1.829 | 9.972 851 673 410 | 133 114 406 | 313 378 | 220 |
| 1.830 | 9.972 984 787 816 | 133 427 784 | 313 158 | 217 |
| 1.831 | 9.973 118 215 600 | 133 740 942 | 312 941 | 218 |
| 1.832 | 9.973 251 956 542 | 134 053 883 | 312 723 | 218 |
| 1.833 | 9.973 386 010 425 | 134 366 606 | 312 505 | 216 |
| 1.834 | 9.973 520 377 031 | 134 679 111 | 312 289 | 216 |
| 1.835 | 9.973 655 056 142 | 134 991 400 | 312 073 | 219 |
| 1.836 | 9.973 790 047 542 | 135 303 473 | 311 854 | 214 |
| 1.837 | 9.973 925 351 015 | 135 615 327 | 311 640 | 217 |
| 1.838 | 9.974 060 966 342 | 135 926 967 | 311 423 | 215 |
| 1.839 | 9.974 196 893 309 | 136 238 390 | 311 208 | 216 |
| 1.840 | 9.974 333 131 699 | 136 549 598 | 310 992 | 214 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | $diff\ I$ | $II$ | $III$ |
|---|---|---|---|---|
| 1.841 | 9.974 469 681 297 | 136 860 590 | 310 778 | 215 |
| 1.842 | 9.974 606 541 887 | 137 171 368 | 310 563 | 215 |
| 1.843 | 9.974 743 713 255 | 137 481 931 | 310 348 | 214 |
| 1.844 | 9.974 881 195 186 | 137 792 279 | 310 134 | 214 |
| 1.845 | 9.975 018 987 465 | 138 102 413 | 309 920 | 213 |
| 1.846 | 9.975 157 089 878 | 138 412 333 | 309 707 | 213 |
| 1.847 | 9.975 295 502 211 | 138 722 040 | 309 494 | 214 |
| 1.848 | 9.975 434 224 251 | 139 031 534 | 309 280 | 213 |
| 1.849 | 9.975 573 255 785 | 139 340 814 | 309 067 | 211 |
| 1.850 | 9.975 712 596 599 | 139 649 881 | 308 856 | 214 |
| 1.851 | 9.975 852 246 480 | 139 958 737 | 308 642 | 210 |
| 1.852 | 9.975 992 205 217 | 140 267 379 | 308 432 | 212 |
| 1.853 | 9.976 132 472 596 | 140 575 811 | 308 220 | 212 |
| 1.854 | 9.976 273 048 407 | 140 884 031 | 308 008 | 211 |
| 1.855 | 9.976 413 932 438 | 141 192 039 | 307 797 | 211 |
| 1.856 | 9.976 555 124 477 | 141 499 836 | 307 586 | 209 |
| 1.857 | 9.976 696 624 313 | 141 807 422 | 307 377 | 211 |
| 1.858 | 9.976 838 431 735 | 142 114 799 | 307 166 | 211 |
| 1.859 | 9.976 980 546 534 | 142 421 965 | 306 955 | 208 |
| 1.860 | 9.977 122 968 499 | 142 728 920 | 306 747 | 210 |
| 1.861 | 9.977 265 697 419 | 143 035 667 | 306 537 | 209 |
| 1.862 | 9.977 408 733 086 | 143 342 204 | 306 328 | 209 |
| 1.863 | 9.977 552 075 290 | 143 648 532 | 306 119 | 209 |
| 1.864 | 9.977 695 723 822 | 143 954 651 | 305 910 | 207 |
| 1.865 | 9.977 839 678 473 | 144 260 561 | 305 703 | 208 |
| 1.866 | 9.977 983 939 034 | 144 566 264 | 305 495 | 209 |
| 1.867 | 9.978 128 505 298 | 144 871 759 | 305 286 | 208 |
| 1.868 | 9.978 273 377 057 | 145 177 045 | 305 078 | 206 |
| 1.869 | 9.978 418 554 102 | 145 482 123 | 304 872 | 205 |
| 1.870 | 9.978 564 036 225 | 145 786 995 | 304 667 | 209 |
| 1.871 | 9.978 709 823 220 | 146 091 662 | 304 458 | 205 |
| 1.872 | 9.978 855 914 882 | 146 396 120 | 304 253 | 207 |
| 1.873 | 9.979 002 311 002 | 146 700 373 | 304 046 | 206 |
| 1.874 | 9.979 149 011 375 | 147 004 419 | 303 840 | 205 |
| 1.875 | 9.979 296 015 794 | 147 308 259 | 303 635 | 205 |
| 1.876 | 9.979 443 324 053 | 147 611 894 | 303 430 | 206 |
| 1.877 | 9.979 590 935 947 | 147 915 324 | 303 224 | 203 |
| 1.878 | 9.979 738 851 271 | 148 218 548 | 303 021 | 206 |
| 1.879 | 9.979 887 069 819 | 148 521 569 | 302 815 | 203 |
| 1.880 | 9.980 035 591 388 | 148 824 384 | 302 612 | 205 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | $diff\ I$ | $II$ | $III$ |
|---|---|---|---|---|
| 1.881 | 9.980 184 415 772 | 149 126 996 | 302 407 | 203 |
| 1.882 | 9.980 333 542 768 | 149 429 403 | 302 204 | 203 |
| 1.883 | 9.980 482 972 171 | 149 731 607 | 302 001 | 204 |
| 1.884 | 9.980 632 703 778 | 150 033 608 | 301 797 | 202 |
| 1.885 | 9.980 782 737 386 | 150 335 405 | 301 595 | 203 |
| 1.886 | 9.980 933 072 791 | 150 637 000 | 301 392 | 203 |
| 1.887 | 9.981 083 709 791 | 150 938 392 | 301 189 | 201 |
| 1.888 | 9.981 234 648 183 | 151 239 581 | 300 988 | 202 |
| 1.889 | 9.981 385 887 764 | 151 540 569 | 300 786 | 201 |
| 1.890 | 9.981 537 428 333 | 151 841 355 | 300 585 | 203 |
| 1.891 | 9.981 689 269 688 | 152 141 940 | 300 382 | 199 |
| 1.892 | 9.981 841 411 628 | 152 442 322 | 300 183 | 202 |
| 1.893 | 9.981 993 853 950 | 152 742 505 | 299 981 | 200 |
| 1.894 | 9.982 146 596 455 | 153 042 486 | 299 781 | 200 |
| 1.895 | 9.982 299 638 941 | 153 342 267 | 299 581 | 200 |
| 1.896 | 9.982 452 981 208 | 153 641 848 | 299 381 | 201 |
| 1.897 | 9.982 606 623 056 | 153 941 229 | 299 180 | 197 |
| 1.898 | 9.982 760 564 285 | 154 240 409 | 298 983 | 202 |
| 1.899 | 9.982 914 804 694 | 154 539 392 | 298 781 | 196 |
| 1.900 | 9.983 069 344 086 | 154 838 173 | 298 585 | 201 |
| 1.901 | 9.983 224 182 259 | 155 136 758 | 298 384 | 197 |
| 1.902 | 9.983 379 319 017 | 155 435 142 | 298 187 | 199 |
| 1.903 | 9.983 534 754 159 | 155 733 329 | 297 988 | 197 |
| 1.904 | 9.983 690 487 488 | 156 031 317 | 297 791 | 199 |
| 1.905 | 9.983 846 518 805 | 156 329 108 | 297 592 | 196 |
| 1.906 | 9.984 002 847 913 | 156 626 700 | 297 396 | 198 |
| 1.907 | 9.984 159 474 613 | 156 924 096 | 297 198 | 195 |
| 1.908 | 9.984 316 398 709 | 157 221 294 | 297 003 | 199 |
| 1.909 | 9.984 473 620 003 | 157 518 297 | 296 804 | 196 |
| 1.910 | 9.984 631 138 300 | 157 815 101 | 296 608 | 195 |
| 1.911 | 9.984 788 953 401 | 158 111 709 | 296 413 | 197 |
| 1.912 | 9.984 947 065 110 | 158 408 122 | 296 216 | 195 |
| 1.913 | 9.985 105 473 232 | 158 704 338 | 296 021 | 195 |
| 1.914 | 9.985 264 177 570 | 159 000 359 | 295 826 | 196 |
| 1.915 | 9.985 423 177 929 | 159 296 185 | 295 630 | 194 |
| 1.916 | 9.985 582 474 114 | 159 591 815 | 295 436 | 195 |
| 1.917 | 9.985 742 065 929 | 159 887 251 | 295 241 | 194 |
| 1.918 | 9.985 901 953 180 | 160 182 492 | 295 047 | 195 |
| 1.919 | 9.986 062 135 672 | 160 477 539 | 294 852 | 193 |
| 1.920 | 9.986 222 613 211 | 160 772 391 | 294 659 | 194 |

Digitized by Google

| $a$ | $\log \Gamma(a)$ | diff I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1.921 | 9.986 383 385 602 | 161 067 050 | 294 465 | 193 |
| 1.922 | 9.986 544 452 652 | 161 361 515 | 294 272 | 193 |
| 1.923 | 9.986 705 814 167 | 161 655 787 | 294 079 | 194 |
| 1.924 | 9.986 867 469 954 | 161 949 866 | 293 885 | 191 |
| 1.925 | 9.987 029 419 820 | 162 243 751 | 293 694 | 194 |
| 1.926 | 9.987 191 663 571 | 162 537 445 | 293 500 | 191 |
| 1.927 | 9.987 354 201 016 | 162 830 945 | 293 309 | 192 |
| 1.928 | 9.987 517 031 961 | 163 124 254 | 293 117 | 192 |
| 1.929 | 9.987 680 156 215 | 163 417 371 | 292 925 | 192 |
| 1.930 | 9.987 843 573 586 | 163 710 296 | 292 733 | 189 |
| 1.931 | 9.988 007 283 882 | 164 003 029 | 292 544 | 194 |
| 1.932 | 9.988 171 286 911 | 164 295 573 | 292 350 | 188 |
| 1.933 | 9.988 335 582 484 | 164 587 923 | 292 162 | 191 |
| 1.934 | 9.988 500 170 407 | 164 880 085 | 291 971 | 191 |
| 1.935 | 9.988 665 050 492 | 165 172 056 | 291 780 | 190 |
| 1.936 | 9.988 830 222 548 | 165 463 836 | 291 590 | 188 |
| 1.937 | 9.988 995 686 384 | 165 755 426 | 291 402 | 192 |
| 1.938 | 9.989 161 441 810 | 166 046 828 | 291 210 | 187 |
| 1.939 | 9.989 327 488 638 | 166 338 038 | 291 023 | 191 |
| 1.940 | 9.989 493 826 676 | 166 629 061 | 290 832 | 187 |
| 1.941 | 9.989 660 455 737 | 166 919 893 | 290 645 | 189 |
| 1.942 | 9.989 827 375 630 | 167 210 538 | 290 456 | 188 |
| 1.943 | 9.989 994 586 168 | 167 500 994 | 290 268 | 189 |
| 1.944 | 9.990 162 087 162 | 167 791 262 | 290 079 | 188 |
| 1.945 | 9.990 329 878 424 | 168 081 341 | 289 891 | 186 |
| 1.946 | 9.990 497 959 765 | 168 371 232 | 289 705 | 188 |
| 1.947 | 9.990 666 330 997 | 168 660 937 | 289 517 | 187 |
| 1.948 | 9.990 834 991 934 | 168 950 454 | 289 330 | 188 |
| 1.949 | 9.991 003 942 388 | 169 239 784 | 289 142 | 185 |
| 1.950 | 9.991 173 182 172 | 169 528 926 | 288 957 | 187 |
| 1.951 | 9.991 342 711 098 | 169 817 883 | 288 770 | 185 |
| 1.952 | 9.991 512 528 981 | 170 106 653 | 288 585 | 187 |
| 1.953 | 9.991 682 635 634 | 170 395 238 | 288 398 | 187 |
| 1.954 | 9.991 853 030 872 | 170 683 636 | 288 211 | 185 |
| 1.955 | 9.992 023 714 508 | 170 971 847 | 288 026 | 185 |
| 1.956 | 9.992 194 686 355 | 171 259 873 | 287 841 | 184 |
| 1.957 | 9.992 365 946 228 | 171 547 714 | 287 657 | 185 |
| 1.958 | 9.992 537 493 942 | 171 835 371 | 287 472 | 184 |
| 1.959 | 9.992 709 329 313 | 172 122 843 | 287 288 | 185 |
| 1.960 | 9.992 881 452 156 | 172 410 131 | 287 103 | 184 |

Digitized by Google

| *a* | *log Γ(a)* | *diff I* | *II* | *III* |
|---|---|---|---|---|
| 1.961 | 9.993 053 862 287 | 172 697 234 | 286 919 | 184 |
| 1.962 | 9.993 226 559 521 | 172 984 153 | 286 735 | 183 |
| 1.963 | 9.993 399 543 674 | 173 270 888 | 286 552 | 184 |
| 1.964 | 9.993 572 814 562 | 173 557 440 | 286 368 | 183 |
| 1.965 | 9.993 746 372 002 | 173 843 808 | 286 185 | 183 |
| 1.966 | 9.993 920 215 810 | 174 129 993 | 286 002 | 183 |
| 1.967 | 9.994 094 345 803 | 174 415 995 | 285 819 | 182 |
| 1.968 | 9.994 268 761 798 | 174 701 814 | 285 637 | 182 |
| 1.969 | 9.994 443 463 612 | 174 987 451 | 285 455 | 182 |
| 1.970 | 9.994 618 451 063 | 175 272 906 | 285 273 | 182 |
| 1.971 | 9.994 793 723 969 | 175 558 179 | 285 091 | 182 |
| 1.972 | 9.994 969 282 148 | 175 843 270 | 284 909 | 180 |
| 1.973 | 9.995 145 125 418 | 176 128 179 | 284 729 | 183 |
| 1.974 | 9.995 321 253 597 | 176 412 908 | 284 546 | 179 |
| 1.975 | 9.995 497 666 505 | 176 697 454 | 284 367 | 182 |
| 1.976 | 9.995 674 363 959 | 176 981 821 | 284 185 | 181 |
| 1.977 | 9.995 851 345 780 | 177 266 006 | 284 004 | 178 |
| 1.978 | 9.996 028 611 786 | 177 550 010 | 283 826 | 181 |
| 1.979 | 9.996 206 161 796 | 177 833 836 | 283 645 | 181 |
| 1.980 | 9.996 383 995 632 | 178 117 481 | 283 464 | 177 |
| 1.981 | 9.996 562 113 113 | 178 400 945 | 283 287 | 182 |
| 1.982 | 9.996 740 514 058 | 178 684 232 | 283 105 | 177 |
| 1.983 | 9.996 919 198 290 | 178 967 337 | 282 928 | 181 |
| 1.984 | 9.997 098 165 627 | 179 250 265 | 282 747 | 176 |
| 1.985 | 9.997 277 415 892 | 179 533 012 | 282 571 | 181 |
| 1.986 | 9.997 456 948 904 | 179 815 583 | 282 390 | 176 |
| 1.987 | 9.997 636 764 487 | 180 097 973 | 282 214 | 180 |
| 1.988 | 9.997 816 862 460 | 180 380 187 | 282 034 | 176 |
| 1.989 | 9.997 997 242 647 | 180 662 221 | 281 858 | 179 |
| 1.990 | 9.998 177 904 868 | 180 944 079 | 281 679 | 177 |
| 1.991 | 9.998 358 848 947 | 181 225 758 | 281 502 | 176 |
| 1.992 | 9.998 540 074 705 | 181 507 260 | 281 326 | 179 |
| 1.993 | 9.998 721 581 965 | 181 788 586 | 281 147 | 174 |
| 1.994 | 9.998 903 370 551 | 182 069 733 | 280 973 | 179 |
| 1.995 | 9.999 085 440 284 | 182 350 706 | 280 794 | 175 |
| 1.996 | 9.999 267 790 990 | 182 631 500 | 280 619 | 176 |
| 1.997 | 9.999 450 422 490 | 182 912 119 | 280 443 | 176 |
| 1.998 | 9.999 633 334 609 | 183 192 562 | 280 267 | 176 |
| 1.999 | 9.999 816 527 171 | 183 472 829 | 280 091 | 175 |
| 2.000 | 9.000 000 000 000 | 183 752 920 | 279 916 | 175 |



Digitized by Google

Druck der Philipp Reclam'schen Officin in Leipzig.

Digitized by Google

# Berichtigungen.

Seite 5 Formel (8) statt $x^{\mu\ 1}$ l. $x^{\mu-1}$.
„ 8 „ (1) „ $dr =$ l. $dz =$.
„ 34 Zeile 3 v. u. statt $\int_0^\infty$ l. $\int_0^\alpha$.
„ 40 Formel (2) statt $3-\mu$ l. $3+\mu$.
Ebendas. sind Z. 8 v. u. zwischen „sich" und „unbestimmte Form" die Worte „unter die" einzuschalten.
„ 54 Z. 2 v. u. statt $+x^2$ l. $+Cx^2$.
„ 67 Formel (8) statt $(a+bi)x$ l. $-(a+bi)x$.
„ 102 Z. 8 v. o. statt $\Psi(a, \varkappa)$ l. $\Phi(a, \varkappa)$.
„ 103 Z. 5 v. o. statt $x+st$ l. $x=st$.
„ 109 Z. 7 v. o. statt $\varkappa$ l. 2.
„ 116 Formel (8) statt $\beta^2 x^2 \vartheta^2$ l. $\beta^2 \varkappa^2 \vartheta^2$.
„ 122 Z. 2 v. o. statt $\sin(b+a)$ u. $\sin(b-a)$ l. $\sin(b+a)t$ u. $\sin(b-a)t$.

Digitized by Google

Digitized by Google

# Analytische

# STUDIEN

von

**Dr. Oskar Schlömilch**

ausserordentlichem Professor an der Universität zu Jena.

---

## Zweite Abtheilung

enthaltend

die Fourier'schen Reihen und Integrale nebst deren wichtigsten Anwendungen.

---

*Leipzig.*

Verlag von Wilhelm Engelmann.

1848.

Digitized by Google

Digitized by Google

# Vorrede.

Es ist ein lange und sorgsam gepflegtes Schooskind meiner Musse, was ich mit dieser Schrift den Freunden feinerer mathematischer Untersuchungen übergebe. Sie enthält die, so weit es mir möglich war, vollständige Darstellung zweier Theorieen, deren hohe wissenschaftliche Bedeutung und vielseitige praktische Anwendbarkeit schon länger die Aufmerksamkeit der Mathematiker auf sich gezogen haben. Aber eben das Interesse, womit man sie betrachtete, hat auch eine wahre Unzahl von Erörterungen über diesen und jenen einzelnen Punkt aus ihnen hervorgerufen, so dass es heut zu Tage schon einige Mühe und Zeit kostet, um durch das reiche in Zeitschriften und Spezialabhandlungen zerstreute Material hindurch zu dringen. Diese Bemerkung einerseits und der Umstand andererseits, dass die jetzt schon etwas veralteten Quellen jener Lehren (Légendre, *théorie des fonctions elliptiques et des intégrales Eulériennes*, und Fourier, *théorie de la chaleur*) wegen ihrer Kostspieligkeit nur wenig verbreitet sind, und neuere umfassende Arbeiten darüber gar nicht existiren, liessen es nicht unpassend erscheinen, eine Darstellung zu geben, welche dem Meister als Hand- und Nachschlagebuch, dem Anfänger aber als Lehrbuch dienen könnte. Um den letzteren Zweck, ohne Störung des ersten, zu erreichen, habe ich alles Das, was nicht als unmittelbar aus den ersten Elementen des höheren Calcüls bekannt vorausgesetzt werden durfte, in den Noten

Digitized by Google

hinreichend erläutert. Um auch die Bedürfnisse des praktischen Rechners zu befriedigen, sind die nöthigen Zahlentafeln, nebst einer Anleitung zu ihrem Gebrauche, beigegeben worden. Uebrigens wird man vorliegende Schrift nicht blos für eine bunte Zusammenstellung der Arbeiten Anderer ansehen dürfen; das Streben nach Einheit der Form und Strenge der Entwickelung nöthigte mich oft zu Abweichungen vom gewöhnlichen Gedankengange; dass ich aber auch materiell Neues in ziemlich reichem Maasse mittheile, wird man ohne Mühe finden. Besonders erlaube ich mir in dieser Beziehung auf die am Ende des zweiten Heftes auseinander gesetzte Methode zur Reduktion vielfacher Integrale aufmerksam zu machen, die mit überraschender Leichtigkeit auf solche Integrale anwendbar ist, in denen eine willkührliche Funktion sämmtlicher Variabelen vorkommt.

Jena, im September 1847.

**Schlömilch.**

Digitized by Google

# Inhalt zur ersten Abtheilung.


Seite.

Theorie der Gammafunktionen . . . . . 1

Cap. I. Die Fundamentaleigenschaften der Gammafunktionen . . . . . 2

Cap. II. Die Addition und Multiplikation der Gammafunktionen . . . . 19

Cap. III. Reihen und Produkte zur Berechnung der Gammafunktionen . . 39

Cap. IV. Die wichtigsten unter den durch Gammafunktionen ausdrückbaren Integrale . . . . . 59

Cap. V. Reihen, welche mit Hülfe der Gammafunktionen summirt werden können . . . . . 141

Berechnung und Gebrauch der Gammafunktionentafel . . . . . 163

Tafel der Logarithmen der Gammafunktionen von 1.000 bis 2.000 . . . 183


Digitized by Google

# Inhalt zur zweiten Abtheilung.


Seite.

Cap. I. Die Fourier'schen Reihen . . . . . 3

Cap. II. Die Fourier'schen Integrale . . . . . 72

Anhang . . . . . 196


Digitized by Google

# Theorie

der

# Fourier'schen Reihen und Integrale.

---



Digitized by Google

## Cap. I.

### *Die Fourier'schen Reihen.*

Unter der grossen Zahl rein analytischer Probleme, auf welche man bei den physikalischen Anwendungen des höheren Calcüls hingewiesen worden ist, befindet sich auch das: eine beliebige Funktion einer einzigen Variablen in eine nach den Cosinus oder Sinus der Vielfachen jener Veränderlichen fortschreitende Reihe zu verwandeln, und man weiss, welche bedeutende Rolle diese Aufgabe in der Untersuchung über die Gestalt schwingender Saiten bei Lagrange und in Fourier's mathematischer Theorie der Wärme gespielt hat. Dass man in der That sehr leicht auf das genannte Problem stossen kann und zwar namentlich bei der Integration gewisser partieller Differenzialgleichungen, möge das folgende, wenn auch sehr einfache, doch hinreichend allgemeine Beispiel zeigen, dessen Anschaulichkeit den Sinn jener Aufgabe recht gut zu erläutern im Stande ist. Es sei zwischen zwei bestimmten Punkten eine materielle krumme Linie einfacher Krümmung, also etwa ein schlaffes irgendwie gekrümmtes Seil, gegeben, ein beliebiger Punkt desselben durch die Coordinaten $x$, $y$ und die Gestalt der Curve durch die Gleichung $y = f(x)$ bestimmt. Lassen wir auf alle Punkte der materiellen Linie Kräfte wirken, welche eine Veränderung ihrer Gestalt hervorrufen, so werden nach der Zeit $t$ etwa $x$ und $u$ die Coordinaten irgend eines Punktes der Curve sein, wobei $u$ eine noch zu bestimmende Funktion von $x$ und $t$ bildet. Um nun einen speziellen Fall vor Augen zu haben, wollen wir annehmen, dass man mit Hülfe mechanischer Betrachtungen gefunden habe, es müsse $u$ die partielle Differenzialgleichung

$$\frac{du}{dt} = a\frac{du}{dx}$$

Digitized by Google

erfüllen, in welcher $a$ eine constante Grösse bezeichnet. (Natürlich kommt es hier gar nicht darauf an, ob es überhaupt solche Kräfte giebt oder nicht, bei welchen die Regeln der Mechanik zu der obigen Differenzialgleichung führen würden.) Will man dieselbe integriren, d. h. $u$ als Funktionen von $x$ und $t$ bestimmen, so kann man sich des bekannten einfachen Verfahrens bedienen, wonach man ihr allgemeines Integral aus den partikulären Integralen derselben zusammensetzt. Nun übersieht man aber leicht, dass $u = A\cos m(x + at)$, worin $A$ und $m$ willkührliche Constanten sind, die Differenzialgleichung befriedigt und hieraus folgt sogleich, dass dieselbe auch durch den allgemeineren Ausdruck

$$u = A_0 + A_1 \cos(x + at) + A_2 \cos 2(x + at) + \ldots$$

erfüllt wird, weil jeder einzelne Bestandtheil desselben ihr genügt. Soll aber diese Auflösung allgemein sein, so muss sie uns für $t = 0$ auf den ursprünglichen Zustand der Curve, der durch die Gleichung $y = f(x)$ charakterisirt wurde, zurückführen, d. h. es müssen die bisher noch willkührlichen Constanten $A_0$, $A_1$, $A_2$, etc. so bestimmt werden, dass für $t = 0$ das obige $u$ in $y$ übergeht, also

$$f(x) = A_0 + A_1 \cos x + A_2 \cos 2x + \ldots. \qquad (1)$$

wird, was in Zeichen das Nämliche ist, wie die früher in Worten ausgesprochene Aufgabe. — Wäre man dagegen von der partikulären Auflösung $u = B\sin m(x + at)$ ausgegangen, so würde man auf die Forderung gekommen sein, $B_1$, $B_2$, $B_3$, etc. so zu bestimmen, dass

$$f(x) = B_1 \sin x + B_2 \sin 2x + B_3 \sin 3x + \ldots \qquad (2)$$

wird, welche der vorigen ganz analog ist. — Aus der Fassung der ganzen Aufgabe gehen übrigens noch einige Bemerkungen hinsichtlich der Natur der Funktion $f(x)$ und der Art der Auflösung hervor, die für das Folgende von Wichtigkeit sind. Da nämlich von der in Rede stehenden Curve nur diejenige Partie betrachtet wird, welche zwischen zwei bestimmten Punkten, denen etwa die Abscissen $\alpha$ und $\beta$ entsprechen mögen, enthalten ist, so versteht sich von selbst, dass wir die oben ausgesprochenen Aufgaben gar nicht im Allgemeinen, d. h. für alle möglichen $x$, sondern nur so zu lösen haben, dass die Gleichungen (1) und (2) für alle die Werthe von $x$ bestehen, welche in das Intervall $x = \alpha$ bis $x = \beta$ fallen; ferner ist klar, dass jedem bestimmten

Digitized by Google

$x$ zwischen $a$ und $\beta$ nur ein einziges $y$ entsprechen darf, dass wir also immer nur einen Zweig der Curve $y = f(x)$ auf einmal betrachten werden, wenn mehrere solche Zweige vorhanden sein sollten, und endlich müssen wir die krumme Linie als eine während des Intervalles $x = a$ bis $x = \beta$ ununterbrochen fortlaufende, d. h. als eine stetige voraussetzen. Damit ist aber nicht gesagt, dass $y$ immer nach einem und dem nämlichen Gesetze von $x$ abhängig sei und wir können daher immerhin annehmen, dass in verschiedenen Theilen jenes Intervalles $y$ auf verschiedene Weise aus $x$ gebildet, also z. B. die Curve aus einem parabolischen und einem cykloidalischen Bogen etc. zusammengesetzt sei, wenn nur diese verschiedenen Stücke ohne Unterbrechung aneinander gereiht sind. Ja, was noch mehr ist, wir haben gar nicht einmal nöthig, eine mathematisch ausdrückbare Abhängigkeit des $y$ von $x$ überhaupt nur vorauszusetzen, denn es wäre möglich, dass man durch einen beliebigen ganz regellosen Zug eine innerhalb des Intervalles $x = a$ bis $x = \beta$ zusammenhängende Curve zu Stande gebracht hätte, die sich durch keine mathematische Funktion $y = f(x)$ ausdrücken liesse. Wir verstehen demnach im Folgenden unter der Gleichung $y = f(x)$ weiter nichts, als dass jedem bestimmten $x$ zwischen $a$ und $\beta$ ein bestimmtes endliches $y$ entspricht, gleichviel wo man das Letztere herbekommen hat.

## §. 1.

Wenn überhaupt eine Lösung der in den Gleichungen

$$f(x) = A_0 + A_1 \cos x + A_2 \cos 2x + A_3 \cos 3x + \ldots \quad (1)$$

$$f(x) = B_1 \sin x + B_2 \sin 2x + B_3 \sin 3x + \ldots \quad (2)$$

ausgesprochenen Aufgaben möglich sein soll, so kann dieselbe sicher nur innerhalb eines gewissen Intervalles für $x$ existiren. Bezeichnen wir nämlich die Summen der Reihen rechts, ganz abgesehen von der links stehenden willkührlichen Funktion, mit $\Phi(x)$ und $\Psi(x)$, so erhellt auf der Stelle die Richtigkeit der Gleichungen:

$$\Phi(-x) = \Phi(x), \quad \Phi(\pi+x) = \Phi(\pi-x), \quad \Phi(2\pi+x) = \Phi(2\pi-x), \text{ etc.}$$

$$\Psi(-x) = -\Psi(x), \quad \Psi(x) = \Psi(2\pi+x) = \Psi(4\pi+x), \text{ etc.}$$

mit einem Worte, die Funktionen $\Phi(x)$ und $\Psi(x)$ haben ganz die

Digitized by Google

Eigenschaften wie ein Ausdruck von der Form $\cos mx$ oder $\sin mx$, wenn $m$ darin eine ganze positive Zahl bedeutet; besitzt nun $f(x)$ nicht dieselben Eigenschaften — und diess setzen wir natürlich nicht voraus —, so können die Gleichungen (1) und (2) höchstens innerhalb eines gewissen Intervalles bestehen, und namentlich geht aus den Eigenschaften $\Phi(-x) = \Phi(x)$, $\Phi(\pi + x) = \Phi(\pi - x)$ hervor, dass zwischen $f(x)$ und $\Phi(x)$ über die Gränzen $x = 0$ und $x = \pi$ hinaus im Allgemeinen keine Identität mehr stattfinden kann. Ebenso leicht übersieht man, dass wegen $\Psi(-x) = -\Psi(x)$, $\Psi(0) = 0$, $\Psi(\pi) = 0$ die Gleichung $f(x) = \Psi(x)$ höchstens für alle zwischen 0 und $\pi$ fallende Werthe, aber weder für $x \leqq 0$ noch für $x \geqq \pi$ Bestand haben kann.

Gesetzt nun, man wüsste, dass die Auflösung unserer Aufgaben für alle innerhalb des Intervalles $x = 0$ bis $x = \pi$ liegenden Werthe von $x$ möglich sei, so würde es sehr leicht sein, die Werthe der noch unbestimmten Coeffizienten $A$ und $B$ aufzufinden. Handelte es sich z. B. um den Werth von $A_n$ in der Gleichung

$$f(x) = A_0 + A_1 \cos x + A_2 \cos 2x + \ldots + A_n \cos nx + \ldots$$

so multiplizire man die ganze Gleichung mit $2\cos nx$ und zerlege jedes Cosinusprodukt in eine Cosinussumme; es wird so

$$\begin{aligned} 2f(x)\cos mx = 2A_0 \cos mx &+ A_1\left[\cos(m-1)x + \cos(m+1)x\right] \\ &+ A_2\left[\cos(m-2)x + \cos(m+2)x\right] \\ &+ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ &+ A_n\left[1 + \cos 2nx\right] \\ &+ A_{n+1}\left[\cos x + \cos(2n+1)x\right] \\ &+ A_{n+2}\left[\cos 2x + \cos(2n+2)x\right] \\ &+ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \end{aligned}$$

Erinnert man sich nun, dass für jedes ganze positive $m$

$$\int_0^\pi \cos mx\, dx = 0$$

ist, so erhellt auf der Stelle, dass man hier alle Glieder mit Ausnahme von $A_n \cdot 1$ wegschaffen kann, wenn man die ganze Gleichung mit $dx$

Digitized by Google

multiplizirt und darauf innerhalb der Gränzen $x = 0$ und $x = \pi$ integrirt *), was natürlich stillschweigend voraussetzt, dass bei dieser Ausdehnung des $x$ die Existenz der ganzen Gleichung nicht aufhört. Es folgt jetzt

$$2\int_0^\pi f(x)\cos nx\,dx = A_n\int_0^\pi dx$$

oder

$$A_n = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\cos nx\,dx\,. \qquad (3)$$

Diese Bestimmung ändert sich nur in dem Falle $n = 0$ etwas; multiplizirt man da die Gleichung (1) blos mit $dx$ und integrirt ebenso wie vorher; so wird

$$A_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(x)\,dx$$

---

*) Man könnte für den ersten Augenblick glauben, dass die hier postulirte Integration mit der Eingangs vorausgesetzten Regellosigkeit von $f(x)$ in Widerspruch stehe, indem man sagte, wer überhaupt ein Integral von der Form

$$\int_a^b \varphi(x)\,dx = \psi(b) - \psi(a)$$

bestimmen will, setzt voraus, dass es eine Funktion $\psi(x)$ gebe, welche wenigstens innerhalb des Intervalles $x = a$ bis $x = b$ die Eigenschaft

$$\frac{d\psi(x)}{dx} = \varphi(x)$$

besitzt und demnach doch mathematisch ausdrückbar scheint. Hierauf ist die ganz einfache Antwort: die obige Definition des bestimmten Integrales ist eine indirekte, wie auch die des unbestimmten Integrales, und eben deswegen die untergeordnetere; die direkte und allgemeinere Definition aber erklärt das bestimmte Integral für die Fläche, welche von der Curve, deren Gleichung $y = \varphi(x)$ ist, dem Stücke $b - a$ der Abscissenachse und den Ordinaten $a$, $b$ begränzt wird. Diese letztere Definition passt auf alle noch so regellosen Funktionen $\varphi(x)$ oder Curven und liegt der ganzen obigen Betrachtung zu Grunde.

Digitized by Google

also $A_0$ nur der Hälfte desjenigen Werthes gleich, den die Formel (3) für $n = 0$ geben würde. Wir können demnach auch schreiben:

$$\left.\begin{aligned} f(x) &= \tfrac{1}{2}A_0 + A_1 \cos x + A_2 \cos 2x + \ldots . \\ A_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos nx\, dx. \end{aligned}\right\} \quad (4)$$

Ebenso leicht ergiebt sich aus der Gleichung (2), wenn man dieselbe mit $2 \sin nx\, dx$ multiplizirt und zwischen denselben Gränzen integrirt,

$$\left.\begin{aligned} f(x) &= B_1 \sin x + B_2 \sin 2x + B_3 \sin 3x + \ldots \\ B_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x) \sin nx\, dx\,. \end{aligned}\right\} \quad (5)$$

So kurz diese Bestimmung der unbekannten Coeffizienten ist, so ungenügend ist sie auch, sowohl in formeller als materieller Hinsicht. Einerseits nämlich ruht die ganze Rechnung auf einer durch nichts begründeten Voraussetzung, die wir schon genannt haben, andererseits lässt dieselbe noch Fragen unbeantwortet, ohne deren Erledigung die ganze Auflösung nur eine halbe bleibt; so wissen wir z. B. noch nichts über die Anzahl der Reihenglieder, woran sich, wenn dieselbe unendlich gross werden sollte, wieder die Frage nach der Convergenz der gefundenen Reihen knüpft; ferner ist uns unbekannt, was aus der Gleichung (4) wird, wenn man darin $x = 0$ oder $x = \pi$ setzt; es wäre nämlich recht gut möglich, dass die genannte Formel für diese Werthe noch Bestand hätte, was offenbar in der darauf folgenden nicht stattfindet, wenn nicht zufälligerweise $f(0) = f(\pi) = 0$ ist.

Alle diese Fragen lassen sich mit der grössten Vollständigkeit und Sicherheit erledigen, wenn man die Aufgabe selbst umkehrt, und statt von der Reihenentwickelung für $f(x)$ auszugehen, eine Summirung der formell bereits bestimmten Reihe versucht. Substituiren wir nämlich für die einzelnen Coeffizienten ihre Werthe, nehmen jede der Reihen als eine endliche und abstrahiren ganz von der jedesmaligen linken Seite der Gleichungen (4) und (5), so käme es offenbar blos darauf an, die Summen der Reihen:

Digitized by Google

$$\tfrac{1}{2}\int_0^\pi f(x)\,dx + \cos x \int_0^\pi f(x)\cos x\,dx + \cos 2x \int_0^\pi f(x)\cos 2x\,dx + \ldots$$

$$\ldots + \cos nx \int_0^\pi f(x)\cos nx\,dx$$

$$\sin x \int_0^\pi f(x)\sin x\,dx + \sin 2x \int_0^\pi f(x)\sin 2x\,dx + \ldots$$

$$\ldots + \sin nx \int_0^\pi f(x)\sin nx\,dx$$

zu finden. Diese Reihen lassen sich leicht in eine sehr bequeme Form bringen, wenn man, um Verwechselung zu verhüten, statt des $x$, wonach integrirt wird, einen anderen Buchstaben, etwa $t$, braucht, dann die Faktoren $\cos x$, $\cos 2x$, etc. $\sin x$, $\sin 2x$, etc., welche für die Integrationen constant sind, unter die Integralzeichen steckt und zuletzt alle Integrale in ein einziges zusammenzieht, was wegen der gleichen Integrationsgränzen sehr leicht ist. Die obigen Reihen nehmen dann folgende Gestalt an:

$$\int_0^\pi f(t)\left[\tfrac{1}{2} + \cos x\cos t + \cos 2x\cos 2t + \ldots + \cos nx\cos nt\right]dt \quad (6)$$

$$\int_0^\pi f(t)\left[\sin x\sin t + \sin 2x\sin 2t + \ldots + \sin nx\sin nt\right]dt. \quad (7)$$

Zerlegt man jedes Cosinus- oder Sinusprodukt, so findet man

$$\begin{aligned}
&\tfrac{1}{2} + \cos x\cos t + \cos 2x\cos 2t + \ldots + \cos nx\cos nt\\
&\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\left[\cos(x-t) + \cos 2(x-t) + \ldots + \cos n(x-t)\right]\\
&\quad + \tfrac{1}{2}\left[\cos(x+t) + \cos 2(x+t) + \ldots + \cos n(x+t)\right]
\end{aligned}$$

und ähnlich

$$\begin{aligned}
&\sin x\sin t + \sin 2x\sin 2t + \ldots + \sin nx\sin nt\\
&= \tfrac{1}{2}\left[\cos(x-t) + \cos 2(x-t) + \ldots + \cos n(x-t)\right]\\
&- \tfrac{1}{2}\left[\cos(x+t) + \cos 2(x+t) + \ldots + \cos n(x+t)\right]
\end{aligned}$$



Digitized by Google

und jede dieser Reihen lässt sich leicht summiren, wenn man die bekannte Formel *)

$$\cos u + \cos 2u + \ldots + \cos nu = -\tfrac{1}{2} + \frac{\sin(2n+1)\frac{u}{2}}{2\sin\frac{u}{2}} \qquad (8)$$

in Anwendung bringt. Man findet dann

$$\left.\begin{aligned} &\tfrac{1}{2} + \cos x\cos t + \cos 2x\cos 2t + \ldots + \cos nx\cos nt \\ &= \frac{\sin(2n+1)\frac{x-t}{2}}{4\sin\frac{x-t}{2}} + \frac{\sin(2n+1)\frac{x+t}{2}}{4\sin\frac{x+t}{2}} \end{aligned}\right\} \qquad (9)$$

$$\left.\begin{aligned} &\sin x\sin t + \sin 2x\sin 2t + \ldots + \sin nx\sin nt \\ &= \frac{\sin(2n+1)\frac{x-t}{2}}{4\sin\frac{x-t}{2}} - \frac{\sin(2n+1)\frac{x+t}{2}}{4\sin\frac{x+t}{2}}. \end{aligned}\right\} \qquad (10)$$

Die Summen der Reihen (6) und (7) erhält man also aus:

$$\tfrac{1}{4}\int_0^\pi f(t)\frac{\sin(2n+1)\frac{x-t}{2}}{\sin\frac{x-t}{2}}dt \pm \tfrac{1}{4}\int_0^\pi f(t)\frac{\sin(2n+1)\frac{x+t}{2}}{\sin\frac{x+t}{2}}dt \qquad (11)$$

je nachdem man das obere oder untere Zeichen nimmt. Man übersieht nun gleich, dass wenn der Werth hiervon in ein bloses $f(x)$ übergehen soll, wie diess sein müsste, wenn die Gleichungen (4) und (5) wirklich richtig wären, $n$ keine endliche Grösse sein kann, weil sonst eine Funktion von $x$ und $n$, aber nicht von $x$ allein herauskäme. Wir

*) Man überzeugt sich von ihrer Richtigkeit leicht durch beiderseitige Multiplikation mit $2\sin\frac{u}{2}$ und nachherige Zerlegung jedes Produktes links in eine Sinusdifferenz.

Digitized by Google

werden hier also auf das Problem hingewiesen, den Gränzwerth zu bestimmen, welchem sich ein Integral von der Form

$$\int_0^\pi \frac{\sin(2n+1)\frac{x+t}{2}}{\sin\frac{x+t}{2}} f(t)\,dt$$

für unausgesetzt wachsende $n$ oder $2n+1$ nähert. Setzen wir zur Abkürzung $2n+1=k$, $\frac{x+t}{2}=t'$, wo $t'$ die neue Variable ist, so stellt sich unser Integral unter die allgemeine Form

$$\int_a^b \frac{\sin kt'}{\sin t'} f\left[\pm(2t'-x)\right] dt'$$

oder wenn wir $\frac{1}{\sin t'} f\left[\pm(2t'-x)\right]$, in so fern diese Grösse von $t'$ abhängt, mit $\varphi(t')$ bezeichnen, unter die folgende:

$$\int_a^b \sin kt'\,\varphi(t')\,dt'.$$

Es kommt nun, wie man hieraus ersieht, blos darauf an, den Gränzwerth zu finden, gegen welchen ein Integral von der Form

$$\int_a^b f(t)\sin kt\,dt$$

für unendlich wachsende $k$ convergirt, wobei wir $k$ als eine ganz beliebige Grösse und $b>a$ voraussetzen wollen.

## §. 2.

Die soeben ausgesprochene Aufgabe lässt sich auf die folgende sehr einfache Weise lösen. Wir führen zunächst eine neue Veränderliche $z$ der Art ein, dass $z=kt$ oder $t=\frac{z}{k}$ ist; es wird dann

$$\int_a^b f(t)\sin kt\,dt = \frac{1}{k}\int_{ak}^{bk} f\left(\frac{z}{k}\right)\sin z\,dz. \qquad (1)$$

Digitized by Google

Unter den Vielfachen der Ludolph'schen Zahl, also unter den Grössen $\pi$, $2\pi$, $3\pi$ etc., giebt es nun ganz sicher eines, welches nächst grösser als $ak$, und eines, welches nächst kleiner als $bk$ ist, oder mit anderen Worten, wenn $m$ und $n$ ein paar ganze Zahlen bedeuten, so kann man dieselben immer so bestimmen, dass $ak$ zwischen $(m-1)\pi$ und $m\pi$, ebenso $bk$ zwischen $n\pi$ und $(n+1)\pi$ fällt; wir dürfen daher

$$ak = m\pi - \alpha, \quad bk = n\pi + \beta \tag{2}$$

setzen, wo $\alpha$ und $\beta$ Grössen sind, welche immer zwischen 0 und $\pi$ liegen. Das nach $z$ genommene Integral umfasst jetzt das Intervall $m\pi - \alpha$ bis $n\pi + \beta$ und wenn wir dieses letzere in drei andere von $m\pi - \alpha$ bis $m\pi$, von $m\pi$ bis $n\pi$ und von $n\pi$ bis $n\pi + \beta$ zerlegen, so zerfällt unser Integral in 3 andere, nämlich

$$\left.\begin{aligned} \int_a^b f(t)\sin kt\,dt &= \frac{1}{k}\int_{m\pi-\alpha}^{n\pi+\beta} f\left(\frac{z}{k}\right)\sin z\,dz \\ = \frac{1}{k}\int_{m\pi-\alpha}^{m\pi} f\left(\frac{z}{k}\right)\sin z\,dz &+ \frac{1}{k}\int_{m\pi}^{n\pi} f\left(\frac{z}{k}\right)\sin z\,dz + \frac{1}{k}\int_{n\pi}^{n\pi+\beta} f\left(\frac{z}{k}\right)\sin z\,dz \end{aligned}\right\} \tag{3}$$

die wir jetzt einzeln betrachten wollen.

Im ersten Integrale setzen wir $z = m\pi - x$, woraus $\sin z = \cos m\pi \sin x$ und $dz = -dx$ folgt. Die Integrationsgränzen für $z$ bestimmen sich jetzt aus den Gleichungen $z = m\pi - m\pi$, $z = m\pi - (m\pi - \alpha)$ sind also $z = 0$ und $z = \alpha$. Das Integral geht hierdurch in

$$-(-1)^m \frac{1}{k}\int_a^0 f\left(\frac{m\pi - x}{k}\right)\sin x\,dx$$

über, oder, wenn wir die Integrationsgränzen vertauschen, also dem Integrale das entgegengesetzte Vorzeichen geben und statt $m\pi$ seinen Werth $ak + \alpha$ setzen,

$$(-1)^m \int_0^\alpha \frac{1}{k} f\left(a + \frac{\alpha - x}{k}\right)\sin x\,dx. \tag{4}$$

Digitized by Google

Es ist nun leicht zu sehen, dass sich dieses Integral für unendlich wachsende $k$ der Gränze Null nähert, wenn für unbegränzt abnehmende $\delta$ überhaupt

$$Lim\left[\delta f(a+\delta)\right] = 0$$

ist; denn in diesem Falle haben wir auch

$$Lim\left[\frac{a-x}{k} f(a+\frac{a-x}{k})\right] = 0$$

und um so mehr

$$Lim\left[\frac{1}{k} f(a+\frac{a-x}{k})\right] = 0$$

weil $k$ unendlich wächst, $a$ und $x$ aber immer endliche Grössen bleiben, nämlich $a < \pi$ nach dem Früheren und $x < a$ vermöge der Integrationsgränzen in (4). Da nun das genannte Integral mit dem ersten auf der rechten Seite in (4) vorkommenden identisch ist, so haben wir

$$\left.\begin{aligned} &Lim\,\frac{1}{k}\int_{m\pi-a}^{m\pi} f\left(\frac{z}{k}\right)\sin z\,dz = 0 \\ &\text{wenn} \qquad Lim\left[\delta f(a+\delta)\right] = 0\,. \end{aligned}\right\} \quad (5)$$

Setzen wir ferner in dem dritten Integrale in Nr. (3) $z = n\pi + x$, so geht dasselbe in

$$\frac{(-1)^n}{k}\int_0^\beta f\left(\frac{n\pi+x}{k}\right)\sin x\,dx = (-1)^n\int_0^\beta \frac{1}{k} f\left(b-\frac{\beta-x}{k}\right)\sin x\;dx$$

über und wenn $Lim\left[\delta f(b-\delta)\right] = 0$ ist, für unbegränzt abnehmende $\delta$, so hat man auch

$$Lim\left[\frac{\beta-x}{k} f(b-\frac{\beta-x}{k})\right] = 0\,, \quad Lim\left[\frac{1}{k} f(b-\frac{\beta-x}{k})\right] = 0$$

woraus folgt, dass das in Rede stehende Integral gegen die Gränze Null convergirt. Es ist demnach:

Digitized by Google

$$\left.\begin{array}{l} Lim\ \frac{1}{k}\int_{n\pi}^{n\pi+\beta} f\left(\frac{z}{k}\right)\sin z\,dz = 0 \\ \text{wenn} \qquad Lim\left[\delta f(b-\delta)\right] = 0\,. \end{array}\right\} \quad (6)$$

Gehen wir jetzt in Nr. (3) zur Gränze für wachsende $k$ über und setzen voraus, dass die in Nr. (5) und (6) aufgestellten Bedingungen gleichzeitig stattfinden, so ist

$$\left.\begin{array}{l} Lim\int_a^b f(t)\sin kt\,dt = Lim\ \frac{1}{k}\int_{m\pi}^{n\pi} f\left(\frac{z}{k}\right)\sin z\,dz \\ Lim\left[\delta f(a+\delta)\right] = 0\,, \quad Lim\left[\delta f(b-\delta)\right] = 0\,. \end{array}\right\} \quad (7)$$

Zerlegen wir das von $m\pi$ bis $n\pi$ sich erstreckende Integral in eine Partie andere, welche der Reihe nach die Intervalle $m\pi$ bis $(m+1)\pi$, $(m+1)\pi$ bis $(m+2)\pi$, ... $(n-1)\pi$ bis $n\pi$ umfassen, so ist:

$$\int_{m\pi}^{n\pi} f\left(\frac{z}{k}\right)\sin z\,dz =$$

$$\int_{m\pi}^{(m+1)\pi} f\left(\frac{z}{k}\right)\sin z\,dz + \int_{(m+1)\pi}^{(m+2)\pi} f\left(\frac{z}{k}\right)\sin z\,dz + \int_{(m+2)\pi}^{(m+3)\pi} f\left(\frac{z}{k}\right)\sin z\,dz + \ldots.$$

$$\ldots. + \int_{(n-2)\pi}^{(n-1)\pi} f\left(\frac{z}{k}\right)\sin z\,dz + \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} f\left(\frac{z}{k}\right)\sin z\,dz\,.$$

Setzt man im ersten Integrale $z = m\pi + x$, im zweiten $z = (m+1)\pi + x$, im dritten $z = (m+2)\pi + x$, ... endlich im letzten $z = (n-1)\pi + x$, so findet man sehr leicht:

Digitized by Google

$$\int_{m\pi}^{n\pi} f\left(\frac{z}{k}\right) \sin z \, dz =$$

$$(-1)^m \int_0^{\pi} f\left(\frac{m\pi + x}{k}\right) \sin x \, dx + (-1)^{m+1} \int_0^{\pi} f\left(\frac{(m+1)\pi + x}{k}\right) \sin x \, dx$$

$$+ (-1)^{m+2} \int_0^{\pi} f\left(\frac{(m+2)\pi + x}{k}\right) \sin x \, dx + \ldots.$$

$$\ldots. + (-1)^{n-1} \int_0^{\pi} f\left(\frac{(n-1)\pi + x}{k}\right) \sin x \, dx.$$

Die Gleichheit der Integrationsgränzen lässt hier eine Zusammenfassung aller Integrale in ein einziges Integral zu, nämlich

$$\int_{m\pi}^{n\pi} f\left(\frac{z}{k}\right) \sin z \, dz = \tag{8}$$

$$(-1)^m \int_0^{\pi} \left\{ f\left(\frac{m\pi + x}{k}\right) - f\left(\frac{(m+1)\pi + x}{k}\right) + \ldots. \right.$$

$$\left. \ldots. + (-1)^{m+n-1} f\left(\frac{(n-1)\pi + x}{k}\right) \right\} \sin x \, dx.$$

Wir wollen nun zunächst voraussetzen, dass die Funktion $f(t)$ von $t = a$ bis $t = b$ beständig abnehme, ohne jedoch negativ zu werden. Sind dann $u$ und $v$ zwei innerhalb des Intervalles $a$ bis $b$ liegende Grössen, so ist für $u < v$ immer $f(u) > f(v)$ und mithin bilden die Grössen

$$f\left(\frac{m\pi + x}{k}\right), \quad f\left(\frac{(m+1)\pi + x}{k}\right), \quad f\left(\frac{(m+2)\pi + x}{k}\right), \ldots$$

eine abnehmende Reihe. Daher sind sowohl die Differenzen:

Digitized by Google

$$f\left(\frac{m\pi+x}{k}\right) - f\left(\frac{(m+1)\pi+x}{k}\right), \quad f\left(\frac{(m+2)\pi+x}{k}\right) - f\left(\frac{(m+3)\pi+x}{k}\right), \ \ldots$$

als auch die folgenden:

$$f\left(\frac{(m+1)\pi+x}{k}\right) - f\left(\frac{(m+2)\pi+x}{k}\right),$$

$$f\left(\frac{(m+3)\pi+x}{k}\right) - f\left(\frac{(m+4)\pi+x}{k}\right), \ \ldots.$$

positive Grössen. Hieraus folgt erstens, dass die Summe der Reihe

$$\left.\begin{aligned} f\left(\frac{m\pi+x}{k}\right) - f\left(\frac{(m+1)\pi+x}{k}\right) + f\left(\frac{(m+2)\pi+x}{k}\right) - \ldots. \\ \ldots. + (-1)^{m+n-1} f\left(\frac{(n-1)\pi+x}{k}\right) \end{aligned}\right\} \quad (9)$$

eine positive Grösse ist, und zweitens, dass dieselbe weniger beträgt, als das erste Glied der Reihe. Um das letztere sogleich zu übersehen, braucht man die Reihe nur in der Form

$$f\left(\frac{m\pi+x}{k}\right) - \left\{f\left(\frac{(m+1)\pi+x}{k}\right) - f\left(\frac{(m+2)\pi+x}{k}\right) + \ldots\ldots\right\}$$

darzustellen, dann sind alle in Parenthese stehenden Differenzen positive Grössen und folglich wird eine positive Grösse von $f\left(\frac{m\pi+x}{k}\right)$ subtrahirt. Die Summe der Reihe (9) ist demnach zwischen den Gränzen 0 und $f\left(\frac{m\pi+x}{k}\right)$ enthalten, woraus nach Nr. (8) sich sogleich ergiebt, dass der absolute Werth des Integrales

$$\int_{m\pi}^{n\pi} f\left(\frac{z}{k}\right) \sin z \, dz$$

zwischen den Gränzen

$$0 \text{ und } \int_{0}^{\pi} f\left(\frac{m\pi+x}{k}\right) \sin x \, dx$$

Digitized by Google

enthalten ist. Hieraus folgt dann weiter, dass dem absoluten Werthe nach

$$0 < \frac{1}{k}\int_{m\pi}^{n\pi} f\left(\frac{z}{k}\right) \sin z\, dz < \int_{0}^{\pi} \frac{1}{k} f\left(\frac{m\pi + x}{k}\right) \sin x\, dx$$

oder wegen des Werthes von $m\pi$

$$0 < \frac{1}{k}\int_{m\pi}^{n\pi} f\left(\frac{z}{k}\right) \sin z\, dz < \int_{0}^{\pi} \frac{1}{k} f\left(a + \frac{a+x}{k}\right) \sin x\, dx$$

ist. Da wir nun schon früher vorausgesetzt hatten, dass $Lim\left[\delta f(a+\delta)\right] = 0$ sei, wenn $\delta$ bis zur Gränze Null abnimmt, so geht unzweifelhaft hervor, dass auch

$$Lim\left[\frac{1}{k} f(a + \frac{a+x}{k})\right] = 0$$

ist, sobald $k$ ins Unendliche hinaus wächst. Nach dem Vorigen ist dann auch

$$Lim \frac{1}{k}\int_{m\pi}^{n\pi} f\left(\frac{z}{k}\right) \sin z\, dz = 0$$

und nach Nr. (7)

$$\left.\begin{aligned} &Lim \int_a^b f(t) \sin kt\, dt = 0 \\ \text{wenn} \quad &Lim\left[\delta f(a+\delta)\right] = 0 \end{aligned}\right\} \quad (10)$$

wobei die zweite daselbst noch vorkommende Bedingung $Lim\left[\delta f(b-\delta)\right] = 0$ weggelassen ist, weil sie bei einer von $a$ bis $b$ abnehmenden und positiv bleibenden Funktion von selbst erfüllt wird, sobald die obengenannte Bedingung stattfindet *). Bleibt die Funktion $f(t)$ für $t = a$ noch endlich,

*) Wegen $a < b$ ist nämlich $f(a) > f(b)$, $f(b)$ aber noch positiv. Man kann daher auch eine Grösse $\delta$ so klein wählen, dass $f(a+\delta)$ immer noch $> f(b-\delta)$ oder $\delta f(b-\delta) < \delta f(a+\delta)$ ist, woraus sogleich folgt, dass $Lim\left[\delta f(b-\delta)\right] = 0$ wird, wenn schon $Lim\left[\delta f(a+\delta)\right] = 0$ ist.



Digitized by Google

so ist natürlich $Lim\,[\delta f(a+\delta)] = 0$, es kann aber auch $f(t)$ für $t=a$ ins Unendliche hinauswachsen, gleichwohl aber die obige Bedingung noch erfüllt sein, für solche Funktionen gilt dann unser Theorem ebenfalls. So erkennt man z. B. hieraus, dass

$$Lim \int_a^b \frac{\sin kt\, dt}{\sqrt{t-a}} = 0$$

obgleich $f(t) = \frac{1}{\sqrt{t-a}}$ für $t=a$ unendlich wird; denn es ist

$$Lim\,[\delta f(a+\delta)] = Lim\left[\frac{\delta}{\sqrt{\delta}}\right] = Lim\,(\sqrt{\delta}) = 0\,.$$

Eine ganz ähnliche Betrachtung dient uns für den Fall, dass die Funktion $f(t)$ von $t=a$ bis $t=b$ beständig wächst, wobei wir aber immer wieder voraussetzen, dass alle ihre Werthe innerhalb dieses Intervalles positiv sind. Dann bilden die Glieder

$$f\left(\frac{m\pi+x}{k}\right),\quad f\left(\frac{(m+1)\pi+x}{k}\right),\quad f\left(\frac{(m+2)\pi+x}{k}\right),\ \ldots.$$

$$\ldots.\ f\left(\frac{(n+2)\pi+x}{k}\right),\quad f\left(\frac{(n-1)\pi+x}{k}\right)$$

eine steigende Reihe, bei umgekehrter Anordnung dagegen eine fallende. Schreiben wir die Gleichung (8) in der Form

$$\int_{m\pi}^{n\pi} f\left(\frac{z}{k}\right) \sin z\, dz =$$

$$(-1)^n \int_0^{\pi} \left\{ f\left(\frac{(n-1)\pi+x}{k}\right) - f\left(\frac{(n-2)\pi+x}{k}\right) + \ldots. \right.$$

$$\left. \ldots. + (-1)^{n+m-1} f\left(\frac{m\pi+x}{k}\right) \right\} \sin x\, dx$$

indem wir die dort unter dem Integralzeichen stehende Reihe umkehren, so sind jetzt alle früheren Schlüsse wieder anwendbar; der absolute Werth von dem obigen Integrale liegt nämlich zwischen:

Digitized by Google

$$0 \text{ und } \int_0^{\pi} f\left(\frac{(n-1)\,\pi + x}{k}\right) \sin x \; dx$$

und wenn man für $n\pi$ seinen Werth setzt, so folgt nach Division mit $k$, dass

$$0 < \frac{1}{k} \int_{m\pi}^{n\pi} f\left(\frac{z}{k}\right) \sin z \, dz < \int_0^{\pi} \frac{1}{k} f\left(b - \frac{n+\beta-x}{k}\right) \sin x \; dx$$

ist, woraus man für $Lim\,[\delta f(b-\delta)] = 0$ nach Nr. (7) leicht

$$\left.\begin{aligned} Lim \int_a^b f(t) \sin kt \, dt &= 0 \\ \text{wenn} \quad Lim\,[\delta f(b-\delta)] &= 0 \end{aligned}\right\} \quad (11)$$

findet, wobei nun wegen des beständigen Wachsthums der Funktion die Bedingung $Lim\,[\delta f(a+\delta)] = 0$ überflüssig geworden ist. Aus diesem Satze ersieht man z. B. leicht, dass

$$Lim \int_a^b \frac{\sin kt \, dt}{\sqrt{b-t}} = 0$$

ist, weil die Funktion $f(t) = \frac{1}{\sqrt{b-t}}$ die genannten Bedingungen erfüllt.

Es hat nun nicht die mindeste Schwierigkeit mehr, den Fall zu betrachten, in welchem der Lauf der Funktion $f(t)$ von $t=a$ bis $t=b$ ein völlig willkührlicher ist. Nähme dieselbe während dieses Intervalles mehrmals zu und ab, ohne jedoch negativ zu werden, so denke man sich ihre Maxima und Minima aufgesucht, welche etwa für $t=\alpha$, $t=\beta$, $t=\gamma$, etc. eintreten mögen und zerlege das fragliche Integral wie folgt

$$\int_a^b f(t) \sin kt \, dt$$

$$= \int_a^{\alpha} f(t) \sin kt \, dt + \int_a^{\beta} f(t) \sin kt \, dt + \int_{\beta}^{\gamma} f(t) \sin kt \, dt + \ldots .$$

$$\ldots . + \int_{\lambda}^{b} f(t) \sin kt \, dt .$$

Digitized by Google

Da nun eine Funktion zwischen einem Maximum und dem nächsten Minimum entweder blos ab- oder blos zunimmt, so sind auf jedes der einzelnen Integrale die Schlüsse anwendbar, welche uns zeigten, dass

$$Lim \int_a^b f(t) \sin kt\, dt = 0 \qquad (12)$$

sei, wenn $f(t)$ von $t = a$ bis $t = b$ entweder nur ab- oder nur zunimmt; es nähert sich also jedes einzelne der Integrale rechts der Gränze Null und folglich ist wieder der Gränzwerth des Integrales links $= 0$. Ginge die Funktion $f(t)$ an einer der Gränzen $t = a$ oder $t = b$ ins Unendliche hinaus, so muss wieder $Lim\,[\delta f(a+\delta)]$ oder $Lim\,[\delta f(b-\delta)] = 0$ sein.

Auch für solche Funktionen $f(t)$, welche stellenweis negativ werden, gilt die Gleichung (12) noch. Wäre z. B. $f(t)$ positiv von $t = a$ bis $t = \mu$, negativ von $t = \mu$ bis $t = \nu$ und dann wieder positiv von $t = \nu$ bis $t = b$, so zerlege man wie folgt

$$\int_a^b f(t) \sin kt\, dt$$

$$= \int_a^\mu f(t) \sin kt\, dt + \int_\mu^\nu f(t) \sin kt\, dt + \int_\nu^b f(t) \sin kt\, dt .$$

Das erste und dritte Integral rechts nähern sich der Gränze Null, weil in ihnen $f(t)$ stets positiv bleibt; schreibt man das zweite in der Form

$$- \int_\mu^\nu [-f(t)] \sin kt\, dt$$

so bleibt hier $[-f(t)]$ positiv, weil der Voraussetzung nach $f(t)$ von $t = \mu$ bis $t = \nu$ negativ ist, und folglich convergirt das Integral

$$\int_\mu^\nu [-f(t)] \sin kt\, dt$$

gegen die Gränze Null, wodurch man wieder auf die Gleichung (12) zurückkommt. — Nach allen diesen Bemerkungen können wir den

Digitized by Google

Satz aussprechen: „bleibt $f(t)$ von $t=a$ bis $t=b$ stetig und endlich, so ist

$$Lim \int_a^b f(t) \sin kt \, dt = 0 \qquad (13)$$

sollte aber an einer der Gränzen $a$ oder $b$ die Funktion ins Unendliche hinausgehen, so ist zur Gültigkeit jener Formel noch die Bedingung

$$Lim\,[\delta f(a+\delta)] = 0 \quad \text{respektive} \quad Lim\,[\delta f(b-\delta)] = 0$$

erforderlich."

Dieses Resultat lässt sich mit der grössten Leichtigkeit auf den Fall ausdehnen, dass die Funktion $f(t)$ während des Intervalles $t=a$ bis $t=b$ mehrmals unstetig oder unendlich wird. Man braucht sich nur zu erinnern, was man unter dem bestimmten Integrale einer unstetigen Funktion $F(t)$ versteht, um diess sogleich einzusehen. Erleidet nämlich die Funktion $F(t)$ an der Stelle $t=\mu$ eine Unterbrechung der Continuität, so hat $F(\mu)$ plötzlich zwei Werthe, wenn sonst $F(t)$ immer nur einen einzigen besass; der eine von ihnen, den man mit $Lim\,F(\mu-\delta)=F(\mu-0)$ bezeichnen kann, ist der Endwerth der bisherigen Reihe von Werthen, welche $F(t)$ gehabt hat, der andere: $Lim\,F(\mu+\delta)=F(\mu+0)$ bildet den Anfang einer neuen Reihe von Werthen, wie man am leichtesten sich veranschaulichen kann, wenn man $u=F(t)$ geometrisch als Curve construirt. Wird nun $F(t)$ zwischen $a$ und $b$ mehrmals unstetig, etwa für $t=\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ so besteht die Funktion $F(t)$ aus einer Partie einzelner Funktionen, welche für sich stetig sind, denn man kann sich denken, dass $F(t)$ von $a$ bis $\alpha-0$ mit der Funktion $\Phi(t)$ zusammenfällt, von $\alpha+0$ bis $\beta-0$ mit der Funktion $\Psi(t)$, von $\beta+0$ bis $\gamma-0$ mit $X(t)$ u. s. w. Das bestimmte Integral

$$\int_a^b F(t)\,dt$$

d. h. die Fläche der durch die Gleichung $u=F(t)$ charakterisirten Curve, ist in diesem Falle nichts Anderes als die Summe von folgenden Integralen:

Digitized by Google

$$\int_a^{\alpha-0} F(t)\,dt + \int_{\alpha+0}^{\beta-0} F(t)\,dt + \int_{\beta+0}^{\gamma-0} F(t)\,dt + \ldots$$

oder auch

$$\int_a^{\alpha-0} \Phi(t)\,dt + \int_{\alpha+0}^{\beta-0} \Psi(t)\,dt + \int_{\beta+0}^{\gamma-0} X(t)\,dt + \ldots$$

Wäre also in unserem Falle die Funktion $f(t)$ unstetig an den Stellen $t=\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ etc., sämmtlich zwischen $a$ und $b$ enthalten, so würde man von $t=a$ bis $t=\alpha-0$ durch eine stetige Funktion $\varphi(t)$, von $t=\alpha+0$ bis $t=\beta-0$ etwa durch $\psi(t)$ etc. ausdrücken und demnach:

$$\int_a^b f(t)\sin kt\,dt$$

$$= \int_a^{\alpha-0} f(t)\sin kt\,dt + \int_{\alpha+0}^{\beta-0} f(t)\sin kt\,dt + \ldots.$$

$$= \int_a^{\alpha-0} \varphi(t)\sin kt\,dt + \int_{\alpha+0}^{\beta-0} \psi(t)\sin kt\,dt + \ldots.$$

setzen können. Jedes der einzelnen Integrale nähert sich wegen der Continuität der darin vorkommenden Funktion für wachsende $k$ der Gränze Null und folglich ist wieder

$$Lim \int_a^b f(t)\sin kt\,dt = 0.$$

Auch der Fall, dass $f(t)$ an einer der Stellen $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ oder an mehreren unendlich würde, lässt sich leicht behandeln. Wäre $\tau$ eine solche Stelle, so zerlege man wie folgt

$$\int_a^b f(t)\sin kt\,dt = \int_a^{\tau} f(t)\sin kt\,dt + \int_{\tau}^b f(t)\sin kt\,dt$$

und jetzt passt auf jedes der Integrale rechts die Bemerkung, welche wir früher für den Fall machten, dass die Funktion $f(t)$ an einer der

Digitized by Google

Integrationsgränzen ins Unendliche hinausginge; zum Verschwinden der Integrale sind nämlich die Bedingungen

$$Lim\left[\delta f(\tau-\delta)\right]=0 \quad \text{und} \quad Lim\left[\delta f(\tau+\delta)\right]=0$$

erforderlich. Ebenso würde man verfahren, wenn $f(t)$ zwischen $a$ und $b$ mehrmals unendlich würde.

So lässt sich nun das Gesammtresultat dieser ganzen Untersuchung in folgendem Satze zusammenfassen:

„Bleibt die Funktion $f(t)$ von $t=a$ bis $t=b$ endlich, gleichviel ob sie Unterbrechungen der Stetigkeit erleidet oder nicht, so ist für unendlich wachsende $k$

$$Lim\int_a^b f(t)\,sin\,kt\,dt = 0 \qquad (14)$$

wird sie aber innerhalb jenes Intervalles an einer oder mehreren Stellen, die durch $t=\tau$ bezeichnet werden mögen, unendlich, so gilt diese Gleichung nur dann, wenn noch die Bedingung

$$Lim\left[\delta f(\tau\pm\delta)\right]=0 \qquad (15)$$

für unendlich abnehmende $\delta$ erfüllt ist."

## §. 3.

Durch seine Einfachheit und Allgemeinheit wird uns das soeben entwickelte Theorem zu einer reichen Quelle neuer Sätze von eigenthümlichen Gepräge. So ist es z. B. sehr leicht, aus demselben den Gränzwerth abzuleiten, gegen welchen das Integral

$$\int_0^c \frac{sin\,kt}{t}F(t)\,dt$$

worin $c$ eine positive von Null verschiedene Grösse bezeichnet, bei unausgesetzt wachsenden $k$ convergirt. In der That beruht die Auflösung dieses Problems auf weiter nichts, als auf der einfachen Substitution

$$f(t)=\frac{F(t)-F(0)}{t}.$$

Digitized by Google

Setzen wir darin $F(t)$ als eine von $t=0$ bis $t=c$ endliche Funktion voraus, die aber beliebig viele Unterbrechungen der Stetigkeit erleiden darf, so bleibt auch $f(t)$ eine endliche Grösse, nur stellt sie sich für $t=0$ unter die vieldeutige Form $\frac{0}{0}$, deren wahrer Werth möglicherweise auch unendlichgross sein könnte. Für diesen Fall haben wir aber, wenn im Theoreme des vorigen Paragraphen $\tau=0$ genommen wird,

$$Lim\left[\vartheta f(\vartheta)\right] = Lim\left[F(\vartheta) - F(0)\right]$$

d. i. Null, weil wir $F(0)$ als endliche Grösse voraussetzen. Es ist demnach

$$Lim\int_0^c \frac{F(t)-F(0)}{t}\sin kt\,dt = 0$$

oder wenn man die einzelnen Theile integrirt

$$Lim\int_0^c \frac{\sin kt}{t}F(t)\,dt = Lim\,F(0)\int_0^c \frac{\sin kt}{t}dt\,.$$

Führen wir eine neue Variable $z=kt$ auf der rechten Seite ein, so wird

$$\int_0^c \frac{\sin kt}{t}dt = \int_0^{ck}\frac{\sin z}{z}dz$$

und nach dem Vorigen

$$Lim\int_0^c \frac{\sin kt}{t}F(t)\,dt = F(0)\int_0^\infty \frac{\sin z}{z}dz.$$

Man weiss, dass der Werth des Integrales rechts $=\frac{\pi}{2}$ ist, indessen hat man nicht nöthig, diese Kenntniss vorauszusetzen, denn wählt man die Funktion $F(t)$ so, dass sich die auf der linken Seite verlangte Integration ausführen lässt, so gelangt man von selbst zu dem Werthe des Integrales rechts. So ist z. B. für $F(t)=e^{-t}$, $c=\infty$

$$Lim\int_0^\infty \frac{\sin kt}{t}e^{-t}dt = \int_0^\infty \frac{\sin z}{z}dz$$

Digitized by Google

und wenn man berücksichtigt, dass *Arctan k* der Werth des Integrales links *) ist, so findet man als Gränzwerth dafür $\frac{\pi}{2}$ und folglich

$$\frac{\pi}{2} = \int_0^\infty \frac{\sin z}{z} dz .$$

Nach dem Vorigen ergiebt sich nun das Theorem:

$$Lim \int_0^c \frac{\sin kt}{t} F(t)\, dt = \frac{\pi}{2} F(0). \qquad (1)$$

Diess lässt sich leicht in einer anderen sehr bemerkenswerthen Form darstellen, wenn man berücksichtigt, dass

$$\frac{\sin kt}{t} = \int_0^k \cos tu\, du$$

ist, wobei $t$ als Constante für die Integration figurirt. Durch Substitution dieses Werthes verwandelt sich das vorige Integral in

$$\int_0^c F(t)\, dt \int_0^k \cos tu\, du$$

und durch Umkehrung der Integrationsordnung in

$$\int_0^k du \int_0^c F(t) \cos ut\, dt .$$

---

*) Man findet diess leicht auf folgende Weise. Sei

$$u = \int_0^\infty \frac{\sin kt}{t} e^{-t} dt$$

so folgt

$$\frac{du}{dk} = \int_0^\infty \cos kt\, e^{-t} dt$$

und wenn man diese Integration ausführt $\frac{du}{dk} = \frac{1}{1+k^2}$, folglich $u = Arctan\ k$, wo nun keine Constante hinzuzufügen ist, weil aus dem ursprünglichen Werthe von $u$ hervorgeht, dass für $k = 0$ auch $u = 0$ wird.



Digitized by Google

Geht man hier zur Gränze für unendlich wachsende $k$ über, so wird nach Nr. (1)

$$\int_0^\infty du \int_0^c F(t)\cos ut\,dt = \frac{\pi}{2} F(0) \qquad (2)$$

und wenn man $F(t) = \varphi(x+t)$ setzt, wo $x$ in Bezug auf die Integrationen nach $t$ und $u$ constant bleibt

$$\varphi(x) = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty du \int_0^c \varphi(x+t)\cos ut\,dt \qquad (3)$$

und mittelst dieses Theorems kann man jede Funktion, welche von $x$ bis $x+c$ endlich bleibt, in ein bestimmtes Integral verwandeln. Wir wollen uns jedoch bei Formeln dieser Art vor der Hand nicht aufhalten, da wir später auf diese ganze Klasse von Beziehungen ausführlicher zu reden kommen.

Nimmt man in der Formel (1)

$$F(t) = \frac{t}{\sin t} f(t)$$

wobei $f(t)$ von $t=0$ bis $t=c$ endlich bleiben soll, aber beliebig viele Unterbrechungen der Stetigkeit erleiden darf, so bleibt auch $F(t)$ endlich, sobald $c < \pi$ und daher ist das genannte Theorem in diesem Falle anwendbar; zugleich hat man $F(0) = Lim \frac{\delta}{\sin \delta} f(\delta) = f(0)$ mithin

$$Lim \int_0^c \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\,dt = \frac{\pi}{2} f(0), \quad \pi > c > 0. \qquad (4)^*)$$

Wäre dagegen $c = \pi$, so würde man die Formel (1) nicht unmittelbar anwenden können, weil dann $F(t)$ innerhalb des Intervalles

---

*) Die obige Formel, sowie die in Nr. (8) und (9) vorkommenden, hat zuerst Lejeune Dirichlet entwickelt in Crelle's *Journ. Bd.* 4, *S.* 94, und theilweis einfacher in Dove's *Repertorium Bd.* I, *S.* 152. Die sehr elegante Ableitung jenes scharfsinnigen Geometers besteht darin, dass die Zerlegung, welche in §. 2 für das Integral unter Nr. (1) daselbst gezeigt worden ist, unmittelbar auf das obige Integral angewendet wird.

Digitized by Google

$t = 0$ bis $t = \pi$, nämlich am Ende desselben, unendlich würde. Man hat nun aber

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\,dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\,dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\,dt$$

und wenn wir im zweiten Integrale rechts $t = \pi - t'$ setzen, und zugleich das bisher ganz beliebige $k$ zu einer ungeraden Zahl machen

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\,dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\,dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin kt'}{\sin t'} f(\pi - t')\,dt'.$$

Hier ist das Theorem (4) auf jedes der Integrale rechts anwendbar und giebt dann

$$Lim \int_0^{\pi} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\,dt = \frac{\pi}{2}\left[f(0) + f(\pi)\right]. \qquad (5)$$

Aus den Theoremen (4) und (5) lässt sich nun leicht der Gränzwerth des Integrales

$$\int_0^{c} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\,dt \qquad (6)$$

für den Fall ableiten, dass $c$ eine ganz beliebige positive Grösse bedeutet. Wir haben dazu die Unterscheidung zweier Fälle nöthig; entweder nämlich ist $c$ gerade ein Vielfaches von $\pi$, also etwa $= s\pi$, wo $s$ eine positive ganze Zahl bezeichnet, oder $c$ steht unter der Form $s\pi + \gamma$, wo $\gamma$ zwischen 0 und $\pi$ liegt.

Im ersten Falle $c = s\pi$ zerlege man das Integral (6) in die $s$ folgenden

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\,dt + \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\,dt + \int_{2\pi}^{3\pi} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\,dt + \ldots.$$

$$\ldots. + \int_{(s-1)\pi}^{s\pi} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\,dt$$

Digitized by Google

und substituire unter Voraussetzung eines ungeraden $k$ in das zweite Integral $t = \pi + t'$, in das dritte $t = 2\pi + t'$ etc. in das letzte $t = (s-1)\pi + t'$; es wird dann

$$\int_0^{s\pi} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\, dt$$

$$= \int_0^{\pi} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\, dt + \int_0^{\pi} \frac{\sin kt'}{\sin t'} f(\pi+t')\, dt' + \int_0^{\pi} \frac{\sin kt'}{\sin t'} f(2\pi+t')\, dt' + \ldots$$

$$\ldots + \int_0^{\pi} \frac{\sin kt'}{\sin t'} f[(s-1)\pi + t']\, dt' \qquad (7)$$

und auf jedes dieser Integrale lässt sich das Theorem in (5) anwenden, wenn man sich der Reihe nach

$$f(t) = f(t), \quad f(\pi + t'), \quad f(2\pi + t'), \ldots f[(s-1)\pi + t']$$

gesetzt denkt; man erhält daher für die rechte Seite in (7) den Gränzwerth:

$$\frac{\pi}{2}\left[f(0) + f(\pi)\right] + \frac{\pi}{2}\left[f(\pi) + f(2\pi)\right] + \frac{\pi}{2}\left[f(2\pi) + f(3\pi)\right] + \ldots$$

$$\ldots + \frac{\pi}{2}\left[f[(s-1)\pi] + f(s\pi)\right]$$

also durch Vereinigung der gleichen Grössen:

$$Lim \int_0^{s\pi} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\, dt$$

$$= \pi\left[\tfrac{1}{2} f(0) + f(\pi) + f(2\pi) + \ldots + f[(s-1)\pi] + \tfrac{1}{2} f(s\pi)\right]. \qquad (8)$$

Handelt es sich dagegen um den Gränzwerth des Integrales

$$\int_0^{s\pi+\gamma} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\, dt$$

Digitized by Google

so zerlege man es in die beiden folgenden

$$\int_0^{s\pi} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\,dt + \int_{s\pi}^{s\pi+\gamma} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\,dt$$

und setze im zweiten $t = s\pi + t'$, so findet sich leicht

$$\int_0^{s\pi+\gamma} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\,dt = \int_0^{s\pi} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\,dt + \int_0^{\gamma} \frac{\sin kt'}{\sin t'} f(s\pi + t')\,dt'.$$

Den Gränzwerth des ersten erhält man nun nach Formel (8), den des zweiten nach Formel (4), wenn man sich daselbst $c = \gamma$, $f(t) = f(s\pi + t')$ gesetzt denkt. Es ergiebt sich so

$$\left.\begin{aligned} &Lim \int_0^{s\pi+\gamma} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\,dt \\ &= \pi\left[\tfrac{1}{2} f(0) + f(\pi) + f(2\pi) + f(3\pi) + \ldots + f(s\pi)\right] \\ &\pi > \gamma > 0, \end{aligned}\right\} \quad (9)$$

Lässt man in den Formeln (8) und (9) die ganze positive Zahl $s$ ins Unendliche hinaus wachsen, so werden die auf der jedesmaligen rechten Seite stehenden Reihen unendlich, und dann entscheidet ihre Convergenz oder Divergenz, ob der Gränzwerth des Integrales links eine bestimmte angebbare und endliche Grösse ist oder nicht. Man hat dann in Zeichen

$$\left.\begin{aligned} &Lim \int_0^{\infty} \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\,dt \\ &= \pi\left[\tfrac{1}{2} f(0) + f(\pi) + f(2\pi) + f(3\pi) + \ldots \text{ in inf.}\right]. \end{aligned}\right\} \quad (10)$$

Um hierzu ein wenigstens nicht ganz gewöhnliches Beispiel zu geben, wollen wir eine Relation zwischen zwei Reihen entwickeln, die man sonst aus der Theorie der elliptischen Funktionen abzuleiten pflegt.

Digitized by Google

Setzen wir nämlich in der aus der Gammafunktionentheorie bekannten Formel [§. 12, Nr. (5)]:

$$\int_0^\infty \cos 2bt\, e^{-(at)^2}\, dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2a}\, e^{-\left(\frac{b}{a}\right)^2}$$

für $b$ der Reihe nach $0, 1, 2, \ldots n$ und addiren alle so entstehenden Gleichungen, wobei wir aber die erste blos halb nehmen, so wird

$$\int_0^\infty \left\{\tfrac{1}{2} + \cos 2t + \cos 4t + \ldots + \cos 2nt\right\} e^{-(at)^2}\, dt$$

$$= \frac{\sqrt{\pi}}{2a}\left\{\tfrac{1}{2} + e^{-\left(\frac{1}{a}\right)^2} + e^{-\left(\frac{2}{a}\right)^2} + \ldots + e^{-\left(\frac{n}{a}\right)^2}\right\}$$

d. i. wenn man die unter dem Integralzeichen stehende Reihe summirt

$$\int_0^\infty \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t}\, e^{-(at)^2}\, dt$$

$$= \frac{\sqrt{\pi}}{a}\left\{\tfrac{1}{2} + e^{-\left(\frac{1}{a}\right)^2} + e^{-\left(\frac{2}{a}\right)^2} + \ldots + e^{-\left(\frac{n}{a}\right)^2}\right\}.$$

Lassen wir nun $2n+1 = k$ ins Unendliche wachsen, so wird die $(n+1)$ gliedrige Reihe rechts zu einer unendlichen, und nach Formel (10) ergiebt sich jetzt, wenn

$$f(t) = e^{-(at)^2}$$

gesetzt wird, sehr leicht die Relation

$$\pi\left\{\tfrac{1}{2} + e^{-(a\pi)^2} + e^{-(2a\pi)^2} + e^{-(3a\pi)^2} + \ldots.\right\}$$

$$= \frac{\sqrt{\pi}}{a}\left\{\tfrac{1}{2} + e^{-\left(\frac{1}{a}\right)^2} + e^{-\left(\frac{2}{a}\right)^2} + e^{-\left(\frac{3}{a}\right)^2} + \ldots.\right\}$$

die sich in eine weit elegantere Form bringen lässt, wenn man

Digitized by Google

$$e^{-(an)^2} = p, \quad e^{-\left(\frac{1}{a}\right)^2} = q$$

setzt, woraus

$$-a^2 n^2 = lp, \quad -\frac{1}{a^2} = lq$$

oder

$$lp\, lq = n^2$$

folgt. Ausserdem hat man noch

$$n = \sqrt{lp\, lq} = \sqrt{l\left(\frac{1}{p}\right) l\left(\frac{1}{q}\right)}$$

$$\sqrt{n} = \sqrt[4]{l\left(\frac{1}{p}\right)} \sqrt[4]{l\left(\frac{1}{q}\right)}, \quad \frac{1}{a} = \sqrt{l\left(\frac{1}{q}\right)} = \sqrt[4]{l\left(\frac{1}{q}\right)} \sqrt[4]{l\left(\frac{1}{q}\right)}$$

und wenn man diese Werthe substituirt, so gelangt man zu folgendem Satze:

findet zwischen den beiden ächten Brüchen $p$ und $q$ die Relation

$$l\left(\frac{1}{p}\right) l\left(\frac{1}{q}\right) = n^2$$

statt, so gilt die Gleichung:

$$\sqrt[4]{l\left(\frac{1}{p}\right)} \left[\tfrac{1}{2} + p + p^4 + p^9 + p^{16} + \ldots\right]$$

$$= \sqrt[4]{l\left(\frac{1}{q}\right)} \left[\tfrac{1}{2} + q + q^4 + q^9 + q^{16} + \ldots\right]$$

welche ursprünglich von Cauchy gefunden worden ist *).

---

*) M. s. unter dem Vielen, was hierher gehört, Abel's Note in Crelle's *Journal*, *Band* 4, *S.* 93.

Digitized by Google

## §. 4.

Ein Blick auf die bisherigen Schritte der Betrachtung lässt erkennen, dass ein ganz ähnlicher Gedankengang zu den Gränzwerthen der Integrale

$$\int_a^b f(t)\cos kt\,dt\,,\quad \int_0^c \frac{\cos kt}{t}F(t)\,dt\,,\quad \int_0^c \frac{\cos kt}{\cos t}f(t)\,dt$$

führen muss und es würde in der That nichts leichter als diese Durchführung sein. Kürzer jedoch gelangt man durch Reduktion der vorstehenden Integrale auf die bereits bekannten zum Ziele.

Aus dem am Ende von §. 2 ausgesprochenen Theoreme folgt nämlich für $f(t)=\varphi(\lambda+t)$, wo $\lambda$ eine willkührliche Constante bezeichnet

$$Lim\int_a^b \varphi(\lambda+t)\sin kt\,dt = 0 \qquad (1)$$

wobei noch vorausgesetzt wird, dass $Lim\left[\delta f(t\pm\delta)\right]=0$ oder

$$Lim\left[\delta\varphi(\lambda+t\pm\delta)\right] = 0 \qquad (2)$$

sei. Setzen wir nun $\lambda+t=t'$, so folgt sehr leicht

$$\int_a^b \varphi(\lambda+t)\sin kt\,dt = \int_{a+\lambda}^{b+\lambda}\varphi(t')\sin k(t'-\lambda)\,dt'$$

$$= \cos\lambda k\int_{a+\lambda}^{b+\lambda}\varphi(t')\sin kt'\,dt' - \sin\lambda k\int_{a+\lambda}^{b+\lambda}\varphi(t')\cos kt'\,dt'\,.$$

Wenden wir aber auf das erste Integral rechts das oben citirte Theorem selbst an und berücksichtigen die Gleichung (1), so folgt

$$0 = Lim\left[-\sin\lambda k\int_{a+\lambda}^{b+\lambda}\varphi(t')\cos kt'\,dt'\right]$$

und da der Faktor $\sin\lambda k$ für wachsende $k$ sich nicht der Null nähert, so muss:

Digitized by Google

$$Lim \int_{a+\lambda}^{b+\lambda} \varphi(t') \cos kt'\, dt' = 0$$

sein unter der in Nr. (2) angegebenen Bedingung. Lassen wir am Ende das bisher beliebige $\lambda$ bis zur Gränze Null abnehmen, und schreiben $f$, $t$ für $\varphi$, $t'$, so ist

$$\left.\begin{aligned} &Lim \int_a^b f(t) \cos kt\, dt = 0 \\ &\text{wenn} \qquad Lim \left[\delta f(t \pm \delta)\right] = 0 \end{aligned}\right\} \quad (3)$$

ganz analog dem früheren Theoreme in §. 2.

Hieraus kann man ebenso wie in §. 3 den Gränzwerth von

$$\int_0^c \frac{\cos kt}{t} F(t)\, dt$$

ableiten, indem man für $f(t)$ und nachher für $t$ ganz die nämlichen Substitutionen vornimmt wie dort; man gelangt auf diese Weise zu der Relation

$$Lim \int_0^c \frac{\cos kt}{t} F(t)\, dt = F(0) \int_0^\infty \frac{\cos z}{z} dz$$

die zwar formell ganz richtig, materiell aber unbrauchbar ist, weil das Integral auf der rechten Seite unendlich wird.

Setzt man in Formel (3)

$$f(t) = \frac{\varphi(t)}{\cos t}$$

so bleibt $f(t)$ endlich, wenn $\varphi(t)$ es ist, so lange als $t$ weniger als $\frac{\pi}{2}$ beträgt; nehmen wir daher $a = 0$, $b < \frac{\pi}{2}$, so ist

$$Lim \int_0^b \frac{\cos kt}{\cos t} \varphi(t)\, dt = 0, \quad b < \frac{\pi}{2}$$

oder wenn wir der Symmetrie wegen $c$ und $f$ für $b$ und $\varphi$ schreiben

$$Lim \int_0^c \frac{\cos kt}{\cos t} f(t)\, dt = 0, \quad \frac{\pi}{2} > c > 0. \qquad (4)$$



Digitized by Google

Für $c = \frac{\pi}{2}$ dagegen wird die Sache anders; setzt man hier $t = \frac{\pi}{2} - t'$ und nimmt für $k$ eine ungerade Zahl von der Form $4n+1$, so findet man leicht

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos kt}{\cos t} f(t)\, dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin kt'}{\sin t'} f\left(\frac{\pi}{2} - t'\right) dt'$$

und mithin durch Uebergang zur Gränze für unendlich wachsende $k$

$$Lim \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos kt}{\cos t} f(t)\, dt = \frac{\pi}{2} f\left(\frac{\pi}{2}\right). \qquad (5)$$

Handelt es sich ganz im Allgemeinen um den Gränzwerth von

$$\int_0^c \frac{\cos kt}{\cos t} f(t)\, dt$$

wo $c$ eine ganze beliebige Grösse und $k$ von der Form $4n+1$ ist, so hat man blos die beiden Fälle zu unterscheiden, ob für ein ganzes positives $s$,

$$c = (s+\tfrac{1}{2})\pi \quad \text{oder} \quad c = (s+\tfrac{1}{2})\pi + \gamma$$

ist, wo dann $\gamma$ zwischen 0 und $\pi$ liegt. Im ersten Falle zerlege man wie folgt:

$$\int_0^{(s+\frac{1}{2})\pi} \frac{\cos kt}{\cos t} f(t)\, dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos kt}{\cos t} f(t)\, dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{(s+\frac{1}{2})\pi} \frac{\cos kt}{\cos t} f(t)\, dt$$

und substituire im zweiten Integrale auf der rechten Seite $t = \frac{\pi}{2} + t'$, so wird

$$\int_0^{(s+\frac{1}{2})\pi} \frac{\cos kt}{\cos t} f(t)\, dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos kt}{\cos t} f(t)\, dt + \int_0^{s\pi} \frac{\sin kt'}{\sin t'} f(\tfrac{\pi}{2} + t')\, dt'.$$

Digitized by Google

Durch Anwendung der Formeln (5) in diesem und (8) im vorigen Paragraphen wird jetzt

$$\left.\begin{aligned} &Lim \int_0^{(s+\frac{1}{2})\pi} \frac{\cos kt}{\cos t} f(t)\,dt \\ &= \pi\Big[f(\tfrac{1}{2}\pi) + f(\tfrac{3}{2}\pi) + f(\tfrac{5}{2}\pi) + \ldots + \tfrac{1}{2} f\Big(\frac{2s+1}{2}\pi\Big)\Big]. \end{aligned}\right\} (6)$$

Im Falle $c = (s+\frac{1}{2})\pi + \gamma$ dagegen zerlege man wie folgt

$$\int_0^{(s+\frac{1}{2})\pi+\gamma} \frac{\cos kt}{\cos t} f(t)\,dt = \int_0^{(s+\frac{1}{2})\pi} \frac{\cos kt}{\cos t} f(t)\,dt + \int_{(s+\frac{1}{2})\pi}^{(s+\frac{1}{2})\pi+\gamma} \frac{\cos kt}{\cos t} f(t)\,dt.$$

Der Gränzwerth des ersten Integrales rechts findet sich nach Formel (6) selbst; um den des zweiten zu bekommen setze man

$$t = (s+\tfrac{1}{2})\pi + t'$$

es geht dann das fragliche Integral in

$$\int_0^{\gamma} \frac{\sin kt'}{\sin t'} f\Big(\frac{2s+1}{2}\pi + t'\Big)\,dt'$$

über, dessen Gränzwerth nach Formel (4) in §. 3 gleich $\frac{\pi}{2} f\Big(\frac{2s+1}{2}\pi\Big)$ ist. Daher ergiebt sich nach dem Vorigen

$$\left.\begin{aligned} &Lim \int_0^{(s+\frac{1}{2})\pi+\gamma} \frac{\cos kt}{\cos t} f(t)\,dt \\ &= \pi\Big[f(\tfrac{1}{2}\pi) + f(\tfrac{3}{2}\pi) + f(\tfrac{5}{2}\pi) + \ldots + f\Big(\frac{2s+1}{2}\pi\Big)\Big] \\ &\qquad \pi > \gamma > 0. \end{aligned}\right\} (7)$$

Lässt man noch $s$ ins Unendliche wachsen, so vereinigen sich die Formeln (6) und (7) zur folgenden:

$$\left.\begin{aligned} &Lim \int_0^{\infty} \frac{\cos kt}{\cos t} f(t)\,dt \\ &= \pi\big[f(\tfrac{1}{2}\pi) + f(\tfrac{3}{2}\pi) + f(\tfrac{5}{2}\pi) + \ldots \text{ in inf.}\big]. \end{aligned}\right\} (8)$$

Digitized by Google

Diese Formel lässt sich auf ähnliche Weise benutzen, wie die entsprechende in §. 3. So findet man z. B. mit ihrer Hülfe leicht:

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2a}\left\{\tfrac{1}{2} - e^{-\left(\frac{1}{a}\right)^2} + e^{-\left(\frac{2}{a}\right)^2} - \ldots + e^{-\left(\frac{2n}{a}\right)^2}\right\}$$

$$= \int_0^\infty \left\{\tfrac{1}{2} - \cos 2t + \cos 4t - \ldots + \cos 4nt\right\} e^{-(at)^2}\, dt$$

$$= \tfrac{1}{2}\int_0^\infty \frac{\cos(4n+1)t}{\cos t}\, e^{-(at)^2}\, dt.$$

Lässt man hier $n$, also auch $4n+1 = k$ ins Unendliche wachsen, so ergiebt sich nach Formel (8) sogleich

$$\frac{\sqrt{\pi}}{a}\left\{\tfrac{1}{2} - e^{-\left(\frac{1}{a}\right)^2} + e^{-\left(\frac{2}{a}\right)^2} - e^{-\left(\frac{3}{a}\right)^2} + \ldots.\right\}$$

$$= \pi\left\{e^{-\left(\frac{a\pi}{2}\right)^2} + e^{-\left(\frac{3a\pi}{2}\right)^2} + e^{-\left(\frac{5a\pi}{2}\right)^2} + \ldots.\right\}$$

und wenn man noch

$$e^{-\left(\frac{1}{a}\right)^2} = p, \quad e^{-\left(\frac{a\pi}{2}\right)^2} = q$$

setzt, so gelangt man zu dem Satze:

findet zwischen den beiden ächten Brüchen $p$ und $q$ die Relation

$$l\left(\frac{1}{p}\right)\, l\left(\frac{1}{q}\right) = \frac{\pi^2}{4}$$

statt, so gilt die Gleichung:

$$\sqrt[4]{l\left(\frac{1}{p}\right)}\left[\tfrac{1}{2} - p + p^4 - p^9 + p^{16} - \ldots.\right]$$

$$= \sqrt{2}\,\sqrt[4]{l\left(\frac{1}{q}\right)}\left[q + q^4 + q^9 + q^{16} + \ldots.\right]$$

Digitized by Google

## §. 5.

Durch die Betrachtungen der beiden vorigen Paragraphen sind wir nun in den Stand gesetzt, die Summe derjenigen unendlichen Reihe zu bestimmen, von welcher das bestimmte Integral

$$\int_0^\pi f(t)\cos n(t \mp \alpha)\,dt$$

das allgemeine Glied ausmacht. Setzen wir nämlich vor der Hand $m = 0, 1, 2, \ldots n$ und addiren alle so entstehenden Glieder, wobei wir dem ersten derselben noch den Coeffizienten $\frac{1}{2}$ geben, so entsteht zunächst die folgende endliche Reihe:

$$\left.\begin{aligned} \tfrac{1}{2}\int_0^\pi f(t)\,dt + \int_0^\pi f(t)\cos(t \mp \alpha)\,dt + \int_0^\pi f(t)\cos 2(t \mp \alpha)\,dt + \ldots \\ \ldots + \int_0^\pi f(t)\cos n(t \mp \alpha)\,dt \end{aligned}\right\} \quad (1)$$

die sich kürzer in die folgende zusammenfassen lässt

$$\int_0^\pi f(t)\left[\tfrac{1}{2} + \cos(t \mp \alpha) + \cos 2(t \mp \alpha) + \ldots + \cos n(t \mp \alpha)\right] dt$$

worin man die unter dem Integralzeichen stehende Reihe nach der schon einmal benutzten Summirungsformel zusammenziehen kann; man erhält so

$$\int_0^\pi f(t)\frac{\sin(2n+1)\frac{t \mp \alpha}{2}}{2\sin\frac{t \mp \alpha}{2}}\,dt. \quad (2)$$

Bezeichnen wir zur Abkürzung $2n+1$ mit $k$ und lassen $n$, also auch $k$ unendlich wachsen, so ist jetzt mit Unterscheidung der beiden Zeichen nach (2) und (1):

Digitized by Google

$$Lim \int_0^\pi \frac{\sin \frac{1}{2}k\,(t-\alpha)}{2\sin \frac{1}{2}(t-\alpha)} f(t)\,dt \qquad (3)$$

$$= \tfrac{1}{2}\int_0^\pi f(t)\,dt + \int_0^\pi f(t)\cos(t-\alpha)\,dt + \int_0^\pi f(t)\cos 2(t-\alpha)\,dt + \ldots \text{in inf.}$$

und

$$Lim \int_0^\pi \frac{\sin \frac{1}{2}k\,(t+\alpha)}{2\sin \frac{1}{2}(t+\alpha)} f(t)\,dt \qquad (4)$$

$$= \tfrac{1}{2}\int_0^\pi f(t)\,dt + \int_0^\pi f(t)\cos(t+\alpha)\,dt + \int_0^\pi f(t)\cos 2(t+\alpha)\,dt + \ldots \text{in inf.}$$

und hier handelt es sich blos noch um die Aufsuchung der Gränzwerthe links, welche auf folgende Weise sehr leicht zu bewerkstelligen ist.

In dem Integrale (3) setzen wir $\frac{1}{2}(t-\alpha)=u$, woraus $t=\alpha+2u$, $dt=2\,du$ folgt; die Gränzwerthe für $u$ sind dann $\frac{1}{2}(\pi-\alpha)$ und $\frac{1}{2}(0-\alpha)$, wodurch das Integral in das folgende übergeht

$$\int_{-\frac{1}{2}\alpha}^{\frac{1}{2}(\pi-\alpha)} \frac{\sin ku}{\sin u} f(\alpha+2u)\,du$$

welches sich in die beiden folgenden zerlegen lässt:

$$\int_{-\frac{1}{2}\alpha}^{0} \frac{\sin ku}{\sin u} f(\alpha+2u)\,du + \int_0^{\frac{1}{2}(\pi-\alpha)} \frac{\sin ku}{\sin u} f(\alpha+2u)\,du. \qquad (5)$$

Setzen wir im ersten $u=-t$, im zweiten $u=t$, so ändert sich das letztere weiter nicht, das erste dagegen geht in

$$-\int_{\frac{1}{2}\alpha}^{0} \frac{\sin kt}{\sin t} f(\alpha-2t)\,dt$$

über, worin wir durch Vertauschung der Gränzen wieder das positive

Digitized by Google

Vorzeichen hervorrufen. Die Summe in (5), d. h. das Integral (4), stellt sich nun in die folgende Form:

$$\int_0^{\frac{1}{2}\alpha} \frac{\sin kt}{\sin t} f(\alpha - 2t)\, dt \; + \; \int_0^{\frac{1}{2}(\pi-\alpha)} \frac{\sin kt}{\sin t} f(\alpha + 2t)\, dt\,. \qquad (6)$$

Für die Aufsuchung der Gränzen, welchen sich diese beiden Integrale bei unendlich wachsenden $k$ nähern, macht sich die Unterscheidung dreier Fälle hinsichtlich des $\alpha$ nöthig, ob nämlich $\alpha = 0$, oder zwischen 0 und $\pi$ enthalten, oder endlich $= \pi$ ist. Im ersten Falle annullirt sich das erste Integral wegen der gleichen Integrationsgränzen, die es erhält, und das zweite convergirt nach Formel (4) in §. 3 für $c = \frac{\pi}{2}$ gegen den Werth $\frac{\pi}{2} f(+0)$; liegt zweitens $\alpha$ zwischen 0 und $\pi$ so hat man gleichzeitig

$$\pi > \tfrac{1}{2}\alpha > 0 \quad \text{und} \quad \pi > \tfrac{1}{2}(\pi - \alpha) > 0$$

und folglich sind nach dem soeben genannten Theoreme $\frac{\pi}{2} f(\alpha - 0)$ und $\frac{\pi}{2} f(\alpha + 0)$ die Gränzwerthe unserer Integrale.

Für $\alpha = \pi$ endlich verschwindet das zweite Integral in (6) und das erste nähert sich der Gränze $\frac{\pi}{2} f(\pi - 0)$. Die Summe der unendlichen Reihe in Nr. (3) wird also

$$\frac{\pi}{2} f(+0), \quad \pi \frac{f(\alpha - 0) + f(\alpha + 0)}{2}, \quad \frac{\pi}{2} f(\pi - 0)$$

je nachdem

$$\alpha = 0, \quad \pi > \alpha > 0, \quad \alpha = \pi$$

ist, mithin verschieden nach den drei für $\alpha$ betrachteten Fällen.

Nicht minder leicht ist die Diskussion des Integrales in Nr. (4). Für $\frac{1}{2}(t + \alpha) = u$ geht dasselbe in das folgende über:

Digitized by Google

$$\int_{\frac{1}{2}\alpha}^{\frac{1}{2}(\pi+\alpha)} \frac{\sin ku}{\sin u} f(-\alpha+2u)\,du$$

welches wir wieder, $t$ für $u$ schreibend, in die zwei nachstehenden zerfällen:

$$\int_0^{\frac{1}{2}(\pi+\alpha)} \frac{\sin kt}{\sin t} f(-\alpha+2t)\,dt \;-\; \int_0^{\frac{1}{2}\alpha} \frac{\sin kt}{\sin t} f(-\alpha+2t)\,dt\,. \qquad (7)$$

Hinsichtlich des $\alpha$ unterscheiden wir wieder die drei vorhin betrachteten Fälle. Für $\alpha = 0$ annullirt sich das zweite Integral und das erste convergirt gegen $\frac{\pi}{2} f(+0)$; liegt zweitens $\alpha$ zwischen 0 und $\pi$, so finden gleichzeitig die Ungleichungen

$$\pi > \tfrac{1}{2}(\pi+\alpha) > 0 \quad \text{und} \quad \pi > \tfrac{1}{2}\alpha > 0$$

statt, woraus folgt, dass $\frac{\pi}{2} f(-\alpha+0) - \frac{\pi}{2} f(-\alpha+0)$, d. h. Null der Gränzwerth des ganzen in (7) stehenden Ausdruckes ist, für $\alpha = \pi$ endlich wird $\frac{1}{2}(\pi+\alpha) = \pi$ und dann müssen wir auf das erste Integral in (7) die Formel (5) in §. 3 und auf das zweite die Formel (4) ebendaselbst anwenden; diess giebt den Gränzwerth:

$$\frac{\pi}{2}\left[f(-\pi+2\pi) + f(-\pi+0)\right] - \frac{\pi}{2} f(-\pi+0)$$

$$= \frac{\pi}{2} f(\pi)\,.$$

Die Summe der in Nr. (4) vorkommenden unendlichen Reihe wird demnach

$$\frac{\pi}{2} f(+0)\,, \quad 0\,, \quad \frac{\pi}{2} f(\pi+0)$$

je nachdem

$$\alpha = 0\,, \quad \pi > \alpha > 0\,, \quad \alpha = \pi$$

ist. Addiren wir jetzt die Reihen in (3) und (4) unter Berücksichtigung

Digitized by Google

ihrer Summen, so findet sich nach beiderseitiger Division mit $\pi$, dass die Summe der unendlichen Reihe

$$\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\,dt + \cos a\,\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\cos t\,dt + \cos 2a\,\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\cos 2t\,dt + \ldots.$$

durch

$$f(0),\quad \frac{f(a-0)+f(a+0)}{2},\quad f(\pi)$$

ausgedrückt wird, je nachdem $a=0$, zwischen 0 und $\pi$ enthalten oder $=\pi$ ist. Bleibt nun die Funktion $f(x)$ an der Stelle $x=a$ stetig, so ist

$$\frac{f(a-0)+f(a+0)}{2} = f(a)$$

erleidet sie aber daselbst eine Unterbrechung der Continuität, so ist der vorstehende Ausdruck das arithmetische Mittel aus den beiden Werthen, welche ihr an der genannten Stelle zukommen. Schreiben wir $x$ für $a$ und setzen zur Abkürzung

$$A_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\cos nt\,dt \tag{8}$$

so erhalten wir jetzt folgendes Theorem:

Bleibt die Funktion $f(x)$ endlich und stetig von $x=0$ bis $x=\pi$, so gilt die Gleichung

$$f(x) = \tfrac{1}{2}A_0 + A_1\cos x + A_2\cos 2x + A_3\cos 3x + \ldots \tag{9}$$

für alle Werthe von $x=0$ bis $x=\pi$ inclusive beider Gränzen; erleidet sie aber an irgend einer Stelle dieses Intervalles eine Unterbrechung der Continuität, ohne jedoch dabei unendlich zu werden, so ist die Summe der obigen Reihe gleich dem arithmetischen Mittel aus den beiden Werthen, welche dem $f(x)$ an jener Stelle zukommen.

Durch Subtraktion der Reihe (4) von der in (3), unter Berücksichtigung ihrer Summen, ergiebt sich ganz ähnlich, dass die unendliche Reihe

$$\sin a\,\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\sin t\,dt + \sin 2a\,\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\sin 2t\,dt + \ldots.$$



Digitized by Google

die Ausdrücke

$$0\,,\quad \frac{f(a-0)+f(a+0)}{2}\,,\quad 0$$

zur Summe hat, je nachdem $a=0$, $\pi>a>0$, oder $a=\pi$ ist. Wir können daher dem obigen Theoreme das folgende an die Seite stellen, worin zur Abkürzung

$$B_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\sin nt\,dt \qquad (10)$$

gesetzt worden ist.

Bleibt die Funktion $f(x)$ endlich und stetig von $x=0$ bis $x=\pi$, so gilt die Gleichung

$$f(x) = B_1 \sin x + B_2 \sin 2x + B_3 \sin 3x + \ldots. \qquad (11)$$

für alle Werthe von $x=0$ bis $x=\pi$ exclusive beider Gränzen, an welchen die Reihe verschwindet; erleidet aber $f(x)$ an irgend einer Stelle dieses Intervalles eine Unterbrechung der Continuität, ohne jedoch unendlich zu werden, so ist die Summe der obigen Reihe gleich dem arithmetischen Mittel aus den beiden Werthen, welche dem $f(x)$ an jener Stelle zukommen.

Für negative $x$ gelten beide Theoreme nur in besonderen Fällen, das erste, wenn die Funktion $f(x)$ die Eigenschaft $f(-x)=f(x)$ besitzt, das zweite, wenn $f(-x)=-f(x)$ ist.

## §. 6.

Die Allgemeinheit der beiden Theoreme in (9) und (11) lässt eine grosse Anzahl spezieller Beispiele zu, von denen wir einige der hauptsächlichsten mehr andeuten, als entwickeln wollen, da es sich bei diesem Calcül immer nur um ganz gewöhnliche Integrationen handelt.

I. Beispiele für das Theorem in Nr. (9).

1) Für $f(x)=x$ findet man leicht unter Anwendung der bekannten Reduktionsformel

$$\int U V\,dt = U\int V\,dt - \int d U \int V\,dt$$

Digitized by Google

für $U = t$, $V = \cos nt$

$$A_n = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\cos n\pi - 1}{n^2}$$

und hieraus ohne Schwierigkeit

$$\left.\begin{aligned} x = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\left\{\frac{\cos x}{1^2} + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} + \ldots\right\} \\ \pi \geqq x \geqq 0 \end{aligned}\right\} \quad (1)$$

für $x = 0$ oder $x = \pi$ erhält man hieraus eine schon bekannte Summenformel, für $x = \frac{\pi}{2}$ eine blose Identität.

2) Nehmen wir $f(x) = \cos \mu x$, wo $\mu$ einen beliebigen Bruch bedeuten soll, so wird

$$\int \cos \mu t \cos nt \, dt = \tfrac{1}{2} \int \cos (\mu - n) t + \tfrac{1}{2} \int \cos (\mu + n) t$$

woraus sich dann weiter ergiebt

$$A_n = \frac{2\mu \sin \mu\pi}{\pi} \cdot \frac{(-1)^{n+1}}{n^2 - \mu^2}$$

und weiter

$$\left.\begin{aligned} \frac{\pi}{2} \frac{\cos \mu x}{\sin \mu\pi} = \frac{1}{2\mu} + \frac{\mu \cos x}{1^2 - \mu^2} - \frac{\mu \cos 2x}{2^2 - \mu^2} + \frac{\mu \cos 3x}{3^2 - \mu^2} - \ldots \\ \pi \geqq x \geqq -\pi \end{aligned}\right\} \quad (2)$$

indem die Formel auch für negative $x$ gilt vermöge der Eigenschaft $f(-x) = f(x)$, welche $\cos \mu x$ zukommt. Die Spezialisirung $x = \pi$ giebt

$$\frac{\pi}{2} \cot \mu\pi = \frac{1}{2\mu} - \frac{\mu}{1^2 - \mu^2} - \frac{\mu}{2^2 - \mu^2} - \frac{\mu}{3^2 - \mu^2} - \ldots \quad (3)$$

was mit einer anderwärts bekannten Formel übereinstimmt. Multiplizirt man diese Gleichung mit $2\,d\mu$, integrirt und bezeichnet die Constante der Integration mit $lk$, so findet man leicht:

$$l \sin \mu\pi = lk + l\mu + l(1^2 - \mu^2) + l(2^2 - \mu^2) + \ldots$$

oder

$$\frac{\sin \mu\pi}{\mu} = k(1^2 - \mu^2)(2^2 - \mu^2)(3^2 - \mu^2) \ldots$$

Digitized by Google

Durch Uebergang zur Gränze für unausgesetzt bis zur Null abnehmende $\mu$ findet sich hieraus

$$\pi = k\,1^2 \,.\, 2^2 \,.\, 3^2 \,.\,.\,.\,.$$

und wenn man mit dieser Gleichung in die vorhergehende dividirt

$$\frac{\sin \mu\pi}{\mu\pi} = \left(1 - \frac{\mu^2}{1^2}\right)\left(1 - \frac{\mu^2}{2^2}\right)\left(1 - \frac{\mu^2}{3^2}\right) \,.\,.\,.\,. \qquad (4)$$

Setzt man hier $\mu\pi = u$, so kommt man auf die bekannte Formel

$$\sin u = u\left(1 - \frac{u^2}{1^2\,\pi^2}\right)\left(1 - \frac{u^2}{2^2\,\pi^2}\right)\left(1 - \frac{u^2}{3^2\,\pi^2}\right) \,.\,.\,.\,. \qquad (5)$$

aus welcher man mittelst der Relation $\cos u = \frac{\sin 2u}{2\sin u}$ leicht die entsprechende Formel für den Cosinus ableitet.

3) Erinnert man sich der Integrationsformel

$$\int e^{ct} \cos nt\, dt = \frac{n \sin nt + c \cos nt}{c^2 + n^2} e^{ct}$$

so findet man leicht

$$\int_0^\pi e^{ct} \cos nt\, dt = \frac{c}{c^2 + n^2}\left(e^{c\pi} \cos n\pi - 1\right)$$

und wenn man $c = +a$, $c = -a$ setzt und addirt

$$\int_0^\pi \left(e^{at} + e^{-at}\right) \cos nt\, dt = \frac{a \cos n\pi}{a^2 + n^2}\left(e^{a\pi} - e^{-a\pi}\right).$$

Für $f(x) = e^{ax} + e^{-ax}$ ergiebt sich hieraus

$$A_n = \frac{2}{\pi} \frac{a(-1)^n}{a^2 + n^2}\left(e^{a\pi} - e^{-a\pi}\right)$$

und dann weiter

$$\left.\begin{aligned} \frac{\pi}{2} \cdot \frac{e^{ax} + e^{-ax}}{e^{a\pi} - e^{-a\pi}} &= \frac{1}{2a} - \frac{a \cos x}{a^2 + 1^2} + \frac{a \cos 2x}{a^2 + 2^2} - \,.\,.\,.\,. \\ \pi &\geqq x \geqq -\pi\,. \end{aligned}\right\} \qquad (6)$$

Digitized by Google

Will man auf der rechten Seite den Zeichenwechsel wegschaffen, so braucht man nur $\pi - x$ für $x$ zu setzen; die gefundenen zwei Formeln lassen sich dann wieder durch Subtraktion und Addition combiniren. Auch kann man für $x = \pi$ durch Multiplikation mit $2da$ und Integration ein Resultat ableiten, welches für $a\pi = u$ das Nämliche giebt, wie die Formel (5), wenn man in ihr $u\sqrt{-1}$ an die Stelle von $u$ setzt.

II. Beispiele für das Theorem in (11).

1) Nimmt man $f(x)$ constant und zwar am einfachsten $= 1$, so wird

$$B_n = \frac{2}{\pi}\,\frac{1 - \cos n\pi}{n}$$

und hieraus findet man leicht

$$\left.\begin{aligned} \frac{\pi}{4} &= \frac{\sin x}{1} + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \cdots \\ &\pi > x > 0\,. \end{aligned}\right\} \quad (7)$$

Für negative $x$ ist die Summe der Reihe $= -\frac{\pi}{4}$, für $x = 0$ das arithmetische Mittel aus $-\frac{\pi}{4}$ und $+\frac{\pi}{4}$. Ueberhaupt würde es sehr leicht sein, die Curve $y = \varphi(x)$ zu construiren, welche die jedesmalige Summe der Reihe (7) darstellt; von $x = 0$ bis $x = \pi$ nämlich ist dieselbe eine Parallele zur Achse der $x$ in der Entfernung $y = \frac{\pi}{4}$, von $x = \pi$ bis $x = 2\pi$ wieder eine Parallele in der Entfernung $y = -\frac{\pi}{4}$, von $x = 2\pi$ bis $x = 3\pi$ in der Entfernung $+\frac{\pi}{4}$ u. s. f. Ebenso ist die Sache auf der negativen Seite der Abscissenachse. An allen den Stellen $0$, $\pm\pi$, $\pm 2\pi$ etc. findet eine Unterbrechung der Stetigkeit statt, indem die Curve aus $\pm\frac{\pi}{4}$ in $\mp\frac{\pi}{4}$ überspringt, die Summe der obigen Reihe ist dann jedesmal $= 0$. — Die Formel (7) enthält auch die Leibnitz'sche Reihe als den speziellen Fall $x = \frac{\pi}{2}$ in sich.

Digitized by Google

2) Die Annahme $f(x) = x$ giebt

$$B_n = 2\frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

und hieraus findet man

$$\left.\begin{aligned} \frac{x}{2} &= \frac{\sin x}{1} - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} - \ldots . \\ &\pi > x > -\pi \end{aligned}\right\} (8)$$

die erweiterte Bedingung, welche hier angegeben ist, folgt unmittelbar aus der Bemerkung, dass $\frac{x}{2}$ mit $\sin mx$ gleichzeitig verschwindet und negativ wird. Auch hier würde es sehr leicht sein, eine graphische Darstellung der Funktion $y = \varphi(x)$ zu geben, welche die Summe der Reihe darstellt. Die fragliche Curve besteht nämlich aus einer unendlichen Menge von Geraden, welche die Abscissenachse in den Punkten $x = 0$, $x = \pm\pi$, $x = \pm 2\pi$ etc. schneiden und mit ihr den Winkel $Arctan\, \frac{1}{2}$ machen. Jede solche Gerade liegt zur Hälfte über und zur Hälfte unter der Abscissenachse, und jedes dieser beiden Stücke hat die Länge $\frac{\pi}{2}\sqrt{3}$.

Schreibt man in Nr. (8) $\pi - x$ für $x$, so ergiebt sich noch

$$\left.\begin{aligned} \frac{\pi - x}{2} &= \frac{\sin x}{1} + \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} + \ldots . \\ &2\pi > x > 0 \end{aligned}\right\} (9)$$

und durch Addition von (8) und (9) würde man auf die Formel (7) zurückkommen.

3) Nimmt man unter Voraussetzung eines gebrochenen $\mu$, $f(x) = \sin \mu x$, so gelangt man leicht zu dem Werthe

$$B_n = \frac{2}{\pi}\sin \mu\pi \frac{(-1)^{n+1} n}{n^2 - \mu^2}$$

woraus man leicht die Formel:

Digitized by Google

$$\left.\begin{array}{c} \frac{\pi}{2}\,\frac{\sin \mu x}{\sin \mu \pi} = \frac{\sin x}{1^2-\mu^2} - \frac{2\sin 2x}{2^2-\mu^2} + \frac{3\sin 3x}{3^2-\mu^2} - \cdots \\ \pi > x > -\pi \end{array}\right\} \quad (10)$$

ableitet, die man auch durch Differenziation der Gleichung (2) erhalten kann.

4) Benutzt man die bekannte Formel

$$\int e^{ct} \sin nt\, dt = \frac{c \sin nt - n \cos nt}{c^2+n^2} e^{ct}$$

für die Annahme $f(x) = e^{ax} - e^{-ax}$, so findet man

$$B_n = \frac{2}{\pi} \frac{(-1)^{n+1} n}{a^2+n^2} \left(e^{a\pi} - e^{-a\pi}\right)$$

und hieraus sehr leicht:

$$\left.\begin{array}{c} \frac{\pi}{2}\,\frac{e^{ax}-e^{-ax}}{e^{a\pi}-e^{-a\pi}} = \frac{\sin x}{a^2+1^2} - \frac{2\sin 2x}{a^2+2^2} + \frac{3\sin 3x}{a^2+3^2} - \cdots \\ \pi > x > -\pi\,. \end{array}\right\} \quad (11)$$

Schreibt man $\pi - x$ für $x$ so erhält die Reihe lauter positive Glieder; die beiden so gewonnenen Resultate lassen dann wieder Combinationen durch Addition und Subtraktion zu.

## §. 7.

Für die Anwendung des ersten der beiden allgemeinen Theoreme ist noch eine Transformation von Wichtigkeit, welche das Integral

$$\int_0^\pi f(t) \cos nt\, dt$$

betrifft, sobald die Funktion $f$ eine Funktion von $\cos t$ ist und also das Integral unter der Form

$$\int_0^\pi f(\cos t) \cos nt\, dt$$

Digitized by Google

steht. Die erwähnte, von Jacobi*) entwickelte Umformung beruht auf folgendem einfachen Satze. Wenn die Funktion $\psi(x)$ so beschaffen ist, dass sie sich sowohl für $x = a$ als $x = b$ annullirt und wenn ihre Differenzialquotienten bis zum $(n-1)^{\text{ten}}$ inclusive die nämliche Eigenschaft besitzen, so ist

$$\int_a^b \psi(x)\, \varphi^{(n)}(x)\, dx = (-1)^n \int_a^b \psi^{(n)}(x)\, \varphi(x)\, dx . \qquad (1)$$

Von der Richtigkeit desselben überzeugt man sich sehr leicht durch successive Anwendung der bekannten Formel für die theilweise Integration, wovon wir wenigstens den ersten Schritt andeuten wollen. Es ist nämlich

$$\int \psi(x)\, \varphi^{(n)}(x)\, dx = \psi(x) \int \varphi^{(n)}(x)\, dx - \int \psi'(x)\, dx \int \varphi^{(n)}(x)\, dx$$
$$= \psi(x)\, \varphi^{(n-1)}(x) - \int \psi'(x)\, dx\, \varphi^{(n-1)}(x)$$

führt man nun die Gränzen $x = a$, $x = b$ ein und bemerkt, dass der Voraussetzung nach $\psi(a) = 0$, $\psi(b) = 0$ ist, so bleibt

$$\int_a^b \psi(x)\, \varphi^{(n)}(x)\, dx = - \int_a^b \psi'(x)\, \varphi^{(n-1)}(x)\, dx .$$

Wendet man rechts wieder das nämliche Verfahren an und berücksichtigt die Voraussetzung $\psi'(a) = 0$, $\psi'(b) = 0$, so geht das fragliche Integral in

$$+ \int_a^b \psi''(x)\, \varphi^{(n-2)}(x)\, dx$$

über und man übersieht auf der Stelle, dass die $n$malige Wiederholung des Prinzips der theilweisen Integration zu dem in (1) ausgesprochenen Satze führen muss. Nimmt man in demselben

$$\psi(x) = (1-x^2)^{n-\frac{1}{2}}, \quad a = -1, \quad b = +1$$

---

*) M. s. hierüber die schöne Abhandlung Jacobi's in Crelle's *Journal*, *Band* 15, *S.* 1.

Digitized by Google

so sind die dem $\psi(x)$ auferlegten Bedingungen erfüllt, wie man leicht sehen wird; nach Nr. (1) wird dann

$$\int_{-1}^{1} (1-x^2)^{n-\frac{1}{2}} \varphi^{(n)}(x)\,dx = (-1)^n \int_{-1}^{1} \frac{d^n (1-x^2)^{n-\frac{1}{2}}}{dx^n} \varphi(x)\,dx .$$

Andererseits hat man das Theorem *)

$$\frac{d^{n-1}(1-x^2)^{n-\frac{1}{2}}}{dx^{n-1}} = \frac{(-1)^{n-1}\,1.3.5..(2n-1)}{n} \sin(n\,Arccos\,x)$$

und folglich ist auch

$$\int_{-1}^{1} (1-x^2)^{n-\frac{1}{2}} \varphi^{(n)}(x)\,dx = \frac{-1.3.5..(2n-1)}{n} \int_{-1}^{1} \frac{d\sin(n\,Arccos\,x)}{dx} \varphi(x)\,dx .$$

Streicht man in dem Integrale rechts $dx$ gegen $dx$, setzt darauf $Arccos\,x = t$, also $x = cos\,t$, und bemerkt, dass für $x = -1$ und $x = +1$ für $t$ die Werthe $t = n$, $t = 0$ eintreten, so ergiebt sich

$$\int_{\pi}^{0} sin^{2n-1} t\,\varphi^{(n)}(cos\,t)\,d\,cos\,t = \frac{-1.3.5..(2n-1)}{n} \int_{\pi}^{0} d\sin(nt)\,\varphi(cos\,t)$$

d. i. bei Vertauschung der Gränzen

$$\int_{0}^{\pi} sin^{2n} t\,\varphi^{(n)}(cos\,t)\,dt = 1.3.5..(2n-1) \int_{0}^{\pi} cos\,nt\;\varphi(cos\,t)\,dt$$

und durch Transposition wenn man $f$ für $\varphi$ schreibt

$$\int_{0}^{\pi} f(cos\,t)\,cos\,nt\,dt = \frac{1}{1.3.5..(2n-1)} \int_{0}^{\pi} f^{(n)}(cos\,t)\,sin^{2n} t\,dt . \qquad (2)$$

*) M. s. mein *Handbuch der Differenzialrechnung*, S. 91.



Digitized by Google

Um den Gebrauch dieser sehr umfassenden Formel wenigstens an einem Beispiele zu zeigen, wollen wir

$$f(z) = (1 - 2az + a^2)^{-\frac{1}{2}}$$

setzen, woraus

$$\frac{f^{(n)}(z)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \ldots (2n-1)} = a^n (1 - 2az + a^2)^{-(n+\frac{1}{2})}$$

folgt. Die Jacobische Reduktionsformel giebt dann sogleich

$$\int_0^\pi \frac{\cos nt\, dt}{\sqrt{1 - 2a\cos t + a^2}} = a^n \int_0^\pi \frac{\sin^{2n} t\, dt}{(1 - 2a\cos t + a^2)^{n+\frac{1}{2}}} \tag{3}$$

wobei das Integral rechts, welches wir in der Gestalt

$$\int_0^\pi \left(\frac{\sin t}{\sqrt{1 - 2a\cos t + a^2}}\right)^{2n} \frac{dt}{\sqrt{1 - 2a\cos t + a^2}} \tag{4}$$

darstellen, noch einer bedeutenden schon von Landen angewendeten Transformation fähig ist. Man setze nämlich

$$\frac{\sin t}{\sqrt{1 - 2a\cos t + a^2}} = \sin u \tag{5}$$

wo $u$ eine neue Variable ist, so findet man zuvörderst sehr leicht:

$$\frac{1}{\sqrt{1 - a^2 \sin^2 u}} = \frac{\sqrt{1 - 2a\cos t + a^2}}{1 - a\cos t}. \tag{6}$$

Durch Differenziation der Gleichung

$$u = \operatorname{Arcsin} \frac{\sin t}{\sqrt{1 - 2a\cos t + a^2}}$$

ergiebt sich ferner

$$du = \frac{(1 - a\cos t)\, dt}{1 - 2a\cos t + a^2} \tag{7}$$

Digitized by Google

und durch Multiplikation der Gleichungen (6) und (7)

$$\frac{dt}{\sqrt{1-2a\cos t+a^2}}=\frac{du}{\sqrt{1-a^2\sin^2 u}}.$$

Substituiren wir diess und Nr. (5) in das Integral (4) oder (3), so wird jetzt

$$\int_0^\pi \frac{\cos nt\,dt}{\sqrt{1-2a\cos t+a^2}}=a^n\int_0^\pi \frac{\sin^{2n}u\,du}{\sqrt{1-a^2\sin^2 u}} \qquad (8)$$

Diese spezielle Transformation hat bereits Légendre gefunden *). Um den Werth des Integrales rechts zu bestimmen, muss man entweder zu elliptischen Funktionen oder zu unendlichen Reihen seine Zuflucht nehmen. Das letztere geht auf verschiedene Weise. So hat man, da im Integrale $a<1$ vorausgesetzt werden muss,

$$\frac{1}{\sqrt{1-a^2\sin^2 u}}=1+\tfrac{1}{2}a^2\sin^2 u+\frac{1.3}{2.4}a^4\sin^4 u+\ldots\ldots$$

und folglich das Integral auf der rechten Seite in (8)

$$\left.\begin{aligned}&=\int_0^\pi \sin^{2n}u\,du+\tfrac{1}{2}a^2\int_0^\pi \sin^{2n+2}u\,du\\&\qquad+\frac{1.3}{2.4}a^4\int_0^\pi \sin^{2n+4}u\,du+\ldots\ldots\end{aligned}\right\} \qquad (9)$$

Die einzelnen hier vorkommenden Integrale stehen unter der Form

$$\int_0^\pi \sin^{2n+2p}u\,du=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n+2p}u\,du$$

indem man nur zu bemerken braucht, dass $\sin^{2n+2p}u$ von $u=\frac{\pi}{2}$ bis $u=\pi$ die nämlichen Werthe annimmt, die es von $u=0$ bis $u=\frac{\pi}{2}$

*) *Traité des fonctions elliptiques, Tome II, page* 536, *formule* (10).

Digitized by Google

schon einmal gehabt hat. Andererseits ist bekanntlich für ein ganzes positives $m$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2m} u\, du = \frac{1.3.5\,..\,(2m-1)}{2.4.6\,..\,(2m)} \cdot \frac{\pi}{2}$$

und wenn man diess für die Reihe (9) in Anwendung bringt, so findet man sogleich nach Nr. (8)

$$\int_0^{\pi} \frac{\cos nt\, dt}{\sqrt{1-2a\cos t+a^2}} = \pi \frac{1.3.5\,..\,(2n-1)}{2.4.6\,..\,(2n)} a^n \left\{1 + \frac{1}{2}\frac{2n+1}{2n+2} a^2 + \frac{1.3}{2.4}\cdot\frac{(2n+1)(2n+3)}{(2n+2)(2n+4)} a^4 + \ldots\ldots\right\}.$$

Die Reihe convergirt indess nur langsam, namentlich bei sehr grossen $n$; eine brauchbarere dagegen findet man durch die Bemerkung, dass

$$\frac{1}{\sqrt{1-a^2\sin^2 t}} = \frac{1}{\sqrt{1-a^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\frac{a^2\cos^2 t}{1-a^2}}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-a^2}} \left\{1 - \frac{1}{2}\frac{a^2}{1-a^2}\cos^2 t + \frac{1.3}{2.4}\left(\frac{a^2}{1-a^2}\right)^2 \cos^4 t - \ldots\ldots\right\}$$

etc. ist, wo es nun nach Multiplikation mit $\sin^{2n} u\, du$ und Integration nur darauf ankommt, ein Integral von der Form

$$\int_0^{\pi} \sin^{2n} u \cos^{2p} u\, du = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} u \cos^{2p} u\, du \qquad (10)$$

seinem Werthe nach zu bestimmen. Diess ist aber sehr leicht; setzt man nämlich $\sin^2 u = z$, so findet man, dass das Integral rechts auch gleich ist:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 u)^{n-\frac{1}{2}} (1-\sin^2 u)^{p-\frac{1}{2}} 2\sin u\, \cos u\, du$$

$$= \int_0^1 z^{n-\frac{1}{2}} (1-z)^{p-\frac{1}{2}}\, dz$$

Digitized by Google

dessen Werth bekanntlich durch

$$\frac{1.3.5\,..\,(2n-1)\,.\,1.3.5\,...\,(2p-1)}{2.4.6\,...\,(2n+2p)}\,\pi$$

ausgedrückt wird, wofür man auch

$$\frac{1.3.5\,..\,(2n-1)}{2.4.6\,...\,(2n)}\cdot\frac{1.3.5\,...\,(2p-1)}{(2n+2)\,(2n+4)\,...\,(2n+2p)}\,\pi$$

schreiben kann. In so fern hierdurch jedes Integral von der in (10) angegebenen Form seinen Werth findet, hat man nun nach dem Vorhergehenden

$$\int_0^{\pi}\frac{\cos nt\,dt}{\sqrt{1-2a\cos t+a^2}}$$

$$=\frac{1.3.5\,..\,(2n-1)}{2.4.6\,...\,(2n)}\cdot\frac{\pi\,a^n}{\sqrt{1-a^2}}\left\{1-\frac{1}{2}\,\frac{1}{2n+2}\left(\frac{a^2}{1-a^2}\right)\right.$$

$$\left.+\,\frac{1.3}{2.4}\cdot\frac{1.3}{(2n+2)\,(2n+4)}\left(\frac{a^2}{1-a^2}\right)^2-....\right\}.$$

Diese Reihe convergirt sehr stark, wenn $\frac{a^2}{1-a^2}<1$, d. h. $a<\sqrt{\frac{1}{2}}$ und $n$ eine grosse Zahl ist. — Will man also die Coeffizienten in der Gleichung

$$\left.\begin{aligned}&\frac{1}{\sqrt{1-2a\cos x+a^2}}\\&=\tfrac{1}{2}A_0+A_1\cos x+A_2\cos 2x+A_3\cos 3x+....\end{aligned}\right\}\quad(11)$$

bestimmen, so ist nach dem eben entwickelten Resultate:

$$A_n=\frac{1.3\,..\,(2n-1)}{2.4\,...\,(2n)}\,\frac{2a^n}{\sqrt{1-a^2}}\left\{1-\frac{1}{2}\,\frac{1}{2n+2}\left(\frac{a^2}{1-a^2}\right)\right.$$

$$\left.+\,\frac{1.3}{2.4}\cdot\frac{1.3}{(2n+2)\,(2n+4)}\left(\frac{a^2}{1-a^2}\right)^2-....\right\}.\qquad(12)$$

Digitized by Google

## §. 8.

Wir kehren nach dieser Digression zu den Formeln

$$\left.\begin{aligned} f(x) &= \tfrac{1}{2}A_0 + A_1 \cos x + A_2 \cos 2x + A_3 \cos 3x + \ldots . \\ A_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\cos nt\,dt \end{aligned}\right\} \quad (1)$$

$$\left.\begin{aligned} f(x) &= B_1 \sin x + B_2 \sin 2x + B_3 \sin 3x + \ldots . \\ B_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\sin nt\,dt \end{aligned}\right\} \quad (2)$$

zurück, um zu zeigen, wie sich dieselben so weit ausdehnen lassen, dass $x$ nicht mehr zwischen den Gränzen 0 und $\pi$ eingeschlossen zu sein braucht, sondern sich in dem ganz beliebigen Spielraume $-c$ bis $+c$ bewegen darf, sobald man nur eine Transformation mit den obigen Formeln vornimmt.

Die Gleichung (1) gilt, wie wir wissen, von $x=0$ bis $x=+\pi$, würde aber auch von $x=0$ bis $x=-\pi$ noch richtig bleiben, wenn $f(-x)$ zufällig $=f(x)$ wäre. Es ist sehr leicht, für $f(x)$ eine ganz allgemeine Substitution zu treffen, bei welcher die genannte Eigenschaft stattfindet, nämlich die folgende

$$f(x) = \frac{q(x) + q(-x)}{2}$$

worin $q$ eine ganz willkührliche Funktion bezeichnen darf. Es wird jetzt

$$A_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} q(t)\cos nt\,dt + \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} q(-t)\cos nt\,dt$$

und hier geht das zweite Integral durch die Substitution $t=-t'$ in

$$-\frac{1}{\pi}\int_0^{-\pi} q(t')\cos nt'\,dt' = +\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} q(t)\cos nt\,dt$$

über, wenn man berücksichtigt, dass in einem bestimmten Integrale

Digitized by Google

die Wahl des Integrationsbuchstabens ganz gleichgültig ist. Der Werth von $A_n$ gestaltet sich jetzt wie folgt

$$A_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \varphi(t)\cos nt\,dt \tag{3}$$

und nun gilt die Gleichung

$$\left.\begin{aligned}&\frac{\varphi(x) + \varphi(-x)}{2}\\ &= \tfrac{1}{2}A_0 + A_1\cos x + A_2\cos 2x + A_3\cos 3x + \ldots\end{aligned}\right\} \tag{4}$$

von $x = -\pi$ bis $x = +\pi$.

Die Formel (2) besteht nur für $\pi > x > 0$, sie würde aber auch für $x = 0$ und negative $x$ richtig bleiben, wenn die Funktion $f(x)$ die Eigenschaften $f(0) = 0$, $f(-x) = -f(x)$ besässe. Diesen Bedingungen genügt die Annahme

$$f(x) = \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{2}$$

bei welcher

$$B_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \varphi(t)\sin nt\,dt - \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \varphi(-t)\sin nt\,dt$$

wird. Für $t = -t'$ tritt hier die Umformung

$$-\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \varphi(-t)\sin nt\,dt = -\frac{1}{\pi}\int_0^{-\pi} \varphi(t')\sin nt'\,dt'$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} \varphi(t)\sin nt\,dt$$

ein, durch die man

$$B_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \varphi(t)\sin nt\,dt \tag{5}$$

erhält. Für die so bestimmten Werthe der Coeffizienten gilt nun die Gleichung:

Digitized by Google

$$\left.\begin{aligned}\frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{2} \\ = B_1 \sin x + B_2 \sin 2x + B_3 \sin 3x + \ldots .\end{aligned}\right\} \quad (6)$$

unter der erweiterten Bedingung $\pi > x > -\pi$.

Addiren wir jetzt die Gleichungen (4) und (6), wobei wieder $f$ an die Stelle von $\varphi$ treten möge, so wird

$$\left.\begin{aligned}f(x) = \tfrac{1}{2}A_0 + A_1 \cos x + A_2 \cos 2x + A_3 \cos 3x + \ldots \\ + B_1 \sin x + B_2 \sin 2x + B_3 \sin 3x + \ldots\end{aligned}\right\} \quad (7)$$

wobei die Coeffizienten durch die Formeln

$$A_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt\, dt\,, \quad B_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt\, dt \qquad (8)$$

bestimmt werden. Die Gleichung (7) gilt für alle Werthe von $x$, welche innerhalb des Intervalles $-\pi$ bis $+\pi$ liegen, für $x = \pm\pi$ dagegen ist nicht $f(\pi)$, sondern $\frac{f(\pi) + f(-\pi)}{2}$ die Summe der fraglichen Reihe.

Um endlich die Formeln (1), (2) und (7) auf ein beliebiges Intervall ausdehnen zu können, setzen wir $\frac{nx}{c}$ und $\frac{nt}{c}$ für $x$ und $t$, zugleich nehmen wir $f(\frac{nx}{c}) = \varphi(x)$, wobei $\varphi$ eine noch ganz willkührliche Funktion bleibt.

Die Gränzen für die Gültigkeit der Formel (1), nämlich $\pi \geqq x \geqq 0$, gehen jetzt in

$$\pi \geqq \frac{nx}{c} \geqq 0 \quad \text{d. i.} \quad c \geqq x \geqq 0$$

über, und bilden nun die Gränzen für die Gültigkeit der neuen Formel:

$$\varphi(x) = \tfrac{1}{2}A_0 + A_1 \cos\frac{nx}{c} + A_2 \cos\frac{2nx}{c} + \ldots . \qquad (9)$$

Digitized by Google

Irgend ein Coeffizient ist hier wegen $f(\frac{nt}{c}) = \varphi(t)$

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int \varphi(t) \cos\frac{nnt}{c}\, d\left(\frac{nt}{c}\right)$$

wobei die Integrationsgränzen, welche für das frühere $t$ Null und $\pi$ waren, jetzt durch die Gleichungen $\frac{nt}{c} = 0$, $\frac{nt}{c} = \pi$ bestimmt werden. Es ergiebt sich so:

$$A_n = \frac{2}{c} \int_0^c \varphi(t) \cos\frac{nnt}{c}\, dt\,. \tag{10}$$

Nimmt man ganz dieselben Transformationen mit der Formel (2) vor, so findet man ebenso leicht

$$\varphi(x) = B_1 \sin\frac{\pi x}{c} + B_2 \sin\frac{2\pi x}{c} + B_3 \sin\frac{3\pi x}{c} + \ldots. \tag{11}$$

gültig unter der Bedingung $c > x > 0$, wobei

$$B_n = \frac{2}{c} \int_0^c \varphi(t) \sin\frac{nnt}{c}\, dt \tag{12}$$

ist. Endlich giebt die Gleichung (7) auf dieselbe Weise behandelt:

$$\left.\begin{aligned} \varphi(x) = \tfrac{1}{2}A_0 + A_1 \cos\frac{\pi x}{c} + A_2 \cos\frac{2\pi x}{c} + \ldots. \\ + B_1 \sin\frac{\pi x}{c} + B_2 \sin\frac{2\pi x}{c} + B_3 \sin\frac{3\pi x}{c} + \ldots. \end{aligned}\right\} \tag{13}$$

$$A_n = \frac{1}{c} \int_{-c}^{c} \varphi(t) \cos\frac{nnt}{c}\, dt\,, \quad B_n = \frac{1}{c} \int_{-c}^{c} \varphi(t) \sin\frac{nnt}{c}\, dt \tag{14}$$

wobei die Gültigkeit der Formel (13) an die Bedingung $c > x > -c$ gebunden ist, vermöge deren man die Formel selbst auf jedes beliebige noch so grosse Intervall ausdehnen kann.



Digitized by Google

## §. 9.

Aus der in §. 5 gegebenen Darstellung geht hervor, dass die gesammte Theorie derjenigen Reihen, welche nach den Cosinus oder Sinus der Vielfachen eines Bogens fortschreiten, nur ein einfaches Beispiel für die Regeln bildet, nach denen man den Gränzwerth des Integrales

$$\int_0^c \frac{\sin kt}{\sin t} f(t)\, dt$$

für unendlich wachsende $k$ bestimmt. Die grosse Allgemeinheit, welche diesen Regeln inwohnt, liess erwarten, dass durch einen geschickten Griff sich auch noch andere Anwendungen derselben vermitteln lassen würden, wodurch man auf Sätze kommen muss, die mit den bisher entwickelten eine gewisse Familienähnlichkeit haben werden. Diese Hoffnung ist durch Lejeune Dirichlet erfüllt worden, indem er durch eine elegante Analyse gezeigt hat, dass wenn die Summe einer endlichen oder unendlichen Reihe von der Form

$$C_0 + C_1 \cos x + C_2 \cos 2x + C_3 \cos 3x + \ldots.$$

bekannt ist, auch immer die Summen der beiden Reihen

$$C_0 + C_1 \cos \omega + C_2 \cos 4\omega + C_3 \cos 9\omega + \ldots.$$
$$C_1 \sin \omega + C_2 \sin 4\omega + C_3 \sin 9\omega + C_4 \sin 16\omega + \ldots.$$

worin $\omega$ einen aliquoten Theil der Kreisperipherie bezeichnet, gefunden werden können *). Nennt man die bisher betrachteten Reihen: Cosinus- oder Sinusreihen erster Stufe, so lässt sich das Dirichlet'sche Theorem als eine Summenformel für die Cosinus- und Sinusreihen zweiter Stufe bezeichnen, in so fern hier die Vielfachen des Bogens eine arithmetische Reihe zweiter Ordnung bilden. Bei dem Interesse, was dieser Gegenstand hat, glauben wir die Theorie der Cosinus- und Sinusreihen nicht besser als durch eine Darstellung der genannten Untersuchung beschliessen zu können.

---

*) *Abhandlungen der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre* 1835, erschienen 1837; oder: *Crelle's Journal, Band* 17.

Digitized by Google

Der erste Schritt derselben besteht in der einfachen Bemerkung, dass die Werthe der beiden Integrale

$$\int_0^\infty \frac{\cos z}{\sqrt{z}}\,dz = a \quad \text{und} \quad \int_0^\infty \frac{\sin z}{\sqrt{z}}\,dz = b \tag{1}$$

nothwendig endliche Grössen sind; man weiss zwar aus der Theorie der Gammafunktionen, dass $\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ der gemeinschaftliche Werth der in Rede stehenden Integrale ist, kann aber auch hiervon ganz abstrahiren, weil sich die Grössen $a$ und $b$ durch die nachfolgende Analyse von selbst bestimmen. Ihre Endlichkeit erkennt man leicht durch Zerlegung der obigen Integrale in andere von solchen Integrationsintervallen, dass $\cos z$ oder $\sin z$ innerhalb derselben ihre jedesmaligen Vorzeichen nicht wechseln. So ist:

$$a = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos z}{\sqrt{z}}\,dz + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{\cos z}{\sqrt{z}}\,dz + \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{2}} \frac{\cos z}{\sqrt{z}}\,dz + \ldots.$$

und wenn man im zweiten Integrale $z = \frac{\pi}{2} + y$, im dritten $z = \frac{3\pi}{2} + y$, etc. setzt, so ergiebt sich sehr leicht

$$a = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos z}{\sqrt{z}}\,dz - \int_0^{\pi} \left\{ \frac{1}{\sqrt{\frac{\pi}{2} + y}} - \frac{1}{\sqrt{\frac{3\pi}{2} + y}} + \ldots \right\} \sin y\,dy.$$

Da $\cos z$ die Einheit nicht übersteigt, so folgt, dass das erste Integral nicht mehr als

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dz}{\sqrt{z}} = 2\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

Digitized by Google

betragen kann; im zweiten Integrale ist die Summe der in Parenthese stehenden Reihe offenbar eine positive Grösse und

$$< \frac{1}{\sqrt{\frac{\pi}{2} + y}} \quad \text{also um so mehr} \quad < \frac{1}{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}$$

und mithin beträgt der Werth des fraglichen Integrales weniger als

$$\frac{1}{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} \int_0^{\pi} \sin y \, dy = 2\sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

Hieraus folgt sogleich, dass $a$ eine endliche Grösse ist.

Auf ähnliche Weise überzeugt man sich von der Endlichkeit des $b$, indem man das betreffende Integral in andere Integrale zerlegt, welche die Intervalle 0 bis $\pi$, $\pi$ bis $2\pi$, $2\pi$ bis $3\pi$, etc. umfassen und im zweiten Integrale $z = \pi + x$, im dritten: $z = 2\pi + x$ u. s. f. substituirt.

Nimmt man in den Integralen unter Nr. (1) $z = t^2$, so gehen dieselben in

$$2\int_0^{\infty} \cos(t^2)\, dt = a, \quad 2\int_0^{\infty} \sin(t^2)\, dt = b$$

über, wofür man auch schreiben kann:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos(t^2)\, dt = a, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \sin(t^2)\, dt = b$$

weil die Funktionen $\cos(t^2)$ und $\sin(t^2)$ von $t = 0$ bis $t = -\infty$ dieselben Werthe haben, wie von $t = 0$ bis $t = +\infty$. Setzt man ferner $t = u + p$, wo $u$ die neue Variable, $p$ eine arbiträre Constante ist, so ändern sich die Integrationsgränzen nicht, und wenn man $\cos[(p+u)^2] = \cos[(p^2 + u^2) + 2pu]$ zerlegt, so wird:

Digitized by Google

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos(p^2+u^2)\cos 2pu\,du \;-\; \int_{-\infty}^{\infty} \sin(p^2+u^2)\sin 2pu\,du = a$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sin(p^2+u^2)\cos 2pu\,du \;+\; \int_{-\infty}^{\infty} \cos(p^2+u^2)\sin 2pu\,du = b\,.$$

Hier verschwinden diejenigen Integrale, in welchen $\sin 2pu$ vorkommt; denn denkt man sich jedes derselben in zwei andere von $u=0$ bis $u=\infty$ und $u=0$ bis $u=-\infty$ zerlegt, so hebt das zweite das erste auf, weil $\sin(p^2+u^2)\sin 2pu$ und $\cos(p^2+u^2)\sin 2pu$ die Eigenschaft $\varphi(-u) = -\varphi(u)$ besitzen. Es bleiben daher in den obigen Gleichungen nur die jedesmalig ersten Integrale stehen, in welchen man $\cos(p^2+u^2)$ und $\sin(p^2+u^2)$ zerlegen kann. Diess giebt:

$$\cos(p^2)\int_{-\infty}^{\infty} \cos(u^2)\cos 2pu\,du \;-\; \sin(p^2)\int_{-\infty}^{\infty} \sin(u^2)\cos 2pu\,du = a$$

$$\sin(p^2)\int_{-\infty}^{\infty} \cos(u^2)\cos 2pu\,du \;+\; \cos(p^2)\int_{-\infty}^{\infty} \sin(u^2)\cos 2pu\,du = b$$

und wenn man hieraus die beiden unbekannten Integrale eliminirt, so erhält man leicht:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos(u^2)\cos 2pu\,du = a\cos(p^2) + b\sin(p^2)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sin(u^2)\cos 2pu\,du = b\cos(p^2) - a\sin(p^2)$$

und für

$$p = n\sqrt{\omega}\,, \quad u = \frac{x}{2\sqrt{\omega}}$$

wo $n$ und $\omega$ constante Grössen bedeuten,

Digitized by Google

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos\left(\frac{x^2}{4\omega}\right) \cos nx \, dx = 2\sqrt{\omega}\left[a\cos(n^2\omega) + b\sin(n^2\omega)\right] \quad (2)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sin\left(\frac{x^2}{4\omega}\right) \cos nx \, dx = 2\sqrt{\omega}\left[b\cos(n^2\omega) - a\sin(n^2\omega)\right]. \quad (3)$$

Es sei nun eine Reihensummirung in der Art gegeben, dass

$$F(x) = C_0 + C_1 \cos x + C_2 \cos 2x + C_3 \cos 3x + \ldots. \quad (4)$$

ist, worin $F(x)$ eine bekannte Funktion bezeichnet, und zur Abkürzung sei

$$H = C_0 + C_1 \cos\omega + C_2 \cos 4\omega + C_3 \cos 9\omega + \ldots. \quad (5)$$

$$K = C_1 \sin\omega + C_2 \sin 4\omega + C_3 \sin 9\omega + \ldots. \quad (6)$$

so ist es sehr leicht, $H$ und $K$ in bestimmte Integrale zu verwandeln. Multiplizirt man nämlich die Gleichungen (2) und (3) mit $C_n$, setzt hierauf $n = 0, 1, 2, 3$, etc. und addirt Alles so entstehende, so ergiebt sich sogleich

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos\left(\frac{x^2}{4\omega}\right) F(x)\, dx = 2\sqrt{\omega}\left[aH + bK\right] \quad (7)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sin\left(\frac{x^2}{4\omega}\right) F(x)\, dx = 2\sqrt{\omega}\left[bH - aK\right] \quad (8)$$

woraus man $H$ und $K$ eliminiren könnte, was wir aber bis zuletzt versparen wollen. Berücksichtigt man noch, dass der Bedeutung von $F(x)$ nach $F(-x) = F(x)$ ist und die Funktionen $\cos\left(\frac{x^2}{4\omega}\right)$ und $\sin\left(\frac{x^2}{4\omega}\right)$ für negative $x$ dieselben bleiben, wie für positive $x$, so kann man die vorigen Gleichungen auch in der folgenden Form darstellen:

Digitized by Google

$$\int_0^{\infty} cos\left(\frac{x^2}{4\omega}\right) F(x)\,dx = \sqrt{\omega}\,\left[aH + bK\right] \tag{9}$$

$$\int_0^{\infty} sin\left(\frac{x^2}{4\omega}\right) F(x)\,dx = \sqrt{\omega}\,\left[bH - aK\right] \tag{10}$$

und hier können wir die Integrale als die Gränzwerthe ansehen, denen sich die nachstehenden

$$\int_0^{(4r+1)\pi} cos\left(\frac{x^2}{4\omega}\right) F(x)\,dx \quad \text{und} \quad \int_0^{(4r+1)\pi} sin\left(\frac{x^2}{4\omega}\right) F(x)\,dx \tag{11}$$

für unendlich wachsende $r$ nähern. Aus dieser Bemerkung ergiebt sich mit Leichtigkeit ein Mittel um die Werthe der fraglichen Integrale zu finden.

I. Zuvörderst übersieht man sogleich die Richtigkeit der folgenden Zerlegung:

$$\int_0^{(4r+1)\pi} cos\left(\frac{x^2}{4\omega}\right) F(x)\,dx = \int_0^{\pi} cos\left(\frac{x^2}{4\omega}\right) F(x)\,dx + \int_{\pi}^{3\pi} cos\left(\frac{x^2}{4\omega}\right) F(x)\,dx$$

$$+ \int_{3\pi}^{5\pi} cos\left(\frac{x^2}{4\omega}\right) F(x)\,dx + \ldots + \int_{(4r-1)\pi}^{(4r+1)\pi} cos\left(\frac{x^2}{4\omega}\right) F(x)\,dx \tag{12}$$

wobei alle Integrale rechts mit Ausschluss des ersten von der Form

$$\int_{(2q-1)\pi}^{(2q+1)\pi} cos\left(\frac{x^2}{4\omega}\right) F(x)\,dx \tag{13}$$

sind und daraus hervorgehen, wenn man $q = 1, 2, \ldots 2r$ setzt. Für $x = 2q\pi + y$ verwandelt sich dieses Integral in:

Digitized by Google

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos\left(\frac{4q^2\pi^2 + 4q\pi y + y^2}{4\omega}\right) F(y)\,dy$$

wenn man bemerkt, dass der Bedeutung von $F(x)$ zufolge $F(2q\pi + y) = F(y)$ ist. Zerlegt man dieses wieder in

$$\int_{-\pi}^{0} \cos\left(\frac{4q^2\pi^2 + 4q\pi y + y^2}{4\omega}\right) F(y)\,dy + \int_{0}^{\pi} \cos\left(\frac{4q^2\pi^2 + 4q\pi y + y^2}{4\omega}\right) F(y)\,dy$$

und setzt im ersten Integrale $y = -x$, im zweiten $y = x$, so wird $F(-x) = F(x)$, beide Integrale erhalten gleiche Gränzen und können dann in ein einziges zusammengezogen werden, nämlich

$$\int_{0}^{\pi} \left\{\cos\left(\frac{4q^2\pi^2 + x^2 - 4q\pi x}{4\omega}\right) + \cos\left(\frac{4q^2\pi^2 + x^2 + 4q\pi x}{4\omega}\right)\right\} F(x)\,dx$$

das unter Anwendung der Formel

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\,\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

sich wie folgt gestaltet:

$$2\int_{0}^{\pi} F(x)\,\cos\left(\frac{4q^2\pi^2 + x^2}{4\omega}\right)\,\cos\frac{q\pi x}{\omega}\,dx\,.$$

Nehmen wir hierin $q = 1, 2, 3, \ldots (2r)$ so erhalten wir die in Nr. (12) vorkommenden Integrale, mit Ausschluss des ersten, in solcher Form, dass jetzt überall gleiche Integrationsgränzen stehen; man kann daher die Integrale in das folgende einzige zusammenziehen

$$\int_{0}^{(4r+1)\pi} \cos\left(\frac{x^2}{4\omega}\right) F(x)\,dx = \int_{0}^{\pi} X F(x)\,dx \qquad (14)$$

Digitized by Google

worin zur Abkürzung

$$X = \cos\left(\frac{x^2}{4\omega}\right) + 2\cos\left(\frac{4\cdot 1^2\pi^2 + x^2}{4\omega}\right)\cos\frac{\pi x}{\omega}$$
$$+ 2\cos\left(\frac{4\cdot 2^2\pi^2 + x^2}{4\omega}\right)\cos\frac{2\pi x}{\omega}$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$+ 2\cos\left(\frac{4\cdot \overline{2r}^2\pi^2 + x^2}{4\omega}\right)\cos\frac{\overline{2r}\,\pi x}{\omega} \qquad (15)$$

gesetzt worden ist. Es würde nun darauf ankommen, diese Reihe zu summiren. So lange $\omega$ ein ganz beliebiger Bogen ist, lässt sich aber diese Aufgabe nicht gut lösen, dagegen wird diess möglich, wenn man für $\omega$ einen aliquoten Theil der Kreisperipherie, also etwa $\omega = \frac{2\pi}{n}$ nimmt, wo $n$ eine positive ganze Zahl bedeutet. Das allgemeine Glied der Reihe (5), nämlich der Ausdruck

$$2\cos\left(\frac{q^2\pi^2}{\omega} + \frac{x^2}{4\omega}\right)\cos q\frac{\pi x}{\omega}$$

stellt sich in diesem Falle unter die Form:

$$2\cos\left(\frac{q^2 n}{2}\pi + \frac{nx^2}{8\pi}\right)\cos q\frac{nx}{2}. \qquad (16)$$

Hier sind hinsichtlich der von 0 bis $2r$ gehenden Zahl $q$ zwei Fälle zu unterscheiden, für ein gerades $q$ ist nämlich $q^2$ und ebenso $q^2 n$ von der Form $4p$, dadurch wird $\frac{q^2 n}{2}\pi$ zu einem geraden Vielfachen von $\pi$ und mithin der Ausdruck in (16)

$$= 2\cos\left(\frac{nx^2}{8\pi}\right)\cos q\frac{nx}{2}. \qquad (17)$$

Für ein ungerades $q$ dagegen steht $q^2$ unter der Form $4p+1$,



Digitized by Google

mithin $q^2 n$ unter der Form $4p' + n$, dadurch wird $\frac{q^2 n}{2}\pi = 2p'\pi + \frac{n\pi}{2}$ und der Ausdruck in (16)

$$2\cos\left(\frac{n\pi}{2} + \frac{nx^2}{8\pi}\right).\cos q\frac{nx}{2}. \qquad (18)$$

Da nun die Reihe $X$ dadurch gebildet wird, dass $q = 0, 1, 2, \ldots (2r)$ gesetzt und Alles addirt wird, wobei man aber das erste Glied nur halb nimmt, so ist in unserem Falle Alles zusammen zu nehmen, was aus Nr. (17) für $q = 0, 2, 4, 6, \ldots (2r)$ und aus Nr. (18) für $q = 1, 3, 5, \ldots (2r-1)$ hervorgeht; die fragliche Reihe $X$ erscheint dann als die Summe der beiden folgenden Reihen:

$$2\cos\left(\frac{nx^2}{8\pi}\right)\left[\tfrac{1}{2} + \cos nx + \cos 2nx + \ldots + \cos rnx\right] \qquad (19)$$

und

$$2\cos\left(\frac{n\pi}{2} + \frac{nx^2}{8\pi}\right)\left[\cos\frac{nx}{2} + \cos 3\frac{nx}{2} + \ldots + \cos(2r-1)\frac{nx}{2}\right]. \qquad (20)$$

Ihre Summen ergeben sich unmittelbar aus den bekannten Formeln

$$\tfrac{1}{2} + \cos u + \cos 2u + \ldots + \cos ru = \frac{\sin(2r+1)\frac{u}{2}}{2\sin\frac{u}{2}}$$

und

$$\cos u + \cos 3u + \cos 5u + \ldots + \cos(2r-1)u$$
$$= \frac{\sin(2r+1)u}{2\sin u}\cos u - \frac{\cos(2r+1)u}{2}.$$

Man findet nämlich, wenn $k$ zur Abkürzung für $2r+1$ dient,

Digitized by Google

$$X = \frac{\sin k\frac{nx}{2}}{\sin\frac{nx}{2}} \cos\left(\frac{nx^2}{8\pi}\right)$$

$$+ \frac{\sin k\frac{nx}{2}}{\sin\frac{nx}{2}} \cos\left(\frac{n\pi}{2} + \frac{nx^2}{8\pi}\right) \cos\frac{nx}{2}$$

$$- \cos k\frac{nx}{2} \cos\left(\frac{n\pi}{2} + \frac{nx^2}{8\pi}\right)$$

und folglich

$$\int_0^\pi XF(x)\,dx = \int_0^\pi \frac{\sin k\frac{nx}{2}}{\sin\frac{nx}{2}} F(x) \cos\left(\frac{nx^2}{8\pi}\right) dx$$

$$+ \int_0^\pi \frac{\sin k\frac{nx}{2}}{\sin\frac{nx}{2}} F(x) \cos\left(\frac{n\pi}{2} + \frac{nx^2}{8\pi}\right) \cos\frac{nx}{2}\,dx$$

$$- \int_0^\pi \cos k\frac{nx}{2}\, F(x) \cos\left(\frac{n\pi}{2} + \frac{nx^2}{8\pi}\right) dx$$

oder wenn man rechts $\frac{nx}{2} = t$ d. i. $x = \frac{2t}{n}$ setzt

$$\int_0^\pi XF(x)\,dx = \frac{2}{n}\int_0^{\frac{1}{2}n\pi} \frac{\sin kt}{\sin t} F\left(\frac{2t}{n}\right) \cos\left(\frac{t^2}{2n\pi}\right) dt$$

$$+ \frac{2}{n}\int_0^{\frac{1}{2}n\pi} \frac{\sin kt}{\sin t} F\left(\frac{2t}{n}\right) \cos\left(\frac{n\pi}{2} + \frac{t^2}{2n\pi}\right) \cos t\,dt$$

$$- \frac{2}{n}\int_0^{\frac{1}{2}n\pi} \cos kt\, F\left(\frac{2t}{n}\right) \cos\left(\frac{n\pi}{2} + \frac{t^2}{2n\pi}\right) dt\,.$$

Digitized by Google

Denken wir uns an der Stelle des Integrales links dasjenige, welches die linke Seite der Gleichung (14) bildet, und lassen jetzt $r$ und somit auch $2r+1=k$ ins Unendliche wachsen, so sind auf die Integrale rechts die Regeln der Paragraphen 2 und 3 anwendbar; man findet nämlich

$$\int_0^\infty \cos\left(\frac{x^2}{4\omega}\right) F(x)\,dx$$

$$= \frac{2\pi}{n}\left\{\tfrac{1}{2}F(0) + F\left(\frac{2\pi}{n}\right)\cos\left(\frac{1^2\pi}{2n}\right) + F\left(\frac{4\pi}{n}\right)\cos\left(\frac{2^2\pi}{2n}\right) + \ldots.\right\}$$

$$+ \frac{2\pi}{n}\left\{\tfrac{1}{2}F(0)\cos\frac{n\pi}{2} - F\left(\frac{2\pi}{n}\right)\cos\left(\frac{n\pi}{2} + \frac{1^2\pi}{2n}\right)\right.$$

$$\left. + F\left(\frac{4\pi}{n}\right)\cos\left(\frac{n\pi}{2} + \frac{2^2\pi}{2n}\right) - \ldots.\right\}$$

wobei die allgemeinen Formen der Glieder

$$F\left(\frac{2h\pi}{n}\right)\cos\left(\frac{h^2\pi}{2n}\right) \quad \text{und} \quad F\left(\frac{2h\pi}{n}\right)\cos\left(\frac{n\pi}{2} + \frac{h^2\pi}{2n}\right)$$

sind. Für das letzte Glied ist noch eine Unterscheidung nöthig; wenn nämlich $n$ gerade ist, so kann man $\frac{1}{2}n\pi = s\pi$ setzen und aus Formel (8) in §. 3 geht dann hervor, dass die letzten Glieder der beiden obigen Reihen diejenigen sind, welche $h=s$ entsprechen, aber nur zur Hälfte in Rechnung kommen; für ein ungerades $n$ dagegen wird $\frac{1}{2}n\pi = \frac{1}{2}(n-1)\pi + \frac{1}{2}\pi = s\pi + \frac{1}{2}\pi$ und nun entsprechen die letzten Glieder dem Falle $h=s$, aber ganz gerechnet, wie man aus Formel (9) in §. 3 erkennt. Schreibt man wieder $\omega$ für $\frac{2\pi}{n}$ und berücksichtigt die Gleichung (9), so folgt leicht

$$\left.\begin{aligned} &\frac{aH + bK}{\sqrt{\omega}} \\ &= \tfrac{1}{2}F(0) + F(\omega)\cos\left(\frac{1^2\omega}{4}\right) + F(2\omega)\cos\left(\frac{2^2\omega}{4}\right) + \ldots. \\ &+ \tfrac{1}{2}F(0)\cos\left(\frac{n^2}{\omega}\right) - F(\omega)\cos\left(\frac{n^2}{\omega} + \frac{1^2\omega}{4}\right) \\ &\qquad + F(2\omega)\cos\left(\frac{n^2}{\omega} + \frac{2^2\omega}{4}\right) - \ldots. \end{aligned}\right\} \quad (21)$$

wobei hinsichtlich des letzten Gliedes die obige Bemerkung gilt.

Digitized by Google

II. Ganz die nämlichen Transformationen sind auf das zweite Integral in Nr. (11) anwendbar. Man zerlegt dasselbe in andere Integrale von 0 bis $\pi$, $\pi$ bis $3\pi$, $3\pi$ bis $5\pi$ etc. und betrachtet die allgemeine Form derselben:

$$\int_{(2q-1)\pi}^{(2q+1)\pi} \cos\left(\frac{x^2}{4\omega}\right) F(x)\, dx$$

entsprechend Nr. (13). Durch ganz dieselben Transformationen, welche dort angewendet wurden, geht dasselbe in

$$2\int_0^{\pi} F(x)\, \sin\left(\frac{4q^2\pi^2 + x^2}{4\omega}\right)\, \cos\frac{q\pi x}{\omega}\, dx$$

über, welches auf eben dieselbe Weise benutzt wird, wie das frühere analoge Integral. Man findet zuletzt, dass es auf den Gränzwerth von

$$\frac{2}{n}\int_0^{\frac{1}{2}n\pi} \frac{\sin kt}{\sin t}\, F\left(\frac{2t}{n}\right)\, \sin\left(\frac{t^2}{2n\pi}\right)\, dt$$

$$+\ \frac{2}{n}\int_0^{\frac{1}{2}n\pi} \frac{\sin kt}{\sin t}\, F\left(\frac{2t}{n}\right)\, \sin\left(\frac{n\pi}{2} + \frac{t^2}{2n\pi}\right)\, cost\, dt$$

$$-\ \frac{2}{n}\int_0^{\frac{1}{2}n\pi} \cos kt\ F\left(\frac{2t}{n}\right)\, \sin\left(\frac{n\pi}{2} + \frac{t^2}{2n\pi}\right)\, dt$$

ankommt. So gelangt man am Ende zu der Gleichung:

$$\left.\begin{aligned} \frac{bH - aK}{\sqrt{\omega}} &= F(\omega)\, \sin\left(\frac{1^2\omega}{4}\right) + F(2\omega)\, \sin\left(\frac{2^2\omega}{4}\right) + F(3\omega)\, \sin\left(\frac{3^2\omega}{4}\right) + \ldots \\ &\quad + \tfrac{1}{2} F(0)\, \sin\left(\frac{n^2}{\omega}\right) - F(\omega)\, \sin\left(\frac{n^2}{\omega} + \frac{1^2\omega}{4}\right) \\ &\quad + F(2\omega)\, \sin\left(\frac{n^2}{\omega} + \frac{2^2\omega}{4}\right) - \ldots. \end{aligned}\right\} \quad (22)$$

Digitized by Google

wo hinsichtlich des letzten Gliedes beider Reihen die nämlichen Bemerkungen gelten, wie bei der Formel (21). Eliminirt man jetzt aus den Gleichungen (21) und (22) die Grössen $H$ und $K$, so findet man die Summen der Reihen, für welche $H$ und $K$ als Abkürzung dienten. Wählt man aber die ursprüngliche, durch $F(x)$ summirte Reihe so, dass man $H$ und $K$ a priori kennt, so gelangt man zur Kenntniss der Constanten $a$ und $b$. Diess Letztere ist der Fall, wenn man in der Reihe für $F(x)$, $C_0 = 1$, $C_1 = C_2 = C_3$ etc. $= 0$ nimmt. Es wird dann $F(x) = 1$, $H = 1$, $K = 0$; und mithin nach (21) und (22)

$$\frac{a}{\sqrt{\omega}} = \tfrac{1}{2} + \cos\left(\frac{1^2\omega}{4}\right) + \cos\left(\frac{2^2\omega}{4}\right) + \cos\left(\frac{3^2\omega}{4}\right) + \ldots.$$

$$+ \tfrac{1}{2}\cos\left(\frac{\pi^2}{\omega}\right) - \cos\left(\frac{\pi^2}{\omega} + \frac{1^2\omega}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi^2}{\omega} + \frac{2^2\omega}{4}\right) - \ldots.$$

und

$$\frac{b}{\sqrt{\omega}} = \sin\left(\frac{1^2\omega}{4}\right) + \sin\left(\frac{2^2\omega}{4}\right) + \sin\left(\frac{3^2\omega}{4}\right) + \ldots.$$

$$+ \tfrac{1}{2}\sin\left(\frac{\pi^2}{\omega}\right) - \sin\left(\frac{\pi^2}{\omega} + \frac{1^2\omega}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi^2}{\omega} + \frac{2^2\omega}{4}\right) - \ldots.$$

und diese Gleichungen müssen nun blosse Identitäten vorstellen, welchen Werth man auch $\omega = \frac{2\pi}{n}$ geben möge. Nimmt man ganz einfach $n = 1$, also $\omega = 2\pi$, so ergiebt sich

$$\frac{a}{\sqrt{2\pi}} = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\cos\frac{\pi}{2}, \quad \frac{b}{\sqrt{2\pi}} = \tfrac{1}{2}\sin\frac{\pi}{2}$$

d. i.

$$a = b = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

Um ein einfaches Beispiel zu haben, setzen wir

$$F(x) = 1 + \cos x + \cos 2x + \ldots + \cos(n-1)x$$

$$= \tfrac{1}{2} + \frac{\sin(n-\frac{1}{2})x}{2\sin\frac{1}{2}x}.$$

Digitized by Google

Es ist dann für ein ganzes positives $h$

$$F(h\omega) = \tfrac{1}{2} + \frac{sin\,(n-\tfrac{1}{2})\,\frac{2h\pi}{n}}{2\,sin\,\frac{h\pi}{n}}$$

$$= \tfrac{1}{2} + \frac{sin\left(2h\pi - \frac{h\pi}{n}\right)}{2\,sin\,\frac{h\pi}{n}}$$

d. i. wenn $n$ nicht in $h$ aufgeht, wie z. B. für $h < n$

$$F(h\omega) = 0\,.$$

Die Gleichungen (21) und (22) geben jetzt wegen $F(0) = n$

$$\frac{\sqrt{n}}{2}(H + K) = \frac{n}{2}\left(1 + cos\,\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$\frac{\sqrt{n}}{2}(H - K) = \frac{n}{2}\,sin\,\frac{n\pi}{2}$$

oder

$$H = \tfrac{1}{2}\left(1 + cos\,\frac{n\pi}{2} + sin\,\frac{n\pi}{2}\right)\sqrt{n}$$

$$K = \tfrac{1}{2}\left(1 + cos\,\frac{n\pi}{2} - sin\,\frac{n\pi}{2}\right)\sqrt{n}$$

und hiermit sind die Summen der Reihen

$$1 + cos\left(\frac{1^2 2\pi}{n}\right) + cos\left(\frac{2^2 2\pi}{n}\right) + \ldots + cos\left(\frac{\overline{n-1}^2\,2\pi}{n}\right)$$

$$sin\left(\frac{1^2 2\pi}{n}\right) + sin\left(\frac{2^2 2\pi}{n}\right) + \ldots + sin\left(\frac{\overline{n-1}^2\,2\pi}{n}\right)$$

gefunden, wobei man noch für $n$ die Fälle unterscheiden kann, in welchen es unter einer der vier allein möglichen Formen $4k$, $4k+1$, $4k+2$, $4k+3$ enthalten ist.

Digitized by Google

# Cap. II.

## *Die Fourier'schen Integrale.*

### §. 10.

Schon in §. 3 haben wir eine Formel kennen gelernt, mittelst deren sich eine beliebige Funktion einer Variablen in ein bestimmtes Doppelintegral verwandeln liess, welches die Veränderliche der Funktion als arbiträre Constante enthielt. Es ist nicht schwer noch mehrere derartige Beziehungen aufzustellen, indem man sich an das Theorem

$$Lim \int_0^c \frac{\sin kt}{t} F(t)\, dt = \frac{\pi}{2} F(0) \qquad (1)$$

hält, worin das Zeichen „*Lim*" sich auf das unendliche Wachsen von $k$ bezieht. Für diese Ableitung wird es indessen von Vortheil, nicht das obige Theorem unmittelbar, sondern ein etwas allgemeineres in Gebrauch zu nehmen, wonach man den Gränzwerth von

$$\int_a^b \frac{\sin kt}{t} f(x+t)\, dt$$

jederzeit leicht bestimmen kann. Ist hier nicht eine der Grössen $a$ oder $b$ der Null gleich, in welchem Falle man auf die Formel (1) zurückkommen würde, so macht sich die Unterscheidung nöthig, ob $a$ und $b$ gleiche Vorzeichen haben oder nicht, indem für diese zwei verschiedenen Fälle auch zwei ganz verschiedene Resultate zum Vorschein kommen.

Bei positiven $a$ und $b$ und $b > a > 0$ braucht man blos zu bemerken, dass

$$\int_a^b \frac{\sin kt}{t} f(x+t)\, dt$$

$$= \int_0^b \frac{\sin kt}{t} f(x+t)\, dt - \int_0^a \frac{\sin kt}{t} f(x+t)\, dt$$

Digitized by Google

ist und hieraus folgt unter Anwendung der Formel (I)

$$Lim \int_a^b \frac{\sin kt}{t} f(x+t)\,dt = \frac{\pi}{2} f(x+0) - \frac{\pi}{2} f(x+0) = 0 \quad (2)$$

und das Nämliche gilt auch für negative von Null verschiedene $a$ und $b$, weil man die Integrationsgränzen durch die Substitution $t = -t'$ sogleich wieder positiv machen, also diesen Fall sogleich auf den eben behandelten zurückführen kann.

Sind dagegen $a$ und $b$ von ungleichen Zeichen, etwa $b$ positiv und $a$ negativ, so schreibe man $-a$ für $a$ und es ist wieder

$$\int_{-a}^{b} \frac{\sin kt}{t} f(x+t)\,dt$$

$$= \int_0^b \frac{\sin kt}{t} f(x+t)\,dt - \int_0^{-a} \frac{\sin kt}{t} f(x+t)\,dt$$

und wenn man im zweiten Integrale für $t$ die neue Variable $-t'$ einführt

$$\int_{-a}^{b} \frac{\sin kt}{t} f(x+t)\,dt$$

$$= \int_0^b \frac{\sin kt}{t} f(x+t)\,dt + \int_0^a \frac{\sin kt'}{t'} f(x-t')\,dt'.$$

Die Anwendung des Theoremes (1) giebt hier sogleich

$$Lim \int_{-a}^{b} \frac{\sin kt}{t} f(x+t)\,dt = \pi \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} \quad (3)$$

also $\pi f(x)$, wenn die Funktion $f(x)$ für den Werth von $x$, den man gerade substituirt, stetig bleibt, dagegen, wenn sie eine Unterbrechung



Digitized by Google

der Continuität erleidet, das arithmetische Mittel aus den beiden ihr daselbst zukommenden Werthen multiplizirt mit der Ludolph'schen Zahl. Wäre dagegen $a$ positiv und $b$ negativ, so erhellt aus der Substitution $t = -t'$, dass dem absoluten Werthe nach das Nämliche, dem Vorzeichen nach das Entgegengesetzte zum Vorschein kommt.

Diese sehr einfachen Betrachtungen setzen uns in den Stand, die Werthe der doppelten Integrale

$$2\int_0^\infty \cos xu\, du \int_\alpha^\beta f(\vartheta)\cos u\vartheta\, d\vartheta \tag{4}$$

$$2\int_0^\infty \sin xu\, du \int_\alpha^\beta f(\vartheta)\sin u\vartheta\, d\vartheta \tag{5}$$

auf die folgende ungemein leichte Weise zu bestimmen.

I. Gemäss der Bedeutung, welche überhaupt ein Integral mit der Integrationsgränze $\infty$ hat, ist das Integral in (4) nichts Anderes als die *Limes*, welcher sich das folgende

$$2\int_0^k \cos xu\, du \int_\alpha^\beta f(\vartheta)\cos u\vartheta\, d\vartheta \tag{6}$$

für unendlich wachsende $k$ nähert. Kehren wir darin die Integrationsordnung um, so ist dasselbe auch

$$= \int_\alpha^\beta f(\vartheta)\, d\vartheta \int_0^k 2\cos\vartheta u \cos xu\, du \tag{7}$$

wobei sich die Integration nach $u$ ohne Schwierigkeit bewerkstelligen lässt, wenn man bemerkt, dass

$$\int_0^k 2\cos\vartheta u\cos xu\, du = \int_0^k \left[\cos(\vartheta - x)u + \cos(\vartheta + x)u\right] du$$

$$= \frac{\sin(\vartheta - x)k}{\vartheta - x} + \frac{\sin(\vartheta + x)k}{\vartheta + x}$$

ist. Das Doppelintegral (7) oder (6) zerfällt demnach in die beiden einfachen:

Digitized by Google

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\vartheta)\, d\vartheta \, \frac{\sin k\,(\vartheta - x)}{\vartheta - x} + \int_{\alpha}^{\beta} f(\vartheta)\, d\vartheta \, \frac{\sin k\,(\vartheta + x)}{\vartheta + x}$$

wobei wir im ersten $\vartheta - x = t$ und im zweiten $\vartheta + x = t$ setzen wollen, woraus immer $d\vartheta = dt$ folgt. Die vorstehenden Integrale werden durch diese zwei Substitutionen in die beiden nachstehenden verwandelt:

$$\int_{\alpha - x}^{\beta - x} \frac{\sin kt}{t} f(x + t)\, dt + \int_{\alpha + x}^{\beta + x} \frac{\sin kt}{t} f(-x + t)\, dt \qquad (8)$$

und diese Summe wäre der Werth von Nr. (6). Gehen wir jetzt zur Gränze für unendlich wachsende $k$ über, so erhalten wir den Werth des Integrales in Nr. (4). Hierzu sind indessen einige Unterscheidungen nöthig. Setzen wir nämlich $\alpha$, $\beta$, $x$ als positive Grössen, $\beta > \alpha > 0$ voraus, so kann $x < \alpha$, $x = \alpha$, $x > \alpha$ aber $< \beta$, $x = \beta$ und $x > \beta$ sein. In allen diesen Fällen convergirt das zweite Integral in Nr. (8) gegen die *Limes* Null, weil den gemachten Voraussetzungen nach $\alpha + x$ und $\beta + x$ positive von Null verschiedene Grössen sind. Im ersten Integrale fallen für $x < \alpha$ beide Integrationsgränzen positiv aus und folglich ist die betreffende *Limes* $= 0$; für $x = \alpha$ geht die untere Integrationsgränze $x - \alpha$ in Null über, folglich die Formel (1) anwendbar, welche $\frac{\pi}{2} f(\alpha + 0)$ giebt. Liegt $x$ zwischen $\alpha$ und $\beta$, so ist die untere Integrationsgränze negativ, die obere positiv und durch Anwendung des Theoremes (3) ergiebt $\frac{\pi}{2}\left[f(x - 0) + f(x + 0)\right]$. Für $x = \beta$ wird $\beta - x = 0$ und wenn man $t = -t'$ setzt, so kann man nachher wieder die Formel (1) benutzen, woraus sich $\frac{\pi}{2} f(\beta - 0)$ findet. Wenn endlich $x > \beta$ ist, so werden beide Integrationsgränzen gleichzeitig negativ und folglich verschwindet das zweite Integral nach Formel (2). — Erinnern wir uns nun, dass diese Resultate die jedesmaligen Werthe des Doppelintegrales (4) darstellen, dividiren jetzt mit $\pi$ und schreiben in (4) $t$ für $\vartheta$, so gelangen wir zu folgendem Theoreme:

Digitized by Google

Unter der Voraussetzung, dass $\beta > \alpha > 0$ und $x$ eine positive Grösse ist, hat das Doppelintegral

$$\frac{2}{\pi}\int_0^\infty \cos xu\,du \int_\alpha^\beta f(t)\cos ut\,dt \qquad (9)$$

den Werth $\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$ oder Null, je nachdem $x$ innerhalb oder ausserhalb des Intervalles $\alpha$ bis $\beta$ liegt; an den Gränzen desselben also für $x=\alpha$ oder $x=\beta$ gelten dagegen die Werthe $\frac{1}{2}f(\alpha+0)$ und $\frac{1}{2}f(\beta-0)$. Für negative $x$ finden diese Beziehungen nur dann statt, wenn zufällig $f(-x)=f(x)$ ist.

Eine kleine Modifikation tritt noch für den Fall $\alpha=0$ ein, welchen die Voraussetzungen dieses Theoremes ausschliessen. Bis zur Gleichung (8) bleibt die Betrachtung die nämliche und auch hier ändert sich für $x>0$ noch nichts. Für $x=0$ dagegen verschwindet das zweite Integral daselbst nicht (wie bei $\alpha>0$), sondern man erhält

$$2\int_0^\beta \frac{\sin kt}{t} f(t)\,dt$$

wovon der Gränzwerth $\pi f(0)$ ist, während er nur $\frac{\pi}{2}f(0)$ sein würde, wenn die vorherige Betrachtung für $\alpha=0$ ungestört bliebe. Diess giebt folgendes Theorem:

Der Werth des doppelten Integrales

$$\frac{2}{\pi}\int_0^\infty \cos xu \int_0^\beta f(t)\cos ut\,dt \qquad (10)$$

ist $\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$ für jedes $x$, welches die Bedingung $\beta > x \geqq 0$ erfüllt; dagegen $\frac{1}{2}f(\beta)$ für $x=\beta$ und Null, wenn $x$ die Grösse $\beta$ übersteigt.

Digitized by Google

Lässt man $\beta$ ins Unendliche wachsen, so gilt die Gleichung

$$\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2} = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \cos xu\,du \int_0^\infty f(t)\cos ut\,dt \quad (11)$$

für jedes endliche positive $x$ inclusive $x=0$; sie bleibt aber auch für unendlich wachsende $\beta$ richtig, wenn die Grössen $\frac{1}{2}[f(\beta+0)+f(\beta-0)]$ und $\frac{1}{2}f(\beta)$ sich einer und der nämlichen Gränze nähern, wozu nöthig ist, dass $Lim\, f(\beta)=0$ sei.

II. Ganz die nämlichen Betrachtungen sind auf das Integral in (5) anwendbar, wenn man dasselbe als den Gränzwerth von

$$2\int_0^k \sin xu\,du \int_\alpha^\beta f(\vartheta)\sin u\vartheta\,d\vartheta$$

für unausgesetzt zunehmende $k$ ansieht. Beachtet man, dass nach Umkehrung der Integrationsordnung ein doppeltes Sinusprodukt, d. h. eine Cosinusdifferenz zu integriren ist, während früher eine Cosinussumme vorkam, so übersieht man ohne alle Rechnung, dass das obige Integral entsprechend der Formel (8) in folgende Differenz

$$\int_{\alpha-x}^{\beta-x} \frac{\sin kt}{t} f(x+t)\,dt \;-\; \int_{\alpha+x}^{\beta+x} \frac{\sin kt}{t} f(-x+t)\,dt \qquad (12)$$

zerfällt. Da nun für $\beta > \alpha > 0$ und positive $x$ das zweite Integral gegen die Gränze Null convergirt, wenn $k$ ins Unendliche wächst, so fällt die jetzige Untersuchung ganz mit der früheren zusammen und giebt das ganz analoge Theorem:

Unter der Voraussetzung, dass $\beta > \alpha > 0$ und $x$ eine positive Grösse ist, hat das Doppelintegral

$$\frac{2}{\pi}\int_0^\infty \sin xu\,du \int_\alpha^\beta f(t)\sin ut\,dt \qquad (13)$$

den Werth $\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$ oder Null, je nachdem $x$ innerhalb oder ausserhalb des Intervalles $\alpha$ bis $\beta$ liegt; an den Gränzen

Digitized by Google

desselben, also für $x = a$ oder $x = \beta$ gelten dagegen die Werthe $\frac{1}{2}f(a+0)$ und $\frac{1}{2}f(\beta-0)$. Für negative $x$ finden diese Beziehungen nur dann statt, wenn zufällig $f(-x) = -f(x)$ ist.

Auch hier bedarf der Fall $a = 0$ einer besonderen Untersuchung. Für $x > 0$ ändert sich dann in Nr. (12) nichts, für $x = 0$ dagegen reduzirt sich der dort vorkommende Ausdruck auf Null, wie sich auch sonst von selbst versteht. Wir haben daher den Satz:

Der Werth des doppelten Integrales

$$\frac{2}{\pi}\int_0^\infty \sin xu\,du \int_0^\beta f(t)\sin ut\,dt \qquad (14)$$

ist $\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$ für jedes $x$ zwischen 0 und $\beta$; für $x = \beta$ erhält man $\frac{1}{2}f(\beta-0)$ und für $x = 0$ und $x > \beta$ jedesmal Null für denselben.

Lässt man noch $\beta$ ins Unendliche zunehmen, so gilt die Formel

$$\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2} = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \sin xu\,du \int_0^\infty f(t)\sin ut\,dt \qquad (15)$$

für jedes endliche positive $x$ exclusive $x = 0$; sie bleibt auch noch für unendlich wachsende $x$ richtig, wenn in diesem Falle $Lim\, f(\beta) = 0$ ist.

Fassen wir das Bisherige zusammen, so ist für $Lim\, f(x) = 0$, wo sich das *Limes*-Zeichen auf das unendliche Wachsen von $x$ bezieht,

$$f(x) = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \cos xu\,du \int_0^\infty f(t)\cos ut\,dt\,, \quad x \gtreqless 0\,, \qquad (16)$$

$$f(x) = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \sin xu\,du \int_0^\infty f(t)\sin ut\,dt\,, \quad x > 0\,, \qquad (17)$$

wobei man nur zu merken hat, dass, wenn für irgend ein $x$ eine Unterbrechung der Continuität in $f(x)$ eintritt, an die Stelle von $f(x)$ das arithmetische Mittel aus den beiden Werthen zu setzen ist, welche in diesem Falle dem $f(x)$ zukommen.

Digitized by Google

## §. 11.

Die beiden Theoreme, welche wir so eben kennen gelernt haben, können noch in anderer Form dargestellt und auch so ausgedehnt werden, dass sie nicht nur für positive $x$, sondern ganz allgemein von $x = -\infty$ bis $x = +\infty$ gültig bleiben.

Zunächst kann man bemerken, dass

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \cos xu\, du \int_{0}^{\infty} f(t) \cos ut\, dt\,, \quad x \geqq 0 \tag{1}$$

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \sin xu\, du \int_{0}^{\infty} f(t) \sin ut\, dt\,, \quad x > 0 \tag{2}$$

ist; denn denkt man sich jedes von $u = -\infty$ bis $u = +\infty$ gehende Integral in zwei Integrale zerlegt, von denen das erste das Intervall $u = -\infty$ bis $u = 0$ und das zweite das Intervall $u = 0$ bis $u = +\infty$ umfasst, so übersieht man leicht, dass das erste dem zweiten gleich ist, weil jede der Funktionen $\cos xu \cos ut$ und $\sin xu \sin ut$ für negative $u$ die nämlichen Werthe annimmt, wie für positive $u$.

Setzt man ferner im Integrale (16)

$$f(x) = \frac{\varphi(x) + \varphi(-x)}{2}$$

so gilt die nunmehr entstehende Formel

$$\left.\begin{aligned} &\frac{\varphi(x) + \varphi(-x)}{2} \\ &= \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\infty} \cos xu\, du \int_{0}^{\infty} \frac{\varphi(t) + \varphi(-t)}{2} \cos ut\, dt \end{aligned}\right\} \tag{3}$$

auch für negative $x$, weil hier $f(x)$ mit $\cos xu$ die Eigenschaft $f(-x) = f(x)$ gemein hat. Zerlegt man das Integral nach $t$ in die Summe

$$\tfrac{1}{2} \int_{0}^{\infty} \varphi(t) \cos ut\, dt + \tfrac{1}{2} \int_{0}^{\infty} \varphi(-t) \cos ut\, dt$$

Digitized by Google

und nimmt im zweiten Integrale $t = -t'$, so geht letzteres über in

$$-\int_0^{-\infty} \varphi(t') \cos ut'\, dt' = \int_{-\infty}^{0} \varphi(t') \cos ut'\, dt'.$$

Demnach wird die vorige Summe

$$= \tfrac{1}{2}\int_0^{\infty} \varphi(t) \cos ut\, dt + \tfrac{1}{2}\int_{-\infty}^{0} \varphi(t') \cos ut'\, dt'$$

$$= \tfrac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) \cos ut\, dt$$

wenn man nämlich zuvörderst die Accente weglässt und dann beide Integrale zusammenzieht. Die Gleichung (3) geht jetzt über in

$$\left.\begin{aligned} &\frac{\varphi(x) + \varphi(-x)}{2} \\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} \cos xu\, du \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) \cos ut\, dt \end{aligned}\right\} \infty > x > -\infty. \quad (4)$$

Nimmt man ebenso in der Formel (17) des vorigen Paragraphen

$$f(x) = \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{2}$$

so gilt die entstehende Formel sowohl für $x = 0$, als für negative $x$, weil hier $f(0) = 0$, $f(-x) = -f(x)$ ist; nach einer ebenso leichten Reduktion findet man

$$\left.\begin{aligned} &\frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{2} \\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} \sin xu\, du \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) \sin ut\, dt \end{aligned}\right\} \infty > x > -\infty. \quad (5)$$

Addirt man endlich die Gleichungen (5) und (6), und be-

Digitized by Google

merkt, dass die darin vorkommenden Doppelintegrale auch unter den Formen

$$\frac{1}{\pi}\int_0^\infty du \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t)\cos ut\cos xu\,dt$$

und

$$\frac{1}{\pi}\int_0^\infty du \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t)\sin ut\sin xu\,dt$$

dargestellt werden können, so ergiebt sich sogleich:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty du \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t)\cos u(t-x)\,dt\,, \quad \infty > x > -\infty\,, \qquad (6)$$

wofür man auch schreiben kann:

$$\varphi(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} du \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t)\cos u(t-x)\,dt\,, \quad \infty > x > -\infty\,, \qquad (7)$$

weil $\cos u(t-x)$ für negative $u$ die nämlichen Werthe giebt, wie für positive $u$.

Bezeichnet man $\sqrt{-1}$ zur Abkürzung mit $i$, so ist ferner:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} du \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t)\,e^{u(t-x)i}\,dt$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} du \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t)\cos u(t-x)\,dt$$

$$+ \frac{i}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} du \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t)\sin u(t-x)\,dt\,.$$

Da $\sin u(t-x)$ für negative $u$ sein Vorzeichen, aber nicht seinen Werth ändert, so erhellt leicht, dass sich das mit $i$ multiplizirte Integral von selbst annullirt, dass folglich übrig bleibt:



Digitized by Google

$$\varphi(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} du \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t)\, e^{u(t-x)i}\, dt\,, \quad \infty > x > -\infty\,, \qquad (8)$$

indem der Werth des reellen Bestandtheiles nach Formel (7) bestimmt werden kann.

Die hier entwickelten Formeln sind mit denen identisch, welche zuerst Fourier in seiner *théorie de la chaleur* auf anderem Wege abgeleitet hat. — Bei der Wichtigkeit der beiden Sätze Fourier's wird man vielleicht einen zweiten Beweis derselben nicht ungern sehen, welcher den besonderen Vortheil hat, von jeglicher anderweiten Theorie unabhängig zu sein und nur die Kenntniss des Integrales

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin z}{z}\, dz = \frac{\pi}{2}$$

voraus zu setzen, woraus man, wie schon früher in der Gammafunktionentheorie, den Satz

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin au \cos bu}{u}\, du = \frac{\pi}{2}\,, \quad \text{für } a > b$$

$$= 0\,, \quad \text{für } a < b$$

ableitet. — Man betrachte nämlich zuvörderst das Integral

$$P = \int_0^{\infty} \frac{\cos yu}{u}\, du \int_0^{c} F(t) \sin ut\, dt$$

worin wir $F(t)$ als stetig und endlich innerhalb des Intervalles $t = 0$ bis $t = c$ voraussetzen. Durch Umkehrung der Integrationsfolge, die hier gestattet ist, weil der Ausdruck

$$\frac{\cos yu}{u} F(t) \sin ut$$

innerhalb der Gränzen $u = 0$, $u = \infty$ und $t = 0$, $t = c$ weder unendlich, noch diskontinuirlich wird, nimmt $P$ die Form

$$P = \int_0^{c} F(t)\, dt \int_0^{\infty} \frac{\sin tu \cos yu}{u}\, du$$

Digitized by Google

an, in welcher zwei Fälle zu unterscheiden sind, nämlich $\gamma > c$ und $\gamma < c$. Im ersteren ist zugleich $\gamma > t$, weil vermöge der Integrationsgränzen nach $t$ immer $c > t$ sein muss, und folglich annullirt sich das Integral nach $u$ wegen $a = t < b = \gamma$, also

$$P = 0, \quad \text{für } \gamma > c.$$

Wenn dagegen $\gamma < c$ ist, so zerlege man das Integral $P$ wie folgt

$$P = \int_0^{\gamma} F(t)\,dt \int_0^{\infty} \frac{\sin tu \cos \gamma u}{u}\,du$$

$$+ \int_{\gamma}^{c} F(t)\,dt \int_0^{\infty} \frac{\sin tu \cos \gamma u}{u}\,du.$$

Im ersten Integrale ist nun wegen der Integrationsgränzen für $t$ immer $t < \gamma$ und deshalb verschwindet das Integral in Bezug auf $u$; im zweiten Integrale ist $c > t > \gamma$ und wegen $t > \gamma$ erhält das in Bezug auf $u$ genommene Integral den Werth $\frac{\pi}{2}$ und es bleibt

$$P = \int_{\gamma}^{c} F(t)\,dt \cdot \frac{\pi}{2}, \quad \text{für } \gamma < c.$$

Vermöge des ursprünglichen Werthes von $P$ ist demnach:

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos \gamma u}{u}\,du \int_0^{c} F(t) \sin ut\,dt = \frac{\pi}{2} \int_{\gamma}^{c} F(t)\,dt, \quad \gamma < c$$

$$= 0 \qquad , \quad \gamma > c.$$

Setzen wir nun $\int F(t)\,dt = f(t)$ also $F(t) = f'(t)$, so wird durch theilweise Integration

$$\int f'(t) \sin ut\,dt = \sin ut \int f'(t)\,dt - \int u \cos ut\,dt \int f'(t)\,dt$$

$$= f(t) \sin ut - u \int f(t) \cos ut\,dt$$

Digitized by Google

und die obige Gleichung geht über in

$$\int_0^\infty \frac{\cos \gamma u}{u}\, du \left[ f(c) \sin uc \; - \; u \int_0^c f(t) \cos ut \, dt \right]$$

$$= \frac{\pi}{2} \left[ f(c) - f(\gamma) \right] \quad \text{oder} \quad = 0$$

d. i.

$$f(c) \int_0^\infty \frac{\sin cu \, \cos \gamma u}{u}\, du \; - \int_0^\infty \cos \gamma u \, du \int_0^c f(t) \cos ut \, dt$$

$$= \frac{\pi}{2} \left[ f(c) - f(\gamma) \right] \quad \text{oder} \quad = 0$$

je nachdem $\gamma < c$ oder $\gamma > c$ ist. Im ersten Falle, $c > \gamma$, erhält $f(c)$ auf der linken Seite den Faktor $\frac{\pi}{2}$, im zweiten, $c < \gamma$, den Faktor Null und mithin bleibt

$$\int_0^\infty \cos \gamma u \, du \int_0^c f(t) \cos ut \, dt = \frac{\pi}{2} f(\gamma), \quad \text{für} \quad \gamma < c$$

$$= 0 \qquad , \quad \text{für} \quad \gamma > c$$

wie wir vorhin schon gefunden hatten.

Ebenso leicht gelangt man zum zweiten Theoreme Fourier's indem man von dem Integrale

$$Q = \int_0^\infty \frac{\sin \gamma u}{u}\, du \int_0^c F(t) \cos ut \, dt$$

ausgeht. Man hat zunächst

$$Q = \int_0^c F(t)\, dt \int_0^\infty \frac{\sin \gamma u \, \cos tu}{u}\, du$$

und unterscheidet hier wieder die beiden Fälle $\gamma > c$, $\gamma < c$. Im ersten ist wegen $c > t$ auch immer $\gamma > t$, folglich:

Digitized by Google

$$Q = \int_0^c F(t)\,dt \,.\, \frac{\pi}{2}, \quad \gamma > c$$

im zweiten zerlege man $Q$ folgendermassen

$$Q = \int_0^\gamma F(t)\,dt \int_0^\infty \frac{\sin \gamma u \cos tu}{u}\,du$$

$$+ \int_\gamma^c F(t)\,dt \int_0^\infty \frac{\sin \gamma u \cos tu}{u}\,du$$

so ist hinsichtlich des ersten Integrales $\gamma > t$ und für das zweite $\gamma < t$; folglich verschwindet das letztere Integral und es bleibt

$$Q = \int_0^\gamma F(t)\,dt \,.\, \frac{\pi}{2}.$$

Setzt man wieder $F(t) = f'(t)$, so verwandelt sich die Gleichung

$$\int_0^\infty \frac{\sin \gamma u}{u}\,du \int_0^c F(t) \cos ut\,dt = \frac{\pi}{2} \int_0^c F(t)\,dt, \quad \gamma > c$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^\gamma F(t)\,dt, \quad \gamma < c$$

in die folgende

$$f(c) \int_0^\infty \frac{\sin \gamma u \cos cu}{u}\,du - f(0) \int_0^\infty \frac{\sin \gamma u}{u}\,du$$

$$+ \int_0^\infty \sin \gamma u\,du \int_0^c f(t) \sin ut\,dt$$

$$= \frac{\pi}{2} \left[f(c) - f(0)\right] \text{ für } \gamma > c$$

$$= \frac{\pi}{2} \left[f(\gamma) - f(0)\right] \text{ für } \gamma < c.$$

Die Werthe der beiden ersten Integrale auf der linken Seite [der

Digitized by Google

Coeffizienten von $f(c)$ und $f(0)$] lassen sich aber in jedem der beiden Fälle $\gamma < c$ oder $\gamma > c$ leicht angeben und man findet so

$$\int_0^\infty \sin \gamma u \, du \int_0^c f(t) \sin ut \, dt = \frac{\pi}{2} f(\gamma), \quad \gamma < c$$

$$= 0 \quad , \quad \gamma < c$$

ganz wie früher. Ebenso leicht würde es sein, die allgemeineren Theoreme des §. 10 auf diese Weise abzuleiten und sie auf solche Funktionen $f(t)$ auszudehnen, welche innerhalb des Intervalles $t = 0$ bis $t = c$ eine Unterbrechung der Continuität erleiden, ohne jedoch gleichzeitig unendlich zu werden.

## §. 12.

Es ist ein doppelter Gebrauch, welcher sich von den Theoremen des vorigen Paragraphen machen lässt; einerseits kann man sie nämlich bei der Auflösung partieller Differenzialgleichungen benutzen, um aus einem partikulären Integrale einer solchen Gleichung das allgemeine Integral abzuleiten, andererseits werden jene Formeln für die Theorie bestimmter Integrale von Wichtigkeit, weil sie eine reiche Quelle neuer Integralformeln darstellen.

Von der ersten Art der Anwendung wollen wir, da sie unserem Zwecke ferner liegt, nur ein einziges Beispiel geben und zwar mit Fourier diejenige Differenzialgleichung integriren, welche zur Bestimmung gewisser Wärmebewegungen dient. Wir schreiben in diesem Falle die Formel (7) in folgenden Zeichen:

$$\varphi(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\Theta) \cos \omega (\Theta - x) \, d\Theta . \qquad (1)$$

Die gegebene partielle Differenzialgleichung sei

$$\frac{du}{dt} = a^2 \frac{d^2 u}{dx^2} \qquad (2)$$

und zugleich die Bedingung gestellt, dass das Integral derselben $u$,

Digitized by Google

dass eine Funktion der zwei Variablen $x$ und $t$ ist, sich für $t=0$ auf eine gegebene Funktion von $x$, etwa $\varphi(x)$, reduziren solle. — Zunächst bemerkt man nun leicht, dass der Ausdruck

$$e^{-a^2\omega^2 t}\cos\omega(\Theta-x) \tag{3}$$

worin $\omega$ und $\Theta$ willkührliche Constanten bedeuten, die Gleichung (2) erfüllt, also ein partikuläres Integral derselben ist. Für $t=0$ reduzirt sich derselbe auf $\cos\omega(\Theta-x)$; um nun aber für $t=0$ nicht diesen speziellen Werth, sondern $\varphi(x)$ zu erhalten, brauchen wir blos in Nr. (1) die Operationen nachzusehen, welche noch mit $\cos\omega(\Theta-x)$ vorgenommen werden müssen, um daraus $\varphi(x)$ zu bilden.

Wenden wir ebendieselben Operationen auf die partikuläre Lösung in (3) an, so ist jetzt:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\Theta)\, e^{-a^2\omega^2 t}\cos\omega(\Theta-x)\, d\Theta \tag{4}$$

das verlangte allgemeine Integral. Da nämlich $\omega$ und $\Theta$ von $x$ und $t$ unabhängig sind, so befriedigt ein Ausdruck von der Form

$$\frac{1}{2\pi} d\omega \,.\, \varphi(\Theta)\, e^{-a^2\omega^2 t}\cos\omega(\Theta-x)\, d\Theta \tag{5}$$

die gegebene Differenzialgleichung, weil er sich von dem partikulären Integrale in (3) nur durch constante Faktoren unterscheidet. Jenes Doppelintegral ist aber nichts Anderes als die Summe einer unendlichen Menge von Elementen, deren jedes einzelne unter der Form (5) steht, es muss folglich selbst die Gleichung (2) erfüllen, weil jeder seiner Bestandtheile diese Eigenschaft besitzt. Da ausserdem der Ausdruck in (4) sich für $t=0$ auf $\varphi(x)$ reduzirt, so genügt derselbe allen Anforderungen, welche an $u$ gemacht worden sind. Kehrt man in ihm die Reihenfolge der Integrationen um, so ist auch

$$u = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\Theta)\, d\Theta \int_{-\infty}^{\infty} \cos\omega(\Theta-x)\, e^{-a^2 t\omega^2} d\omega$$

Digitized by Google

und unter Anwendung der bekannten Formel

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos 2h\omega \, e^{-k^2\omega^2} \, d\omega = \frac{\sqrt{\pi}}{k} e^{-\left(\frac{h}{k}\right)^2}$$

ergiebt sich hieraus

$$u = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\Theta) \, d\Theta \, e^{-\frac{(\Theta-x)^2}{4a^2 t}} \tag{6}$$

oder wenn man

$$\frac{(\Theta-x)^2}{4a^2 t} = \eta^2, \quad \text{d. i.} \quad \Theta = x + 2a\eta\sqrt{t}$$

setzt, wo $\eta$ die neue Variable bezeichnet:

$$u = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\eta^2} \varphi(x + 2a\eta\sqrt{t}) \, d\eta. \tag{7}$$

Von der Richtigkeit dieser Resultate kann man sich auch leicht a posteriori überzeugen; aus der ersten Form von $u$ in Nr. (6) erkennt man sehr leicht, dass diese Funktion in der That ein Integral der gegebenen Differenzialgleichung ist, und aus der zweiten, dass sie sich für $t = 0$ auf $\varphi(x)$ reduzirt.

## §. 13.

Die zweite Anwendung, welche die Fourier'schen Formeln zulassen, besteht darin, dass sie einen Leitfaden zur Entdeckung bestimmter Integrale mit angebbaren Werthen bilden; wählt man nämlich die willkührliche Funktion $f(x)$ so, dass sich in den Gleichungen

$$\frac{\pi}{2} f(x) = \int_0^{\infty} \cos xu \, du \int_0^{c} f(t) \cos ut \, dt, \quad c > x \geqq 0 \tag{1}$$

$$\frac{\pi}{2} f(x) = \int_0^{\infty} \sin xu \, du \int_0^{c} f(t) \sin ut \, dt, \quad c > x > 0 \tag{2}$$

Digitized by Google

die jedesmal erste Integration (nach $t$) durch die gewöhnlichen Mittel in geschlossener Form bewerkstelligen lässt, so bleibt noch eine Integration nach $u$ übrig, die in vielen Fällen nicht direkt ausführbar sein wird; da man aber den Werth der linken Seite im Voraus kennt, so ist man durch diesen einfachen Calcül zur unmittelbaren Werthangabe eines zwischen den Gränzen 0 und $\infty$ genommenen Integrales gelangt. Aus der so entstandenen Gleichung lassen sich dann durch Integration oder Differenziation nach den in ihr vorkommenden willkührlichen Constanten wieder neue Integralformeln ableiten. Dabei ist jedoch ganz besonders zu bemerken, dass eine derartige Differenziation in Bezug auf $x$ im Allgemeinen nicht, sondern nur unter gewissen besonderen Bedingungen vorgenommen werden darf, wie sich aus der folgenden Untersuchung darüber ergeben wird.

Aus der Differenziation der Gleichung (1) in Bezug auf $x$ ergiebt sich die nachstehende Formel, welche wir vor der Hand als eine noch problematische bezeichnen:

$$\frac{\pi}{2} f'(x) = -\int_0^\infty u \sin xu \, du \int_0^c f(t) \cos ut \, dt . \qquad (3)$$

Andererseits ist vermöge der Gleichung (2), wenn darin $f(x)$ durch $f'(x)$ ersetzt wird

$$\frac{\pi}{2} f'(x) = \int_0^\infty \sin xu \, du \int_0^c f'(t) \sin ut \, dt \qquad (4)$$

wobei sich die Integration nach $t$ leicht in etwas anderer Form darstellen lässt, sobald man bemerkt, dass

$$\int \sin ut \, f'(t) \, dt = \sin ut \int f'(t) \, dt - u \int \cos ut \, dt \int f'(t) \, dt$$

ist; indem man hier $f(t)$ für $\int f'(t) \, dt$ schreibt und die Gränzen $c$ und 0 einführt ergiebt sich

$$\int_0^c f'(t) \sin ut \, dt = f(c) \sin cu - u \int_0^c f(t) \cos ut \, dt .$$



Digitized by Google

Mit Hülfe dieser Gleichung nimmt die Formel (4) folgende Gestalt an:

$$\frac{\pi}{2} f'(x) = f(c) \int_0^\infty \sin xu \sin cu \, du$$

$$- \int_0^\infty u \sin xu \, du \int_0^c f(t) \cos ut \, dt$$

und wenn wir in dem mit $f(c)$ multiplizirten Integrale die obere Gränze $\infty$ als *Lim* einer unendlich wachsenden Zahl $k$ ansehen und die daselbst postulirte Integration zwischen $k$ und 0 ausführen, so ist

$$\left.\begin{aligned} \frac{\pi}{2} f'(x) &= \tfrac{1}{2} f(c) \, Lim \left\{ \frac{\sin(x-c)k}{x-c} - \frac{\sin(x+c)k}{x+c} \right\} \\ &\quad - \int_0^\infty u \sin xu \, du \int_0^c f(t) \cos ut \, dt \, . \end{aligned}\right\} \quad (5)$$

Soll nun diese ganz unbezweifelt richtige Gleichung mit der unter Nr. (3) stehenden noch unsicheren Formel zusammenfallen, so muss für unausgesetzt wachsende $k$

$$f(c) \, Lim \left\{ \frac{\sin k(x-c)}{x-c} - \frac{\sin k(x+c)}{x+c} \right\} = 0$$

sein, eine Bedingung, welche nur dann erfüllt sein kann, wenn

$$f(c) = 0 \quad (6)$$

ist, weil ausserdem der fragliche Ausdruck völlig unbestimmt würde, in so fern die Sinus unendlich wachsender Bögen zwischen $+1$ und $-1$ hin und her oszilliren, sich also keiner bestimmten Gränze nähern. Die Gleichung (6) giebt also die Bedingung an, unter welcher die Formel (3) richtig, d. h. die Differenziation der Gleichung (1) nach $x$ erlaubt ist.

Eine ganz ähnliche Betrachtung zeigt die Umstände, unter denen die Gleichung (2) in Bezug auf $x$ differenzirt werden darf, wobei

$$\frac{\pi}{2} f'(x) = \int_0^\infty u \cos xu \, du \int_0^c f(t) \sin ut \, dt \quad (7)$$

Digitized by Google

herauskommt. Man hat nämlich zufolge der Formel (1)

$$\frac{\pi}{2} f'(x) = \int_0^\infty \cos xu\, du \int_0^c f'(t) \cos ut\, dt$$

und hieraus folgt durch Anwendung des Prinzipes theilweiser Integration auf das Integral nach $t$

$$\frac{\pi}{2} f'(x) = \int_0^\infty \cos xu\, du \left[\cos cu\, f(c) - f(0)\right] + \int_0^\infty u \cos xu\, du \int_0^c f(t) \sin ut\, dt .$$

Nimmt man das erste Integral zwischen den Gränzen 0 und $k$ und lässt nachher $k$ ins Unendliche wachsen, so ist

$$\left.\begin{aligned} \frac{\pi}{2} f'(x) = {} & \tfrac{1}{2} f(c)\, Lim \left\{\frac{\sin(x-c)k}{x-c} + \frac{\sin(x+c)k}{x+c}\right\} \\ & - f(0)\, Lim \frac{\sin xk}{x} + \int_0^\infty u \cos xu\, du \int_0^c f(t) \sin ut\, dt . \end{aligned}\right\} \quad (8)$$

Soll diess mit der hypothetischen Gleichung (7) coincidiren, so ist noch die Gleichung

$$0 = \tfrac{1}{2} f(c)\, Lim \left\{\frac{\sin k(x-c)}{x-c} + \frac{\sin k(x+c)}{x+c}\right\} - f(0)\, Lim \frac{\sin kx}{x}$$

nöthig, zu deren Bestehen die Bedingungen

$$f(c) = 0 , \quad f(0) = 0 \quad (9)$$

erfordert werden. — Man kann demnach sagen: „von den beiden Formeln (1) und (2) darf man die erste nach $x$ differenziren, sobald $f(t)$ an der oberen Integrationsgränze verschwindet, die zweite aber nur dann, wenn $f(t)$ sich an beiden Integrationsgränzen annullirt."

Digitized by Google

Statt dieses Kennzeichens a priori kann man auch leicht ein anderes a posteriori aufstellen. Hat nämlich das Integral:

$$-\int_0^\infty u \sin xu\, du \int_0^c f(t) \cos ut\, dt \qquad (10)$$

einen bestimmten Werth, so muss offenbar die Bedingung $f(c) = 0$ erfüllt sein, denn wäre sie es nicht, so würde aus Nr. (5) gegen die Voraussetzung folgen, dass der fragliche Werth unbestimmt, nämlich

$$= \frac{\pi}{2} f'(x) - \tfrac{1}{2} f(c)\ Lim \left\{ \frac{\sin(x-c)k}{x-c} - \frac{\sin(x+c)k}{x+c} \right\} \qquad (11)$$

wäre; ist hingegen der Werth des Integrales (10) unbestimmt, etwa wie der von $\int_0^\infty \cos z\, dz$, so braucht jene Bedingung nicht erfüllt zu sein und die Gleichung zwischen (10) und (11) reduzirt sich auf das triviale Resultat, dass ein paar unbestimmte Grössen einander gleich sein können.

Eine ganz ähnliche Betrachtung ist auf das Integral

$$\int_0^\infty u \cos xu\, du \int_0^c f(t) \sin ut\, dt$$

anwendbar und berechtigt uns mit der vorigen zusammen zu dem Ausspruche: „zwischen den nach $x$ genommenen Differenzialquotienten der Ausdrücke

$$\frac{\pi}{2} f(x), \quad \int_0^\infty \cos xu\, du \int_0^c f(t) \cos ut\, dt, \quad c > x \geqq 0,$$

$$\int_0^\infty \sin xu\, du \int_0^c f(t) \sin ut\, dt, \quad c > x > 0,$$

findet so lange Gleichheit statt, als die Werthe der durch die Differenziation entspringenden neuen Integrale bestimmte Grössen bleiben."

Digitized by Google

## §. 14.

Eines der einfachsten Beispiele für die Theoreme (1) und (2) des vorigen Paragraphen bildet die Annahme

$$f(x) = e^{-ax}, \quad c = \infty .$$

Erinnert man sich nämlich, dass für positive von Null verschiedene $a$

$$\int_0^\infty e^{-at} \cos ut \, dt = \frac{a}{a^2+u^2}$$

$$\int_0^\infty e^{-at} \sin ut \, dt = \frac{u}{a^2+u^2}$$

ist, so ergeben sich auf der Stelle die folgenden beiden Formeln

$$\frac{\pi}{2} e^{-ax} = \int_0^\infty \frac{a \cos xu}{a^2+u^2} du, \quad x \geqq 0 \tag{1}$$

$$\frac{\pi}{2} e^{-ax} = \int_0^\infty \frac{u \sin xu}{a^2+u^2} du, \quad x > 0 . \tag{2}$$

Man kann dazu noch eine dritte und ähnliche stellen, wenn man bemerkt, dass

$$\int_0^\infty \frac{\sin xu}{u} du - \int_0^\infty \frac{u \sin xu}{a^2+u^2} du = a^2 \int_0^\infty \frac{\sin xu}{a^2+u^2} \frac{du}{u} \tag{3}$$

ist, woraus nun sogleich folgt

$$\frac{\pi}{2} (1 - e^{-ax}) = \int_0^\infty \frac{\sin xu}{u^2+u^2} \cdot \frac{a^2}{u} du, \quad x > 0 . \tag{4}$$

Diese letztere Formel darf man als die gemeinschaftliche Quelle der unter (1) und (2) verzeichneten Resultate ansehen, in so fern sich diese aus ihr durch zwei consecutive Differenziationen nach $x$ ableiten lassen. Die Formel (6) darf man jedoch nicht wieder differenziren,

Digitized by Google

weil die Substitution $f(x) = e^{-ax}$, welche zu ihr führte, den Bedingungen (9) im vorigen Paragraphen nicht genügt; in der That würde das neue Integral

$$\int_0^\infty \frac{u^2 \cos xu}{a^2 + u^2}\, du$$

welches dabei zum Vorschein käme, keinen bestimmten Werth haben, wie man augenblicklich ersieht, wenn man es in der Form

$$\int_0^\infty \cos xu\, du - a^2 \int_0^\infty \frac{\cos xu}{a^2 + u^2}\, du$$

darstellt, und daher darf man dasselbe dem Differenzialquotienten von $\frac{\pi}{2} e^{-ax}$ nicht gleich setzen.

Man kann zu den so eben entwickelten Resultaten auch auf einem anderen Wege gelangen. Setzt man nämlich

$$y = \int_0^\infty \frac{\sin xu}{a^2 + u^2} \frac{du}{u} \tag{5}$$

so folgt

$$\frac{dy}{dx} = \int_0^\infty \frac{\cos xu}{a^2 + u^2}\, du \tag{6}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -\int_0^\infty \frac{u \sin xu}{a^2 + u^2}\, du \tag{7}$$

und diese Differenziationen sind erlaubt, weil die fraglichen drei Integrale bestimmte endliche Werthe haben müssen, wie man leicht durch ein paar einfache Betrachtungen findet. Man hat ferner

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - a^2 y = -\int_0^\infty \frac{\sin xu}{u}\, du = -\frac{\pi}{2}$$

und hierin eine gewöhnliche Differenzialgleichung. Nach den bekannten

Digitized by Google

Methoden zur Integration der linearen Differenzialgleichungen erhält man als vollständiges Integral derselben

$$y = Ae^{ax} + Be^{-ax} + \frac{\pi}{2a^2}$$

wobei $A$ und $B$ die willkührlichen Constanten der Integration sind, und ferner

$$\frac{dy}{dx} = aAe^{ax} - aBe^{-ax}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = a^2Ae^{ax} + a^2Be^{-ax}.$$

Da nun aus (5) und (6) folgt, dass für $x = 0$

$$y = 0 \text{ und } \frac{dy}{dx} = \int_0^\infty \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{\pi}{2a}$$

wird, so haben wir zur Bestimmung von $A$ und $B$ die beiden Gleichungen

$$0 = A + B + \frac{\pi}{2a^2}$$

$$\frac{\pi}{2a} = aA - aB$$

woraus man $A = 0$, $B = -\frac{\pi}{2a^2}$ erhält. Vermöge der Bedeutung von $y$, $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$ ist nun

$$\frac{\pi}{2a^2}\left(1 - e^{-ax}\right) = \int_0^\infty \frac{\sin xu}{a^2 + u^2} \cdot \frac{du}{u} \tag{8}$$

$$\frac{\pi}{2a}e^{-ax} = \int_0^\infty \frac{\cos xu}{a^2 + u^2}\, du \tag{9}$$

$$\frac{\pi}{2}e^{-ax} = \int_0^\infty \frac{u \sin xu}{a^2 + u^2}\, du \tag{10}$$

übereinstimmend mit den früheren Formeln.

Digitized by Google

Schreibt man $b$ und $\sqrt{r}$ für $x$ und $a$, bemerkt ferner, dass jetzt

$$\int_0^\infty \frac{\cos bu}{r+u^2}\,du = \frac{\pi}{2\sqrt{r}}\,e^{-b\sqrt{r}} = -\frac{\pi}{b}\,\frac{d\left(e^{-b\sqrt{r}}\right)}{dr} \qquad (11)$$

ist, so erhellt leicht, dass man sovielmal als es beliebt nach $r$ differenziren und die beiderseitigen Differenzialquotienten einander gleich setzen darf; da nämlich der Nenner der Differenzialformel durch Differenziation nach $r$ immer höhere Potenzen von $r+u^2$ bekommt, so bilden die Werthe der successiv entstehenden Integrale eine abnehmende Reihe und sind mithin kleiner als der in (11) verzeichnete Ausdruck. Man hat nun bei $n$maliger Differenziation

$$(-1)^n\ 1.2\ ..\ n\int_0^\infty \frac{\cos bu\,du}{(r+u^2)^{n+1}} = -\frac{\pi}{b}\,\frac{d^{n+1}\left(e^{-b\sqrt{r}}\right)}{dr^{n+1}}. \qquad (12)$$

Wendet man, um die rechte Seite zu entwickeln, die bekannte Formel

$$\frac{d^n f(\sqrt{x})}{dx^n} = \frac{1}{2^n}\left\{\frac{f^{(n)}(\sqrt{x})}{(\sqrt{x})^n} - \frac{n(n-1)}{2}\cdot\frac{f^{(n-1)}(\sqrt{x})}{(\sqrt{x})^{n+1}} + \frac{(n+1)\,n(n-1)\,(n-2)}{2.4}\cdot\frac{f^{(n-2)}(\sqrt{x})}{(\sqrt{x})^{n+2}} - \ldots.\right\}$$

für $x=r$, $f(\sqrt{x}) = f(\sqrt{r}) = e^{-b\sqrt{r}}$ an, so dass $f(z) = e^{-bz}$ ist, so findet man

$$\frac{d^n\left(e^{-b\sqrt{r}}\right)}{dr^n} = \left(\frac{-b}{2\sqrt{r}}\right)^n\left\{1 + \frac{n(n-1)}{2}\cdot\frac{1}{b\sqrt{r}} + \frac{(n+1)\,n(n-1)\,(n-2)}{2.4}\cdot\left(\frac{1}{b\sqrt{r}}\right)^2 + \ldots.\right\}e^{-b\sqrt{r}}.$$

Digitized by Google

Schreibt man $n+1$ für $n$, substituirt diess in die Gleichung (12), dividirt dann beiderseits mit $1.2 \ldots n$, was kurz mit $n'$ bezeichnet werden möge, und setzt am Ende wieder $a^2$ für $r$, so ergiebt sich

$$\int_0^\infty \frac{\cos bu\, du}{(a^2+u^2)^{n+1}} \tag{13}$$

$$= \frac{\pi e^{-ab}}{2a \cdot n'} \left(\frac{b}{2a}\right)^n \left\{1 + \frac{(n+1)n}{2} \frac{1}{ab} + \frac{(n+2)(n+1)n(n-1)}{2.4} \frac{1}{(ab)^2} + \ldots\right\}.$$

Gleiche Behandlung der Formel (10) liefert das analoge Resultat:

$$\int_0^\infty \frac{u \sin bu\, du}{(a^2+u^2)^{n+1}} \tag{14}$$

$$= \frac{\pi e^{-ab}}{2 \cdot n'} \left(\frac{b}{a}\right)^n \left\{1 + \frac{n(n-1)}{2} \frac{1}{ab} + \frac{(n+1)n(n-1)(n-2)}{2.4} \frac{1}{(ab)^2} + \ldots\right\}.$$

Diese Formeln stehen übrigens in einer sehr nahen Beziehung zu derjenigen, welche den Werth des Integrales

$$\int_0^\infty x^{n-\frac{1}{2}} e^{-\left(a^2 x + \frac{c^2}{x}\right)} dx$$

angiebt und in §. 17 Abth. I entwickelt worden ist. Setzt man nämlich in der Gleichung

$$\frac{\Gamma(\mu+1)}{k^{\mu+1}} = \int_0^\infty x^\mu e^{-kx} dx$$



Digitized by Google

$k = a^2 + u^2$, so ergiebt sich

$$\frac{1}{(a^2+u^2)^{\mu+1}} = \frac{1}{\Gamma(\mu+1)} \int_0^\infty x^\mu e^{-(a^2+u^2)x}\, dx$$

und durch Multiplikation mit $\cos 2cu\, du$ und Integration zwischen $u = 0$ und $u = \infty$

$$\int_0^\infty \frac{\cos 2cu\, du}{(a^2+u^2)^{\mu+1}} = \frac{1}{\Gamma(\mu+1)} \int_0^\infty \cos 2cu\, du \int_0^\infty x^\mu e^{-(a^2+u^2)x}\, dx\,.$$

Durch Umkehrung der Integrationsfolge geht das Doppelintegral über in:

$$\int_0^\infty x^\mu e^{-a^2 x}\, dx \int_0^\infty e^{-xu^2} \cos 2cu\, du$$

$$= \int_0^\infty x^\mu e^{-a^2 x}\, dx\, \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}\, e^{-\frac{c^2}{x}}$$

und so wird jetzt nach dem Vorigen

$$\int_0^\infty \frac{\cos 2cu\, du}{(a^2+u^2)^{\mu+1}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\Gamma(\mu+1)} \int_0^\infty x^{\mu-\frac{1}{2}} e^{\left(a^2 x + \frac{c^2}{x}\right)}\, dx \qquad (15)$$

woraus sich die bisherigen Formeln leicht ableiten lassen würden, indem man das Integral rechts für den Fall eines ganzen positiven $\mu$ entwickelt. Diesen Weg ist (für $\mu = 0$) zuerst Laplace gegangen *).

*) *Bulletin de la société philomatique Avril* 1811; oder *Théorie analytique des probabilités, trois. édit. page* 98.

Digitized by Google

## §. 15.

Eine nicht minder bemerkenswerthe Anwendung der Theoreme

$$\frac{\pi}{2} f(x) = \int_0^\infty \cos xu\, du \int_0^c f(t) \cos ut\, dt\,, \quad c > x \geqq 0, \qquad (1)$$

$$\frac{\pi}{2} f(x) = \int_0^\infty \sin xu\, du \int_0^c f(t) \sin ut\, dt\,, \quad c > x > 0, \qquad (2)$$

geht aus folgenden Substitutionen hervor.

In Formel (1) sei $f(x) = \sin ax$, so findet man ohne Schwierigkeit

$$\int_0^c \sin at \cos ut\, dt = -\tfrac{1}{2}\left\{\frac{\cos(a+u)c}{a+u} + \frac{\cos(a-u)c}{a-u}\right\} + \tfrac{1}{2}\left\{\frac{1}{a+u} + \frac{1}{a-u}\right\}$$

und mithin

$$\left.\begin{aligned} \frac{\pi}{2} \sin ax = &-\tfrac{1}{2}\int_0^\infty \frac{\cos c(a+u)}{a+u} \cos xu\, du \\ &+ \tfrac{1}{2}\int_0^\infty \frac{\cos c(u-a)}{u-a} \cos xu\, du \\ &+ \int_0^\infty \frac{a \cos xu}{a^2 - u^2}\, du\,, \quad c > x \geqq 0\,. \end{aligned}\right\} \qquad (3)$$

Hier tritt der bemerkenswerthe Umstand ein, dass für $x < c$ die Summe der beiden ersten Integrale der Null gleich ist. Man sieht diess leicht auf folgende Weise ein. Im ersten Integrale sei $a+u=t$, im zweiten $u-a=t$, so geht jene Summe in

$$-\int_a^\infty \frac{\cos ct}{t} \cos x(t-a)\, dt + \int_{-a}^\infty \frac{\cos ct}{t} \cos x(t+a)\, dt$$

Digitized by Google

über; dabei zerlegen wir das zweite Integral in zwei andere von $-a$ bis $+a$ und von $+a$ bis $\infty$, wo sich das letztere mit dem ersten der obigen Integrale vereinigen lässt; diess giebt

$$-2\sin ax \int_a^\infty \frac{\cos ct}{t} \sin xt\, dt + \int_{-a}^{+a} \frac{\cos ct}{t} \cos x(t+a)\, dt . \qquad (4)$$

Hier ist das zwischen $-a$ und $+a$ genommene Integral wieder in zwei andere von $-a$ bis 0 und von 0 bis $+a$ zerlegbar; setzt man nachher im ersten derselben $t = -t'$, so wird

$$\int_{-a}^{a} \frac{\cos ct}{t} \cos x(t+a)\, dt$$

$$= -\int_0^a \frac{\cos ct'}{t'} \cos(-t'+a)\, dt' + \int_0^a \frac{\cos ct}{t} \cos x(t+a)\, dt$$

d. i. wenn man die Accente weglässt und zusammenzieht

$$= -2\sin ax \int_0^a \frac{\cos ct}{t} \sin xt\, dt .$$

Denken wir uns diess an die Stelle des zweiten Integrales in (4) gesetzt, so geht der ganze daselbst befindliche Ausdruck in

$$-2\sin ax \int_0^\infty \frac{\cos ct}{t} \sin xt\, dt$$

über, wobei unter der Voraussetzung $c > x$

$$2\int_0^\infty \frac{\cos ct}{t} \sin xt\, dt = \int_0^\infty \frac{\sin(c+x)t}{t} dt - \int_0^\infty \frac{\sin(c-x)t}{t} dt$$

$$= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0$$

Digitized by Google

ist. Aus der Gleichung (3) folgt jetzt, wenn wir $c$ ins Unendliche wachsen lassen, wo es dann grösser als jedes endliche $x$ ist,

$$\frac{\pi}{2} \sin ax = \int_0^\infty \frac{a \cos xu}{a^2 - u^2} du, \quad x \gtrless 0. \tag{5}$$

Zu ganz ähnlichen Betrachtungen führt die Substitution $f(x) = \cos ax$ in die Formel (2); man findet nämlich

$$\frac{\pi}{2} \cos ax = - \int_0^\infty \frac{u \sin xu}{a^2 - u^2} du, \quad x > 0. \tag{6}$$

Berücksichtigt man noch die identische Gleichung

$$\int_0^\infty \frac{\sin xu}{u} du + \int_0^\infty \frac{u \sin xu}{a^2 - u^2} du = \int_0^\infty \frac{\sin xu}{a^2 - u^2} \frac{a^2}{u} du$$

so ergiebt sich

$$\frac{\pi}{2} (1 - \cos ax) = \int_0^\infty \frac{\sin xu}{a^2 - u^2} \cdot \frac{a^2}{u} du, \quad x \gtrless 0, \tag{7}$$

woraus man durch zwei consekutive Differenziationen nach $x$ die vorhergehenden Formeln wieder ableitet.

Man kann ebenso, wie im vorigen Paragraphen, auch auf anderem Wege zu diesen Resultaten gelangen. Für

$$y = \int_0^\infty \frac{\sin xu}{a^2 - u^2} \frac{du}{u} \tag{8}$$

wird nämlich

$$\frac{dy}{dx} = \int_0^\infty \frac{\cos xu}{a^2 - u^2} du \tag{9}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = - \int_0^\infty \frac{u \sin xu}{a^2 - u^2} du. \tag{10}$$

Digitized by Google

Man hat nun weiter

$$\frac{d^2y}{dx^2} + a^2 y = \int_0^\infty \frac{\sin xu}{u}\, du = \frac{\pi}{2}$$

und von dieser Differenzialgleichung ist

$$y = A \sin ax + B \cos ax + \frac{\pi}{2a^2}$$

das vollständige Integral, woraus folgt:

$$\frac{dy}{dx} = aA \cos ax - Ba \sin ax$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -a^2 A \sin ax - a^2 B \cos ax .$$

Für $x = 0$ muss aber nach (8) und (9) sein

$$y = 0, \quad \frac{dy}{dx} = \int_0^\infty \frac{du}{a^2 - u^2} = 0$$

und folglich haben wir zur Bestimmung der beiden Integrationsconstanten $A$ und $B$ die Gleichungen

$$0 = B + \frac{\pi}{2a^2}, \quad 0 = aA$$

was $A = 0$ und $B = -\frac{\pi}{2a^2}$ giebt. Vermöge der so bestimmten Werthe von $y$, $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$ haben wir nun nach (8), (9) und (10)

$$\frac{\pi}{2a^2}(1 - \cos ax) = \int_0^\infty \frac{\sin xu}{a^2 - u^2} \cdot \frac{du}{u} \qquad (11)$$

$$\frac{\pi}{2a} \sin ax = \int_0^\infty \frac{\cos xu}{a^2 - u^2}\, du \qquad (12)$$

$$-\frac{\pi}{2} \cos ax = \int_0^\infty \frac{u \sin xu}{a^2 + u^2}\, du \qquad (13)$$

was mit dem Früheren zusammenfällt. Uebrigens darf man die Diffe-

Digitized by Google

renziationen nach $x$ nicht weiter treiben, weil die neuen Integrale, welche entspringen würden, keine bestimmten Werthe mehr haben, wie z. B.

$$\int_0^\infty \frac{u^2 \cos xu}{a^2 - u^2} = -\int_0^\infty \cos xu\, du + a^2 \int_0^\infty \frac{\cos xu}{a^2 - u^2} du.$$

Dagegen ist es erlaubt sovielmal als man will nach $a^2$ zu differenziren, was man auf die Weise ausführt, dass man $\sqrt{r}$ für $a$ setzt, darauf $n$mal nach $r$ differenzirt und zuletzt wieder $a^2$ für $r$ schreibt. Man gelangt auf diese Weise zu Formeln, welche denen in Nr. (13) und (14) des vorigen Paragraphen völlig analog sind.

## §. 16.

Die in den beiden letzten Paragraphen entwickelten Formeln sind durch die Aufmerksamkeit, welche man ihnen geschenkt hat, eine reiche Quelle fernerer zur Theorie bestimmter Integrale gehörender Beziehungen geworden, von denen wir die wichtigsten, theils neue, theils bekannte, entwickeln wollen.

So ist es zunächst sehr bemerkenswerth, dass eine ganz simple Transformation hinreicht, um das Integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{p + qz}{a^2 - 2\beta z + z^2} \cos rz\, dz \qquad (1)$$

auf jene Integrale zu reduziren und aus demselben den Werth von

$$\int_0^\infty \frac{u^{m-1}}{a^n \pm u^n} \cos bu\, du$$

abzuleiten, worin $m$ und $n$ positive ganze Zahlen bedeuten. Unter der Voraussetzung nämlich, dass $\alpha^2 > \beta^2$, also der Nenner $\alpha^2 - 2\beta z + z^2$ nicht in zwei reelle Faktoren des ersten Grades zerlegbar ist, können wir

$$z = \beta + x\sqrt{\alpha^2 - \beta^2}$$

Digitized by Google

in das unter (1) stehende Integral substituiren, wodurch sich die Integrationsgränzen nicht ändern und

$$dz = \sqrt{\alpha^2 - \beta^2}\, dx$$
$$\alpha^2 - 2\beta z + z^2 = (\alpha^2 - \beta^2)(1 + x^2)$$

wird. Das in Rede stehende Integral nimmt dann die Form

$$\frac{1}{\sqrt{\alpha^2-\beta^2}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{p + q\beta + qx\sqrt{\alpha^2 - \beta^2}}{1 + x^2} \cos r(\beta + x\sqrt{\alpha^2 - \beta^2})\, dx$$

an, worin wir zur Abkürzung

$$\frac{p + q\beta}{\sqrt{\alpha^2-\beta^2}} = p' \qquad (2)$$

setzen und den Cosinus der zweitheiligen Grösse zerlegen. Das Integral wird dann zur folgenden Differenz

$$\cos r\beta \int_{-\infty}^{\infty} \frac{p' + qx}{1 + x^2} \cos(rx\sqrt{\alpha^2 - \beta^2})\, dx$$

$$- \sin r\beta \int_{-\infty}^{\infty} \frac{p' + qx}{1 + x^2} \sin(rx\sqrt{\alpha^2 - \beta^2})\, dx .$$

Diese zwei Integrale zerfallen wieder in vier andere, wenn man die unter den Integralzeichen angedeuteten Multiplikationen ausführt, nämlich:

$$p' \cos r\beta \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 + x^2} \cos(rx\sqrt{\alpha^2 - \beta^2})\, dx$$

$$+ q \cos r\beta \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{1 + x^2} \cos(rx\sqrt{\alpha^2 - \beta^2})\, dx$$

$$- p' \sin r\beta \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 + x^2} \sin(rx\sqrt{\alpha^2 - \beta^2})\, dx$$

$$- q \sin r\beta \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{1 + x^2} \sin(rx\sqrt{\alpha^2 - \beta^2})\, dx .$$

Digitized by Google

Von diesen Integralen verschwinden das zweite und dritte, weil sie aus gegenseitig sich aufhebenden Elementen bestehen, in so fern nämlich der jedesmalige Faktor von $dx$ die Eigenschaft $f(-x) = -f(x)$ besitzt. Es bleiben also nur das erste und letzte Integral übrig, für die man auch

$$2p' \cos r\beta \int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} \cos\left(rx\sqrt{\alpha^2-\beta^2}\right) dx$$

$$- 2q \sin r\beta \int_0^\infty \frac{x}{1+x^2} \sin\left(rx\sqrt{\alpha^2-\beta^2}\right) dx$$

schreiben kann, wenn man berücksichtigt, dass der jedesmalige Faktor von $dx$ für negative $x$ die nämlichen Werthe, wie für positive $x$ giebt. Da nun die vorstehenden Integrationen mittelst der Formel

$$\int_0^\infty \frac{\cos \gamma x}{1+x^2} dx = \int_0^\infty \frac{x \sin \gamma x}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-\gamma}$$

für $\gamma = r\sqrt{\alpha^2-\beta^2}$ ausgeführt werden können, so ergiebt sich, wenn wir den Ausgangspunkt (1) im Auge behalten,

$$\left.\begin{aligned} &\int_{-\infty}^{\infty} \frac{p+qz}{\alpha^2-2\beta z+z^2} \cos rz\, dz \\ &= \pi\left(p' \cos r\beta - q \sin r\beta\right) e^{-r\sqrt{\alpha^2-\beta^2}}. \end{aligned}\right\} \quad (3)$$

Eine elegante Spezialisirung dieser sehr bemerkenswerthen Formel ist

$$\alpha = 1, \quad \beta = \cos\omega, \quad p = \cos(m-1)\omega, \quad q = -\cos m\omega$$

wo $m$ und $\omega$ noch ganz beliebig sind. Es wird dann

$$p' = \sin m\omega, \quad \sqrt{\alpha^2-\beta^2} = \sin\omega$$

und

$$\left.\begin{aligned} &\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(m-1)\omega - z\cos m\omega}{1-2z\cos\omega+z^2} \cos rz\, dz \\ &= \pi e^{-r\sin\omega} \sin(m\omega + r\cos\omega). \end{aligned}\right\} \quad (4)$$



Digitized by Google

Hieraus lassen sich durch Spezialisirung von $\omega$ und $m$ mancherlei zum Theil schon bekannte Resultate ableiten; man erhält z. B. für $\omega = 0$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos rz}{1-z} dz = \pi \sin r$$

was nichts weiter als eine etwas andere Form für

$$\int_{0}^{\infty} \frac{2 \cos rz}{1-z^2} dz = \pi \sin r$$

ist. Wichtiger dagegen sind die folgenden Anwendungen.

I. Für ein gerades $n$ und positives ganzes $m < n+1$ ist bekanntlich, wenn $\vartheta$ zur Abkürzung für $\frac{\pi}{n}$ dient *),

$$\frac{n}{2} \frac{z^{m-1}}{1+z^n}$$

$$= \frac{\cos(m-1)\vartheta - z\cos m\vartheta}{1-2z\cos\vartheta+z^2} + \frac{\cos 3(m-1)\vartheta - z\cos 3m\vartheta}{1-2z\cos 3\vartheta+z^2} + \ldots.$$

$$\ldots. + \frac{\cos(n-1)(m-1)\vartheta - z\cos(n-1)m\vartheta}{1-2z\cos(n-1)\vartheta+z^2}.$$

Nach beiderseitiger Multiplikation mit $\cos rz\, dz$ kann man rechts sämmtliche Glieder integriren, wenn man in der Formel (4) sich für $\omega$ der Reihe nach $\vartheta$, $3\vartheta$, $5\vartheta$, ... $n-1\,\vartheta$ geschrieben denkt. Es ergiebt sich so:

---

*) Es ist diess die nämliche Zerlegung, welche in den Elementen der Integralrechnung zur Entwickelung des unbestimmten Integrales $\int \frac{x^{m-1}\,dx}{1+x^n}$ benutzt wird.

Digitized by Google

$$\frac{n}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{z^{m-1}}{1+z^n}\cos rz\,dz$$

$$= \pi\left\{e^{-r\sin\vartheta}\sin(m\vartheta + r\cos\vartheta) + e^{-r\sin 3\vartheta}\sin(3m\vartheta + r\cos 3\vartheta) + ..\right.$$

$$\left.. + e^{-r\sin\overline{n-1}\,\vartheta}\sin(\overline{n-1}\,m\vartheta + r\cos\overline{n-1}\,\vartheta)\right\}.$$

Denkt man sich ferner das Integral auf der linken Seite in zwei andere von $-\infty$ bis 0 und von 0 bis $\infty$ zerlegt, so ist klar, dass, wenn $m$ gerade, also $m-1$ ungerade ist, sich diese beiden Integrale aufheben, dass sie dagegen für ungerade $m$, also gerade $m-1$, sowohl dem Zeichen als dem Werthe nach einander gleich sind; im letzteren Falle kann man daher statt der linken Seite in der obigen Gleichung auch

$$n\int_{0}^{\infty}\frac{z^{m-1}}{1+z^n}\cos rz\,dz$$

schreiben. Setzt man endlich noch $r = ab$, $z = \frac{x}{a}$, so erhält man leicht für ungerade $m$ und gerade $n > m-1$

$$\int_{0}^{\infty}\frac{x^{m-1}}{a^n + x^n}\cos bx\,dx$$

$$= \frac{\pi}{na^{n-m}}\left\{e^{-ab\sin\vartheta}\sin(m\vartheta + ab\cos\vartheta)\right.$$

$$+ e^{-ab\sin 3\vartheta}\sin(3m\vartheta + ab\cos 3\vartheta) + ....$$

$$\left.... + e^{-ab\sin\overline{n-1}\,\vartheta}\sin(\overline{n-1}\,m\vartheta + ab\cos\overline{n-1}\,\vartheta)\right\} \qquad (5)$$

wobei immer $\vartheta = \frac{\pi}{n}$ ist.

Digitized by Google

Nimmt man beispielsweis $m=3$, $n=4$, so ergiebt sich nach einer kleinen goniometrischen Reduktion

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{a^4+x^4}\cos bx\,dx = \frac{\pi}{2a\sqrt{a}}\,e^{-ab:\sqrt{2}}\left[\cos\frac{ab}{\sqrt{2}} - \sin\frac{ab}{\sqrt{2}}\right]$$

oder $a\sqrt{2}$ für $a$ gesetzt

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{4a^4+x^4}\cos bx\,dx = \frac{\pi}{4a}\,e^{-ab}\left[\cos ab - \sin ab\right].$$

Differenzirt man die Gleichung (5) partiell nach $b$, so kann man aus ihr auch leicht den Werth des Integrales

$$\int_0^\infty \frac{x^m}{a^n+x^n}\sin bx\,dx$$

ableiten.

II. Unter den nämlichen Voraussetzungen hinsichtlich der Zahlen $m$ und $n$ ist auch

$$\frac{n}{2}\,\frac{z^{m-1}}{1-z^n}$$

$$= \frac{1}{1-z^2} + \frac{\cos 2(m-1)\vartheta - z\cos 2m\vartheta}{1-2z\cos 2\vartheta+z^2} + \frac{\cos 4(m-1)\vartheta - z\cos 4m\vartheta}{1-2z\cos 4\vartheta+z^2} + \ldots$$

$$\ldots + \frac{\cos(n-2)(m-1)\vartheta - z\cos(n-2)m\vartheta}{1-2z\cos(n-2)\vartheta+z^2}.$$

Multiplizirt man diess mit $\cos rz\,dz$, integrirt zwischen den Gränzen $z=-\infty$, $z=+\infty$ und bemerkt für das erste Glied rechts, dass

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos rz}{1-z^2}\,dz = 2\int_0^\infty \frac{\cos rz}{1-z^2}\,dz = \pi\sin r$$

Digitized by Google

ist, während man zur Verwerthung der übrigen Integrale die Formel (4) für $\omega = 2\vartheta$, $4\vartheta$, $6\vartheta$, ... $\overline{n-2}\,\vartheta$ in Anwendung bringt, so ergiebt sich

$$\frac{n}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{z^{m-1}}{1-z^n}\cos rz\,dz$$

$$= n\left\{\sin r + e^{-r\sin 2\vartheta}\sin(2m\vartheta + r\cos 2\vartheta)\right.$$

$$+ e^{-r\sin 4\vartheta}\sin(4m\vartheta + r\cos 4\vartheta) + \ldots$$

$$\left.\ldots + e^{-r\sin\overline{n-2}\,\vartheta}\sin(\overline{n-2}\,m\vartheta + r\cos\overline{n-2}\,\vartheta)\right\}$$

oder wenn man $r = ab$, $z = \frac{x}{a}$ und $m$ als ungerade voraussetzt

$$\int_0^{\infty}\frac{x^{m-1}}{a^n - x^n}\cos bx\,dx$$

$$= \frac{n}{n\,a^{n-m}}\left\{\sin ab + e^{-ab\sin 2\vartheta}\sin(2m\vartheta + ab\cos 2\vartheta) + \ldots.\right.$$

$$\left.\ldots. + e^{-ab\sin\overline{n-2}\,\vartheta}\sin(\overline{n-2}\,m\vartheta + ab\cos\overline{n-2}\,\vartheta)\right\} \quad (6)$$

und hieraus würde man durch partielle Differenziation nach $b$ auch noch den Werth des Integrales

$$\int_0^{\infty}\frac{x^m}{a^n - x^n}\sin bx\,dx$$

ohne Schwierigkeit ableiten können.

Digitized by Google

## §. 17.

Multiplizirt man von den beiden Integralen

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos hu}{k^2+u^2}\,du = \frac{\pi}{k}\,e^{-hk}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin hu}{k^2+u^2}\,du = 0$$

das zweite mit $\sqrt{-1} = i$ und subtrahirt es darauf von dem ersten mit der Bemerkung, dass

$$\cos hu - i \sin hu = e^{-hui}$$

ist, so erhält man sogleich:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{du}{k^2+u^2}\,e^{-hui} = \frac{\pi}{k}\,e^{-hk}. \tag{1}$$

Diese Formel combinirt Lejeune Dirichlet*) mit der aus der Theorie der Gammafunktionen bekannten:

$$\frac{\Gamma(m)}{(a+ui)^m} = \int_0^{\infty} x^{m-1}\,e^{-(a+ui)x}\,dx \tag{2}$$

worin $a$ als positiv vorausgesetzt wird, auf folgende ebenso einfache als nette Weise. Man multiplizirt die vorstehende Gleichung mit

$$\frac{du}{k^2+u^2}\,e^{-hui}$$

und integrirt darauf zwischen den Gränzen $u = -\infty$, $u = +\infty$; es ergiebt sich so:

*) M. s. Crelle's *Journal*, *Bd.* 4, *S.* 94.

Digitized by Google

$$\left.\begin{aligned} &\Gamma(m)\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{-hui}}{k^2+u^2}\,\frac{du}{(a+ui)^m} \\ &=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{du}{k^2+u^2}\,e^{-hui}\int_0^{\infty}x^{m-1}e^{-(a+ui)x}\,dx \end{aligned}\right\} \quad (3)$$

wobei die rechte Seite durch Vertauschung der beiden Integrationen in

$$\int_0^{\infty}x^{m-1}e^{-ax}\,dx\int_{-\infty}^{\infty}\frac{du}{k^2+u^2}\,e^{-(h+x)ui}$$

übergeht und sich nun die Integration nach $u$ ausführen lässt, wenn man in Formel (1) $h+x$ für $h$ setzt. Das vorliegende Doppelintegral reduzirt sich demnach auf das einfache

$$\int_0^{\infty}x^{m-1}e^{-ax}\,dx\,\frac{\pi}{k}e^{-(h+x)k}=\frac{\pi}{k}e^{-hk}\int_0^{\infty}x^{m-1}e^{-(a+k)x}\,dx$$

dessen Werth durch

$$\frac{\pi}{k}e^{-hk}\,\frac{\Gamma(m)}{(a+k)^m}$$

ausgedrückt wird. Indem man diess für die rechte Seite der Gleichung (3) substituirt, ergiebt sich:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{-hui}}{k^2+u^2}\cdot\frac{du}{(a+ui)^m}=\frac{\pi\,e^{-hk}}{k}\cdot\frac{1}{(a+k)^m}. \quad (4)$$

Das Verfahren, welches zu dieser Gleichung führte, lässt sich wieder auf sie selbst anwenden. Multiplizirt man nämlich die der Formel (2) ähnliche

$$\frac{\Gamma(n)}{(b+ui)^n}=\int_0^{\infty}x^{n-1}e^{-(b+ui)x}\,dx$$

Digitized by Google

mit dem Ausdrucke

$$\frac{e^{-hui}}{k^2+u^2}\cdot\frac{du}{(a+ui)^m}$$

d. i. dem Nämlichen, was in (4) unter dem Integralzeichen steht, und integrirt wieder zwischen den Gränzen $u=-\infty$, $u=+\infty$, so wird

$$\left.\begin{aligned}\Gamma(n)\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{-hui}}{k^2+u^2}\cdot\frac{1}{(a+ui)^m}\cdot\frac{1}{(b+ui)^n}du\\ =\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{-hui}}{k^2+u^2}\cdot\frac{du}{(a+ui)^m}\int_0^{\infty}x^{n-1}e^{-(b+ui)x}dx\,.\end{aligned}\right\}\quad(5)$$

Durch Umkehrung der Integrationsfolgen geht die rechte Seite in

$$\int_0^{\infty}x^{n-1}e^{-bx}dx\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{-(h+x)ui}}{k^2+u^2}\frac{du}{(a+ui)^m}$$

wobei man die Formel (4) in Anwendung bringt, indem man darin $h$ durch $h+x$ ersetzt. Das vorliegende Doppelintegral reduzirt sich jetzt auf

$$\int_0^{\infty}x^{n-1}e^{-bx}dx\,\frac{\pi}{k}\frac{e^{-(h+x)k}}{(a+k)^m}$$

$$=\frac{\pi}{k}\frac{e^{-hk}}{(a+k)^m}\frac{\Gamma(n)}{(b+k)^n}$$

und wenn diess in die Gleichung (5) eingeführt wird, so kommt:

Digitized by Google

$$\left.\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-hui}}{k^2+u^2} \cdot \frac{1}{(a+ui)^m} \cdot \frac{1}{(b+ui)^n} du \\ = \frac{\pi e^{-hk}}{k} \cdot \frac{1}{(a+k)^m} \cdot \frac{1}{(b+k)^n}.\end{aligned}\right\} \quad (6)$$

Man wird leicht den weiteren Fortgang dieses Calcüls übersehen; der nächste Schritt z. B. würde darin bestehen, dass man in der Formel (2) $c$ und $p$ für $a$ und $m$ setzt, die so entstandene Gleichung mit Dem multiplizirt, was in Nr. (6) unter dem Integralzeichen enthalten ist, darauf die Integrationsfolgen von $x$ und $u$ vertauscht und die Integrationen dadurch ausführt, dass man erst die Formel (6) für $h+x$ statt $h$ in Anwendung bringt, und die noch übrige Integration nach $x$ mittelst der Fundamentalformel der Gammafunktionen vollendet. Ueberhaupt hat man im Allgemeinen

$$\left.\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-hui}}{k^2+u^2} \cdot \frac{1}{(a+ui)^m} \cdot \frac{1}{(b+ui)^n} \cdot \frac{1}{(c+ui)^p} \cdots du \\ = \frac{\pi e^{-hk}}{k} \cdot \frac{1}{(a+k)^m} \cdot \frac{1}{(b+k)^n} \cdot \frac{1}{(c+k)^p} \cdots\end{aligned}\right\} \quad (7)$$

wobei nicht zu vergessen ist, dass $h$, $k$, $a$, $b$, $c$, ... sämmtlich positive Grössen sein müssen.

Hieraus lässt sich eine fernere Formel dadurch ableiten, dass man eine der Grössen $m$, $n$, $p$, $q$, etc. wieder als Veränderliche ansieht und in Bezug auf dieselbe differenzirt oder integrirt. Sei etwa $y$ eine jener Grössen und $u$ eine von den Zahlen $a$, $b$, $c$, ... so erhält man durch Multiplikation mit $y^{\mu-1} dy$ und Integration zwischen den Gränzen $y=0$, $y=\infty$:



Digitized by Google

$$\int_0^\infty y^{\mu-1}\,dy \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-hui}}{k^2+u^2} \cdot \frac{1}{(a+ui)^m} \cdot \frac{1}{(b+ui)^n} \cdots \frac{1}{(a+ui)^y}\,du$$

$$= \frac{\pi e^{-hk}}{k} \cdot \frac{1}{(a+k)^m} \cdot \frac{1}{(b+k)^n} \cdots \int_0^\infty \frac{y^{\mu-1}\,dy}{(a+k)^y}.$$

Kehrt man auf der linken Seite die Integrationsordnung um und bestimmt dann die Werthe der beiderseits vorkommenden Integrale mittelst der Formel

$$\int_0^\infty \frac{y^{\mu-1}\,dy}{s^y} = \int_0^\infty y^{\mu-1} e^{-y\,ls}\,dy = \frac{\Gamma(\mu)}{(ls)^\mu}$$

so ergiebt sich auf der Stelle

$$\left.\begin{aligned} &\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-hui}}{k^2+u^2} \cdot \frac{1}{(a+ui)^m} \cdot \frac{1}{(b+ui)^n} \cdots \frac{1}{\{l(a+ui)\}^\mu}\,du \\ &= \frac{\pi e^{-hk}}{k} \cdot \frac{1}{(a+k)^m} \cdot \frac{1}{(b+k)^n} \cdots \frac{1}{\{l(a+k)\}^\mu}. \end{aligned}\right\} \quad (8)$$

Verfährt man hier wieder so, indem man unter den Zahlen $a$, $b$, $c$, ... irgend eine $\beta$ und unter $m$, $n$, ... etwa $z$ aushebt, mit $z^{\nu-1}\,dz$ multiplizirt und zwischen $z=0$, $z=\infty$ integrirt, so erhält man eine ganz ähnliche Formel, in welcher zwei logarithmische Faktoren vorkommen. Und so überzeugt man sich überhaupt leicht von der Richtigkeit der allgemeinen Gleichung:

Digitized by Google

$$\left.\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-hui}}{k^2+u^2} \frac{1}{(a+ui)^m} \frac{1}{(b+ui)^n} \cdots \\ \cdots \frac{1}{[l(\alpha+ui)]^\mu} \frac{1}{[l(\beta+ui)]^\nu} \cdots du \\ = \frac{\pi e^{-hk}}{k} \frac{1}{(a+k)^m} \frac{1}{(b+k)^n} \cdots \frac{1}{[l(\alpha+k)]^\mu} \frac{1}{[l(\beta+k)]^\nu} \cdots .\end{aligned}\right\} \quad (9)$$

welche wegen der vielen in ihr enthaltenen willkührlichen Constanten zahlreiche Spezialisirungen zulässt.

## §. 18.

Eine fernere Anwendung der Theoreme

$$\int_0^\infty \frac{\cos bu}{a^2+u^2} du = \frac{\pi}{2a} e^{-ab} \quad (1)$$

$$\int_0^\infty \frac{u \sin bu}{a^2+u^2} du = \frac{\pi}{2} e^{-ab} \quad (2)$$

gründet sich auf den folgenden sehr einfachen Gedankengang. — Kennt man eine Funktion $F(x)$, welche sich wenigstens für alle innerhalb eines gewissen Intervalles liegenden Werthe von $x$, mittelst Mac Laurin's Theorem, in eine Reihe von der Form

$$F(x) = A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + \ldots \quad (3)$$

verwandeln lässt, so ist es nicht schwer, die Summen der Reihen

$$\begin{aligned} &A + Br\cos u + Cr^2\cos 2u + Dr^3\cos 3u + \ldots \\ &\quad + Br\sin u + Cr^2\sin 2u + Dr^3\sin 3u + \ldots \end{aligned}$$

worin $r$ den nämlichen Bedingungen wie früher $x$ unterliegt, ausfindig zu machen. Setzt man in Nr. (3) $r(\cos u + i\sin u)$ für $x$, indem $i$

Digitized by Google

die Stelle von $\sqrt{-1}$ vertritt, und zerlegt jetzt $F(x)$ in seine reelle und imaginäre Partie dergestalt, dass

$$F\left[r\,(\cos u + i \sin u)\right] = \Phi(r, u) + i\,{}^{i}\Psi(r, u) \qquad (4)$$

ist, so erhält man auf der Stelle aus der Vergleichung der reellen und imaginären Bestandtheile der nunmehrigen Gleichung

$$\left.\begin{aligned} \Phi(r, u) &= A + Br\cos u + Cr^2 \cos 2u + \ldots \\ {}^{i}\Psi(r, u) &= Br \sin u + Cr^2 \sin 2u + Dr^3 \sin 3u + \ldots \end{aligned}\right\} \qquad (5)$$

Man übersieht nun gleich, dass, wenn man die erste dieser Gleichungen mit $\frac{du}{a^2 + u^2}$, die zweite mit $\frac{u\,du}{a^2 + u^2}$ multiplizirt und darauf zwischen den Gränzen $u = 0$, $u = \infty$ integrirt, sich jede der Integrationen auf der rechten Seite ausführen lässt, indem man der Reihe nach in Formel (1) $b = 0, 1, 2, 3,$ etc. und in Nr. (2) $b = 1, 2, 3,$ etc. setzt. Auf diese Weise ergiebt sich ohne die mindeste Schwierigkeit

$$\int_0^\infty \frac{\Phi(r, u)}{a^2 + u^2}\,du$$

$$= \frac{\pi}{2a}\left[A + Br\,e^{-a} + Cr^2\,e^{-2a} + Dr^3\,e^{-3a} + \ldots\right]$$

$$\int_0^\infty \frac{u\,{}^{i}\Psi(r, u)}{a^2 + u^2}\,du$$

$$= \frac{\pi}{2}\left[Br\,e^{-a} + Cr^2\,e^{-2a} + Dr^3\,e^{-3a} + \ldots\right].$$

Die auf der jedesmaligen rechten Seite vorkommenden Reihen sind nach Formel (3) selbst wieder summirbar, indem man dort $r\,e^{-a}$ für $x$ substituirt und bemerkt, dass $A = F(0)$ ist. Demnach kann man jetzt die beiden Theoreme aufstellen:

Digitized by Google

$$\int_0^\infty \frac{\Phi(r,u)}{a^2+u^2}\,du = \frac{\pi}{2a}\,F(r\,e^{-a}), \quad a>0, \tag{6}$$

$$\int_0^\infty \frac{u\Psi(r,u)}{a^2+u^2}\,du = \frac{\pi}{2}\left[F(r\,e^{-a})-F(0)\right], \quad a\geqq 0, \tag{7}$$

wobei nicht zu vergessen ist, dass die Funktionen $F$, $\Phi$, $\Psi$ durch die Gleichung (4) mit einander liirt sind und ausserdem das Mac Laurin'sche Theorem auf $F(x)$ anwendbar sein muss. Man kann zu den obigen zwei Theoremen gleich noch ein drittes stellen, wenn man die Formel (7) für $a=0$ spezialisirt und sie selbst von ihrem speziellen Falle

$$\int_0^\infty \frac{\Psi(r,u)}{u}\,du = \frac{\pi}{2}\left[F(r)-F(0)\right]$$

subtrahirt; man findet so

$$\int_0^\infty \frac{\Psi(r,u)}{a^2+u^2}\,\frac{du}{u} = \frac{\pi}{2}\left[F(r)-F(r\,e^{-a})\right], \quad a\geqq 0. \tag{8}$$

Es ist nichts leichter, als hierzu Beispiele zu geben. Nimmt man etwa $F(x)=l(1+x)$, welche Funktion für $1\geqq x\geqq -1$ in eine unendliche Potenzenreihe verwandelbar ist, so wird

$$l\left[1+r(\cos u+i\sin u)\right]$$
$$= \tfrac{1}{2}l(1+2r\cos u+r^2)+i\,Arctan\,\frac{r\sin u}{1+r\cos u}$$

und folglich

$$\int_0^\infty \frac{l(1+2r\cos u+r^2)}{a^2+u^2}\,du = \frac{\pi}{a}\,l(1+r\,e^{-a}),\ 1\geqq r\geqq -1, \tag{9}$$

$$\int_0^\infty \frac{u\,du}{a^2+u^2}\,Arctan\,\frac{r\sin u}{1+r\cos u} = \frac{\pi}{2a}\,l(1+r\,e^{-a}),\ 1\geqq r\geqq -1. \tag{10}$$

Digitized by Google

Bemerkenswerth ist noch eine Vorsicht, welche man an den Gränzen $r = \pm 1$ der Gültigkeit dieser Formeln zu beachten hat. So ist für $r = +1$,

$$\int_0^\infty \frac{l(2\cos\frac{1}{2}u)^2}{a^2+u^2}\,du = \frac{\pi}{a}\,l(1+e^{-a})$$

$$\int_0^\infty \frac{u\,Arctan\,(tan\,\frac{1}{2}u)}{a^2+u^2}\,du = \frac{\pi}{2a}\,l(1+e^{-a})$$

aber man darf sich hier nicht einfallen lassen, $2\,l(2\cos\frac{1}{2}u)$ für $l(2\cos\frac{1}{2}u)^2$ und $\frac{1}{2}u$ für $Arctan\,(tan\,\frac{1}{2}u)$ schreiben zu wollen. Die ersten beiden Funktionen sind nämlich blos so lange identisch, als $\cos\frac{1}{2}u$ positiv bleibt, also von $u = -\pi$ bis $u = +\pi$, darüber hinaus wird $2\,l(2\cos\frac{1}{2}u)$ stellenweis imaginär, während $l(2\cos\frac{1}{2}u)^2$ immer reell bleibt. Ebenso fallen die Funktionen $\frac{1}{2}u$ und $Arctan\,(tan\,\frac{1}{2}u)$ nur von $u = -\pi$ bis $u = +\pi$ zusammen, für $u > \pi$ dagegen tritt in der zweiten ein periodischer Zeichenwechsel und eine Oscillation zwischen $+\frac{\pi}{2}$ und $-\frac{\pi}{2}$ ein, während die erste immer wächst und ihr Vorzeichen nie ändert. Ganz ähnliche Bemerkungen treffen den Fall $r = -1$. — Nimmt man in der Formel (9) $r = \frac{1}{\varrho}$, wo nun $\varrho > 1$ ist, so wird

$$\int_0^\infty \frac{l(\varrho^2+2\varrho\cos u+1) - l(\varrho^2)}{a^2+u^2}\,du = \frac{\pi}{a}\,l\left(1+\frac{1}{\varrho}\,e^{-a}\right)$$

und wenn man die einzelnen Bestandtheile des Integrales links trennt und wieder $r$ für $\varrho$ schreibt

$$\int_0^\infty \frac{l(1+2r\cos u+r^2)}{a^2+u^2}\,du = \frac{\pi}{a}\,l(r+e^{-a}),\quad r>1.$$

Hier sieht man a posteriori, dass die Formel (9) nicht für $r > 1$ gelten kann, indem der Werth des Integrales in diesem Falle ein anderer ist, als für $r < 1$.

Digitized by Google

Als zweites Beispiel für die Anwendung der Theoreme (6), (7) und (8) diene die Annahme

$$F(x) = \frac{1}{1+x}$$

wo nun $1 > x > -1$ sein muss, weil nur unter dieser Bedingung der Ausdruck in eine Potenzenreihe verwandelbar ist. Hier wird nun

$$\frac{1}{1+r(\cos u + i \sin u)} = \frac{1+r\cos u}{1+2r\cos u+r^2} - i\frac{r\sin u}{1+2r\cos u+r^2}$$

und folglich

$$\int_0^\infty \frac{1+r\cos u}{1+2r\cos u+r^2}\cdot\frac{du}{a^2+u^2} = \frac{\pi}{2a}\,\frac{1}{1+re^{-a}},\quad 1>r>-1, \tag{11}$$

$$\int_0^\infty \frac{r\sin u}{1+2r\cos u+r^2}\cdot\frac{u\,du}{a^2+u^2} = \frac{\pi}{2}\,\frac{re^{-a}}{1+re^{-a}},\quad 1>r>-1. \tag{12}$$

Der Gränzfall $r = \pm 1$ bedarf hier noch einer besonderen Untersuchung; da nämlich die Gleichungen

$$\Phi(r,u) = \frac{1+r\cos u}{1+2r\cos u+r^2}$$

$$= 1 - r\cos u + r^2\cos 2u - r^3\cos 3u + \ldots.$$

$$\Psi(r,u) = \frac{r\sin u}{1+2r\cos u+r^2}$$

$$= r\sin u - r^2\sin 2u + r^3\sin 3u - \ldots.$$

für $r = \pm 1$ ihre Gültigkeit verlieren, so ist man offenbar nicht berechtigt, die Formeln (11) und (12) für diesen Fall in Anspruch zu nehmen. Man hilft sich dann sehr einfach auf folgende Weise. Sei etwa $r = +1$, so ist:

Digitized by Google

$$\sin u - \sin 2u + \sin 3u - \ldots + \sin nu$$

$$= \tfrac{1}{2}\tan \tfrac{1}{2}u + \tfrac{1}{2}\frac{\sin(2n+1)\frac{u}{2}}{\cos\frac{u}{2}}$$

wovon man sich leicht durch beiderseitige Multiplikation mit $2\cos\frac{u}{2}$ überzeugen kann. Durch Zusetzung des Faktors $\frac{u\,du}{a^2+u^2}$ und Integration jedes einzelnen Gliedes ergiebt sich hieraus

$$\frac{\pi}{2}\left(e^{-a} - e^{-2a} + e^{-3a} - \ldots + e^{-na}\right)$$

$$= \tfrac{1}{2}\int_0^\infty \frac{u\tan\frac{1}{2}u}{a^2+u^2}\,du + \tfrac{1}{2}\int_0^\infty \frac{\sin k\frac{u}{2}}{\cos\frac{u}{2}}\cdot\frac{u\,du}{a^2+u^2}$$

wobei $k$ zur Abkürzung für $2n+1$ dient. Lässt man nun $n$ und ebenso $k$ ins Unendliche wachsen, so wird

$$\tfrac{1}{2}\int_0^\infty \frac{u\tan\frac{1}{2}u}{a^2+u^2}\,du + \tfrac{1}{2}\,Lim\int_0^\infty \frac{\sin k\frac{u}{2}}{\cos\frac{u}{2}}\,\frac{u\,du}{a^2+u^2}$$

$$= \frac{\pi}{2}\left(e^{-a} - e^{-2a} + e^{-3a} - \ldots \text{ in inf.}\right)$$

$$= \frac{\pi}{2}\cdot\frac{e^{-a}}{1+e^{-a}}.$$

Setzt man in dem zweiten Integrale links $u = 2t$ und bringt noch den Faktor $\frac{1}{\sin t}\sin t$ hinzu, so ist jenes Integral auch:

$$\int_0^\infty \frac{\sin kt}{\sin t}\cdot\frac{\sin t}{\cos t}\,\frac{4t\,dt}{a^2+4t^2}$$

Digitized by Google

und der Gränzwerth hiervon ist die Null, wie man leicht mit Hülfe der Formel (10) in §. 3 für

$$f(t) = \frac{\sin t}{\cos t} \cdot \frac{4t}{a^2 + 4t^2}$$

finden wird. Es bleibt demnach

$$\int_0^\infty \frac{u \tan \frac{1}{2}u}{a^2 + u^2}\, du = \frac{\pi e^{-a}}{1 + e^{-a}}. \qquad (13)$$

Das Nämliche ergiebt sich auch aus der Formel (12) für $r = 1$, so dass dieselbe noch in diesem Falle richtig bleibt. Wenn es also auch unrichtig gewesen wäre, schlechtweg

$$\tfrac{1}{2}\tan \tfrac{1}{2}u = \sin u + \sin 2u + \sin 3u - \ldots.$$

zu setzen, so ist diese Substitution doch unter dem Integralzeichen erlaubt, weil der an sich nicht verschwindende Rest der vorstehenden Reihe nach geschehener Integration sich annullirt. Auf ähnliche Weise lässt sich zeigen, dass die Formel (12) auch für $r = -1$ gilt, während man dagegen in Nr. (11) $r$ weder $= +1$ noch $= -1$ setzen darf.

Eine ganz analoge Betrachtung ist auf die Formeln

$$\int_0^\infty \frac{\cos bu}{a^2 - u^2}\, du = \frac{\pi}{2a} \sin ab, \quad a > 0, \qquad (14)$$

$$\int_0^\infty \frac{u \sin bu}{a^2 - u^2}\, du = -\frac{\pi}{2} \cos ab, \quad a \geqq 0, \qquad (15)$$

anwendbar und führt zu zwei Theoremen, welche einige Aehnlichkeit mit den in (6) und (7) entwickelten haben. Für

$$F(x) = A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + \ldots$$



Digitized by Google

und

$$\Phi(r, u) = A + Br\cos u + Cr^2\cos 2u + \ldots$$

$$\Psi(r, u) = Br\sin u + Cr^2\sin 2u + Dr^3\sin 3u + \ldots$$

ergiebt sich nämlich sehr leicht

$$\int_0^\infty \frac{\Phi(r, u)}{a^2 - u^2}\, du$$

$$= \frac{\pi}{2a}\left[A + Br\sin a + Cr^2\sin 2a + \ldots\ldots\right]$$

$$\int_0^\infty \frac{u\Psi(r, u)}{a^2 - u^2}\, du$$

$$= -\frac{\pi}{2}\left[Br\cos a + Cr^2\cos 2a + Dr^3\cos 3a + \ldots\right]$$

d. i. wenn man die Reihen rechts summirt

$$\int_0^\infty \frac{\Phi(r, u)}{a^2 - u^2}\, du = \frac{\pi}{2a}\left[F(0) + \Psi(r, a)\right], \quad a > 0, \quad (16)$$

$$\int_0^\infty \frac{u\Psi(r, u)}{a^2 - u^2}\, du = \frac{\pi}{2}\left[F(0) - \Phi(r, a)\right], \quad a \geqq 0. \quad (17)$$

Für $a = 0$ giebt die zweite Formel unter der Bemerkung, dass $\Phi(r, 0) = F(r)$ ist

$$\int_0^\infty \frac{\Psi(r, u)}{u}\, du = \frac{\pi}{2}\left[F(0) - F(r)\right]$$

und zu diesen Theoremen wird man ebenso leicht Beispiele finden, wie zu den vorigen.

Digitized by Google

Etwas allgemeinere Formeln kann man noch erhalten, wenn man statt von den Gleichungen (1) und (2) von den folgenden

$$\int_0^\infty \frac{\cos \mu u \cos nu}{a^2 + u^2}\, du = \frac{\pi}{4a} (e^{\mu a} + e^{-\mu a})\, e^{-na}$$

$$\int_0^\infty \frac{\sin \mu u \sin nu}{a^2 + u^2}\, du = \frac{\pi}{4a} (e^{\mu a} - e^{-\mu a})\, e^{-na}$$

$$\int_0^\infty \frac{u \cos \mu u \sin nu}{a^2 + u^2}\, du = \frac{\pi}{4} (e^{\mu a} + e^{-\mu a})\, e^{-na}$$

$$\int_0^\infty \frac{u \sin \mu u \cos nu}{a^2 + u^2}\, du = -\frac{\pi}{4} (e^{\mu a} - e^{-\mu a})\, e^{-na}$$

ausgeht, deren an die Bedingung $\mu < n$ geknüpfte Richtigkeit leicht dadurch zu erkennen ist, dass man die links vorkommenden Produkte goniometrischer Funktionen in Summen oder Differenzen zerlegt.

## §. 19.

Der Nerv unserer im vorigen Paragraphen durchgeführten Betrachtung liegt, wie man leicht bemerken wird, hauptsächlich darin, dass die in den Grundformeln (1) und (2), (14) und (15) vorkommende willkührliche Constante $b$ verschiedene Werthe erhielt und darauf alle so entstandenen Gleichungen addirt wurden, entweder unmittelbar, oder nach vorgängiger Multiplikation mit beliebigen constanten Faktoren, wie $A$, $Br$, $Cr^2$ etc. Der gute Erfolg dieser Manipulation muss uns auffordern, eine ähnliche Rechnung in Bezug

Digitized by Google

auf die Constante $a$ durchzuführen, was in der That keine Schwierigkeiten macht.

Schreiben wir z. B. in der Formel (6) des §. 6 $u$ für $a$, $\omega$ für $x$ und multipliziren die so entstandene Gleichung

$$\frac{\pi}{2}\,\frac{e^{\omega u}+e^{-\omega u}}{e^{\pi u}-e^{-\pi u}}$$

$$=\frac{1}{2}\,\frac{1}{u}-\cos\omega\,\frac{u}{1^2+u^2}+\cos 2\omega\,\frac{u}{2^2+u^2}-\cos 3\omega\,\frac{u}{3^2+u^2}+\ldots$$

$$\pi \geqq \omega \geqq -\pi$$

mit $\sin bu\,du$, so erhellt auf der Stelle, dass sich jedes Glied der Reihe rechts zwischen den Gränzen $u=0$ und $u=\infty$ integriren lässt, sobald man die Formel (2) des vorigen Paragraphen für $a=0, 1, 2, \ldots$ in Anspruch nimmt. Man findet nämlich

$$\frac{\pi}{2}\int_0^\infty \frac{e^{\omega u}+e^{-\omega u}}{e^{\pi u}-e^{-\pi u}}\sin bu\,du$$

$$=\frac{\pi}{2}\left(\tfrac{1}{2}-\cos\omega\,e^{-b}+\cos 2\omega\,e^{-2b}-\cos 3\omega\,e^{-3b}+\ldots.\right)$$

wobei sich die Reihe auf der rechten Seite nach der bekannten Formel

$$\tfrac{1}{2}-r\cos\omega+r^2\cos 2\omega-r^3\cos 3\omega+\ldots$$

$$=\tfrac{1}{2}\cdot\frac{1-r^2}{1+2r\cos\omega+r^2}$$

summiren lässt. Man erhält so ohne Schwierigkeit:

Digitized by Google

$$\left.\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{e^{\omega u}+e^{-\omega u}}{e^{\pi u}-e^{-\pi u}} \sin bu\, du &= \tfrac{1}{2}\,\frac{e^{b}-e^{-b}}{e^{b}+2\cos\omega+e^{-b}}\\ b>0,\quad \pi \geqq \omega &\geqq -\pi .\end{aligned}\right\} \quad (1)$$

Zu einem ganz analogen Resultate gelangt man durch ähnliche Behandlung der für $\pi > \omega > -\pi$ geltenden Gleichung

$$\frac{\pi}{2}\,\frac{e^{\omega u}-e^{-\omega u}}{e^{\pi u}-e^{-\pi u}}$$

$$= \sin\omega\,\frac{1}{1^2+u^2} - 2\sin 2\omega\,\frac{1}{2^2+u^2} + 3\sin 3\omega\,\frac{1}{3^2+u^2} - \ldots .$$

welche mit Nr. (11) in §. 6 identisch ist. Multiplizirt man nämlich mit $\cos bu\, du$, integrirt hierauf zwischen den Gränzen $u=0$, $u=\infty$ und bestimmt die Werthe der einzelnen Integrale rechts nach Formel (1) des vorigen Paragraphen, indem man $a=1, 2, 3, \ldots$ nimmt, so wird

$$\frac{\pi}{2}\int_0^\infty \frac{e^{\omega u}-e^{-\omega u}}{e^{\pi u}-e^{-\pi u}} \cos bu\, du$$

$$= \frac{\pi}{2}\left[\sin\omega\, e^{-b} - \sin 2\omega\, e^{-2b} + \sin 3\omega\, e^{-3b} - \ldots .\right]$$

und durch Summirung der Reihe rechts

$$\left.\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{e^{\omega u}-e^{-\omega u}}{e^{\pi u}-e^{-\pi u}} \cos bu\, du &= \frac{\sin\omega}{e^{b}+2\cos\omega+e^{-b}}\\ b\geqq 0,\quad \pi > \omega &> -\pi .\end{aligned}\right\} \quad (2)$$

Als spezielle Fälle der Formeln (1) und (2) sind bemerkenswerth:

Digitized by Google

1) Für $\omega = 0$ aus Nr. (1)

$$\int_0^\infty \frac{\sin bu\, du}{e^{\pi u} - e^{-\pi u}} = \tfrac{1}{4} \frac{e^{\frac{1}{2}b} - e^{-\frac{1}{2}b}}{e^{\frac{1}{2}b} + e^{-\frac{1}{2}b}}, \quad b > 0, \tag{3}$$

ferner für $\omega = \pi$,

$$\int_0^\infty \frac{e^{\pi u} + e^{-\pi u}}{e^{\pi u} - e^{-\pi u}} \sin bu\, du = \tfrac{1}{2} \frac{e^{\frac{1}{2}b} + e^{-\frac{1}{2}b}}{e^{\frac{1}{2}b} - e^{-\frac{1}{2}b}}, \quad b > 0, \tag{4}$$

und wenn man hiervon die vorige Gleichung doppelt genommen subtrahirt, so findet man noch

$$\int_0^\infty \frac{e^{\frac{1}{2}\pi u} - e^{-\frac{1}{2}\pi u}}{e^{\frac{1}{2}\pi u} + e^{-\frac{1}{2}\pi u}} \sin bu\, du = \frac{2}{e^{b} - e^{-b}}, \quad b > 0. \tag{5}$$

2) Nimmt man in der Formel (2) $\omega = \frac{\pi}{2}$ so wird

$$\int_0^\infty \frac{\cos bu\, du}{e^{\frac{1}{2}\pi u} + e^{-\frac{1}{2}\pi u}} = \frac{1}{e^{b} + e^{-b}}, \quad b \geqq 0. \tag{6}$$

Der soeben ausgesprochene Gedanke lässt sich noch etwas weiter ausführen und liefert dann die Werthe der allgemeineren Integrale

$$\int_0^\infty \frac{e^{\omega u} + e^{-\omega u}}{e^{\pi u} - e^{-\pi u}} \cdot \frac{\sin bu}{\mu^2 + u^2}\, du \tag{7}$$

und

$$\int_0^\infty \frac{e^{\omega u} - e^{-\omega u}}{e^{\pi u} - e^{-\pi u}} \cdot \frac{\cos bu}{\mu^2 + u^2}\, du. \tag{8}$$

Digitized by Google

I. Setzt man statt der Grösse

$$\frac{e^{\omega u} + e^{-\omega u}}{e^{\pi u} - e^{-\pi u}}$$

die vorhin benutzte Reihe, so zerfälllt das in Rede stehende Integral (7) in:

$$\frac{1}{\pi}\int_0^\infty \frac{\sin bu}{\mu^2+u^2}\cdot\frac{du}{u} - \frac{2\cos\omega}{\pi}\int_0^\infty \frac{u\sin bu\,du}{(1^2+u^2)(\mu^2+u^2)}$$

$$+\frac{2\cos 2\omega}{\pi}\int_0^\infty \frac{u\sin bu\,du}{(2^2+u^2)(\mu^2+u^2)} - \ldots\ldots$$

Jedes einzelne Integral auf der rechten Seite lässt sich leicht verwerthen, wenn man bemerkt, dass ihre allgemeine Form

$$\int_0^\infty \frac{u\sin bu\,du}{(n^2+u^2)(\mu^2+u^2)}$$

$$= \frac{1}{n^2-\mu^2}\int_0^\infty \left\{\frac{1}{\mu^2+u^2} - \frac{1}{n^2+u^2}\right\} u\sin bu\,du$$

$$= \frac{1}{n^2-\mu^2}\,\frac{\pi}{2}\,(e^{-\mu b} - e^{-nb})$$

ist, woraus man sogleich findet:

$$\int_0^\infty \frac{e^{\omega u} + e^{-\omega u}}{e^{\pi u} - e^{-\pi u}}\,\frac{\sin bu}{\mu^2+u^2}\,du \qquad (9)$$

$$= \frac{1}{2\mu^2}(1 - e^{-\mu b}) - \frac{\cos\omega}{1^2-\mu^2}(e^{-\mu b} - e^{-b})$$

$$+\frac{\cos 2\omega}{2^2-\mu^2}(e^{-\mu b} - e^{-2b})$$

$$+ \ldots\ldots\ldots\ldots$$

Digitized by Google

wobei die Bedingung $\pi \geqq \omega \geqq -\pi$ zu berücksichtigen ist. Zur vollständigen Angabe des Integrales links würde nun noch die Summirung der rechts vorkommenden Reihe gehören, was aber nicht immer ausführbar ist. Mit Leichtigkeit lässt sich diese Summirung nur in einigen speziellen Fällen bewerkstelligen, welche daher näher betrachtet werden mögen.

Für $\mu = 1$ findet man zunächst

$$\int_0^\infty \frac{e^{\omega u} + e^{-\omega u}}{e^{\pi u} - e^{-\pi u}} \frac{\sin bu}{1+u^2}\, du$$

$$= \tfrac{1}{2}(1 - e^{-b}) - \cos\omega \frac{b}{2} e^{-b}$$

$$+ \frac{\cos 2\omega}{1.3}(e^{-b} - e^{-2b})$$

$$- \frac{\cos 3\omega}{2.4}(e^{-b} - e^{-3b})$$

$$+ \ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$= \tfrac{1}{2}(1 - e^{-b}) - \frac{b}{2} e^{-b} \cos\omega$$

$$+ e^{-b}\left(\frac{\cos 2\omega}{1.3} - \frac{\cos 3\omega}{2.4} + \frac{\cos 4\omega}{3.5} - \ldots.\right)$$

$$- \left(e^{-2b}\frac{\cos 2\omega}{1.3} - e^{-3b}\frac{\cos 3\omega}{2.4} + e^{-4b}\frac{\cos 4\omega}{3.5} - \ldots..\right). \quad (10)$$

Man übersieht auf der Stelle, dass es hier blos auf die Summirung einer Reihe von der Form

$$\frac{r^2 \cos 2\omega}{1.3} - \frac{r^3 \cos 3\omega}{2.4} + \frac{r^4 \cos 4\omega}{3.5} - \ldots, \quad r < 1,$$

ankommt, die sich leicht in folgender Weise ausführen lässt. Es ist bekanntlich:

Digitized by Google

$$\tfrac{1}{2}\,l(1+2r\cos\omega+r^2)=\frac{r\cos\omega}{1}-\frac{r^2\cos 2\omega}{2}+\frac{r^3\cos 3\omega}{3}-\ldots.$$

$$Arctan\,\frac{r\sin\omega}{1+r\cos\omega}=\frac{r\sin\omega}{1}-\frac{r^2\sin 2\omega}{2}+\frac{r^3\sin 3\omega}{3}-\ldots.$$

wobei wir die links vorkommenden Funktionen zur Abkürzung mit $\varphi(r,\omega)$, $\psi(r,\omega)$ bezeichnen wollen. Man findet jetzt sehr leicht

$$\varphi(r,\omega)\cos\omega+\psi(r,\omega)\sin\omega$$
$$=\frac{r}{1}-\frac{r^2\cos\omega}{2}+\frac{r^3\cos 2\omega}{3}-\frac{r^4\cos 3\omega}{4}+\ldots.$$

$$\varphi(r,\omega)\cos\omega-\psi(r,\omega)\sin\omega$$
$$=\frac{r\cos 2\omega}{1}-\frac{r^2\cos 3\omega}{2}+\frac{r^3\cos 4\omega}{3}-\ldots.$$

Multiplizirt man die erste Gleichung mit $\frac{1}{r}$, die zweite mit $r$ und zieht jene von dieser ab, so wird

$$-\left(\frac{1}{r}-r\right)\varphi(r,\omega)\cos\omega-\left(\frac{1}{r}+r\right)\psi(r,\omega)\sin\omega$$
$$=-1+\tfrac{1}{2}r\cos\omega-\frac{r^2\cos 2\omega}{3}+\frac{r^3\cos 3\omega}{4}-\frac{r^4\cos 4\omega}{5}+\ldots.$$
$$+\frac{r^2\cos 2\omega}{1}-\frac{r^3\cos 3\omega}{2}+\frac{r^4\cos 4\omega}{3}-\ldots.$$

und hieraus ergiebt sich gleich

$$\tfrac{1}{2}-\tfrac{1}{4}r\cos\omega-\tfrac{1}{2}\left(\frac{1}{r}-r\right)\varphi(r,\omega)\cos\omega-\tfrac{1}{2}\left(\frac{1}{r}+r\right)\psi(r,\omega)\sin\omega$$
$$=\frac{r^2\cos 2\omega}{1.3}-\frac{r^3\cos 3\omega}{2.4}+\frac{r^4\cos 4\omega}{3.5}-\ldots.$$



Digitized by Google

Setzt man hier einmal $r = 1$ und dann $r = e^{-b}$, so erhält man die Summen der unter Nr. (10) in Parenthese stehenden Reihen, und wenn man sich endlich an die Bedeutungen von $q(r, \omega)$, $\psi(r, \omega)$ erinnert, so ergiebt sich:

$$\left.\begin{aligned} &\int_0^\infty \frac{e^{\omega u} + e^{-\omega u}}{e^{\pi u} - e^{-\pi u}} \frac{\sin bu}{1+u^2}\, du \\ &= -\tfrac{1}{2}(b\cos\omega + \omega\sin\omega)\, e^{-b} \\ &\quad + \tfrac{1}{4}(e^{b} - e^{-b})\cos\omega \,.\, l(1 + 2e^{-b}\cos\omega + e^{-2b}) \\ &\quad + \tfrac{1}{2}(e^{b} + e^{-b})\sin\omega \,.\, Arctan\frac{\sin\omega}{e^{b} + \cos\omega} \\ &\qquad \pi \geqq \omega \geqq -\pi . \end{aligned}\right\} \quad (11)$$

Durch Spezialisirungen von $\omega$ oder Differenziation nach $b$ lassen sich hieraus noch zahlreiche andere Formeln ableiten; da der Mechanismus dieses Verfahrens sehr leicht ist, so brauchen wir ihn nicht näher anzugeben.

Hat $\mu$ in der Gleichung (9) einen gebrochenen Werth, so schreibe man sie in der Form

$$\int_0^\infty \frac{e^{\omega u} + e^{-\omega u}}{e^{\pi u} - e^{-\pi u}} \frac{\sin bu}{\mu^2 + u^2}\, du$$

$$= -\frac{1}{\mu}\left(\frac{1}{2\mu} + \frac{\mu\cos\omega}{1^2 - \mu^2} - \frac{\mu\cos 2\omega}{2^2 - \mu^2} + \ldots.\right) e^{-\mu b}$$

$$+ \frac{1}{2\mu^2} + e^{-b}\frac{\cos\omega}{1^2 - \mu^2} - e^{-2b}\frac{\cos 2\omega}{2^2 - \mu^2} + \ldots.$$

und summire die erste der Reihen rechts nach Formel (2) in §. 6, es wird dann:

Digitized by Google

$$\int_0^\infty \frac{e^{\omega u} + e^{-\omega u}}{e^{\pi u} - e^{-\pi u}} \frac{\sin bu}{\mu^2 + u^2}\, du = -\frac{\pi}{2\mu} \frac{\cos \mu\omega}{\sin \mu\pi} e^{-\mu b}$$

$$+ \frac{1}{2\mu^2} + e^{-b} \frac{\cos \omega}{1^2 - \mu^2} - e^{-2b} \frac{\cos 2\omega}{2^2 - \mu^2} + e^{-3b} \frac{\cos 3\omega}{3^2 - \mu^2} - \ldots\ldots$$

Hier ist der Fall $\mu = \frac{1}{2}$ bemerkenswerth, für welchen

$$\int_0^\infty \frac{e^{\omega u} + e^{-\omega u}}{e^{\pi u} - e^{-\pi u}} \frac{\sin bu}{\frac{1}{4} + u^2}\, du = -\pi e^{-\frac{1}{2}b} \cos \tfrac{1}{2}\omega$$

$$+ 2 + 4 \left\{ \frac{e^{-b} \cos \omega}{1 \cdot 3} - \frac{e^{-2b} \cos 2\omega}{3 \cdot 5} + \frac{e^{-3b} \cos 3\omega}{5 \cdot 7} - \ldots\ldots \right\}$$

wird, was sich noch besser gestaltet, wenn man $\frac{1}{2}u$ für $u$, $2b$ und $2\omega$ für $b$ und $\omega$ setzt, wodurch die Gleichung folgende Gestalt annimmt:

$$\int_0^\infty \frac{e^{\omega u} + e^{-\omega u}}{e^{\frac{1}{2}\pi u} - e^{-\frac{1}{2}\pi u}} \frac{\sin bu}{1 + u^2}\, du = -\frac{\pi}{2} e^{-b} \cos \omega$$

$$+ 1 + 2 \left\{ \frac{e^{-2b} \cos 2\omega}{1 \cdot 3} - \frac{e^{-4b} \cos 4\omega}{3 \cdot 5} + \frac{e^{-6b} \cos 6\omega}{5 \cdot 7} - \ldots\ldots \right\}. \quad (12)$$

Um die Reihe

$$1 + 2 \left\{ \frac{r^2 \cos 2\omega}{1 \cdot 3} - \frac{r^4 \cos 4\omega}{3 \cdot 5} + \frac{r^6 \cos 6\omega}{5 \cdot 7} - \ldots\ldots \right\}$$

zu summiren, verfahren wir hier ganz ähnlich wie vorhin; behalten nämlich $q(r, \omega)$ und $\psi(r, \omega)$ die bereits angegebenen Bedeutungen, so ist wie früher

$$q(r, \omega) \cos \omega + \psi(r, \omega) \sin \omega$$

$$= \frac{r}{1} - \frac{r^2 \cos \omega}{2} + \frac{r^3 \cos 2\omega}{3} - \frac{r^4 \cos 3\omega}{4} + \ldots\ldots$$

Digitized by Google

Nimmt man hierin $r$ negativ, subtrahirt die so entstehende neue Gleichung von der vorstehenden, so folgt nach Division mit $2r$

$$\frac{1}{2r}\left[\varphi(r,\omega) - \varphi(-r,\omega)\right]\cos\omega + \frac{1}{2r}\left[\psi(r,\omega) - \psi(-r,\omega)\right]\sin\omega$$

$$= 1 + \frac{r^2\cos 2\omega}{3} + \frac{r^4\cos 4\omega}{5} + \frac{r^6\cos 6\omega}{7} + \ldots.$$

und wenn man $\frac{\pi}{2} - \omega$ für $\omega$ schreibt

$$\frac{1}{2r}\left[\varphi(r,\frac{\pi}{2}-\omega) - \varphi(-r,\frac{\pi}{2}-\omega)\right]\sin\omega$$

$$+ \frac{1}{2r}\left[\psi(r,\frac{\pi}{2}-\omega) - \psi(-r,\frac{\pi}{2}-\omega)\right]\cos\omega$$

$$= 1 - \frac{r^2\cos 2\omega}{3} + \frac{r^4\cos 4\omega}{5} - \frac{r^6\cos 6\omega}{7} + \ldots. \qquad (13)$$

Ferner ist wieder wie schon früher

$$\varphi(r,\omega)\cos\omega - \psi(r,\omega)\sin\omega$$

$$= \frac{r\cos 2\omega}{1} - \frac{r^2\cos 3\omega}{2} + \frac{r^3\cos 4\omega}{3} - \ldots..$$

Nimmt man hierin $r$ negativ, subtrahirt die entstehende neue Gleichung von der alten und multiplizirt darauf mit $\frac{r}{2}$, so wird

$$\frac{r}{2}\left[\varphi(r,\omega) - \varphi(-r,\omega)\right]\cos\omega - \frac{r}{2}\left[\psi(r,\omega) - \psi(\quad r,\omega)\right]\sin\omega$$

$$= \frac{r^2\cos 2\omega}{1} + \frac{r^4\cos 4\omega}{3} + \frac{r^6\cos 6\omega}{5} + \ldots.$$

oder wenn man $\frac{\pi}{2} - \omega$ an die Stelle von $\omega$ setzt,

Digitized by Google

$$\frac{r}{2}\left[\varphi\left(r, \frac{\pi}{2}-\omega\right) - \varphi\left(-r, \frac{\pi}{2}-\omega\right)\right] \sin\omega$$

$$-\frac{r}{2}\left[\psi\left(r, \frac{\pi}{2}-\omega\right) - \psi\left(-r, \frac{\pi}{2}-\omega\right)\right] \cos\omega$$

$$= -\frac{r^2 \cos 2\omega}{1} + \frac{r^4 \cos 4\omega}{3} - \frac{r^6 \cos 6\omega}{5} + \ldots. \qquad (14)$$

Subtrahirt man endlich Nr. (14) von Nr. (13), so erhält man

$$\tfrac{1}{2}\left(\frac{1}{r} - r\right)\left[\varphi\left(r, \frac{\pi}{2}-\omega\right) - \varphi\left(-r, \frac{\pi}{2}-\omega\right)\right] \sin\omega$$

$$+ \tfrac{1}{2}\left(\frac{1}{r} + r\right)\left[\psi\left(r, \frac{\pi}{2}-\omega\right) - \psi\left(-r, \frac{\pi}{2}-\omega\right)\right] \cos\omega$$

$$= 1 + 2\left\{\frac{r^2 \cos 2\omega}{1.3} - \frac{r^4 \cos 4\omega}{3.5} + \frac{r^6 \cos 6\omega}{5.7} - \ldots.\right\}$$

womit die fragliche Reihe summirt ist. Man kann dabei noch bemerken, dass, vermöge der bekannten Formeln

$$l\alpha - l\beta = l\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)$$

$$Arctan\,\alpha + Arctan\,\beta = Arctan\,\frac{\alpha+\beta}{1-\alpha\beta}$$

die eingeklammerten Funktionendifferenzen folgende Formen annehmen:

$$\varphi\left(r, \frac{\pi}{2}-\omega\right) - \varphi\left(-r, \frac{\pi}{2}-\omega\right) = \tfrac{1}{2} l\left(\frac{1+2r\sin\omega+r^2}{1-2r\sin\omega+r^2}\right)$$

$$\psi\left(r, \frac{\pi}{2}-\omega\right) - \psi\left(-r, \frac{\pi}{2}-\omega\right) = Arctan\,\frac{2\cos\omega}{\frac{1}{r}-r}.$$

Digitized by Google

Setzt man endlich $r = e^{-b}$, so giebt die Gleichung (12)

$$\left.\begin{aligned}
&\int_0^\infty \frac{e^{\omega u} + e^{-\omega u}}{e^{\frac{1}{2}\pi u} - e^{-\frac{1}{2}\pi u}} \cdot \frac{\sin bu}{1+u^2}\, du \\
&= -\frac{\pi}{2} e^{-b} \cos\omega \\
&\quad + \tfrac{1}{4}\left(e^{b} - e^{-b}\right) \sin\omega \,.\, l\left(\frac{e^{b} + 2\sin\omega + e^{-b}}{e^{b} - 2\sin\omega + e^{-b}}\right) \\
&\quad + \tfrac{1}{2}\left(e^{b} + e^{-b}\right) \cos\omega \,.\, Arctan \frac{2\cos\omega}{e^{b} - e^{-b}}.
\end{aligned}\right\} \quad (15)$$

$$\frac{\pi}{2} \geqq \omega \geqq -\pi$$

woraus sich wieder durch Spezialisirungen von $\omega$ oder Differenziation nach $b$ verschiedene andere Formeln ableiten liessen.

II. Ein ganz ähnliches Verfahren ist auf das unter Nr. (8) verzeichnete Integral anwendbar; indem man, wie schon früher, die gebrochene Funktion

$$\frac{e^{\omega u} - e^{-\omega u}}{e^{\pi u} - e^{-\pi u}}$$

in eine Reihe verwandelt, was für $\pi > \omega > -\pi$ erlaubt ist, reduzirt sich dasselbe auf

$$\frac{2}{\pi}\sin\omega \int_0^\infty \frac{\cos bu\, du}{(1^2+u^2)(\mu^2+u^2)} - \frac{2}{\pi} 2\sin 2\omega \int_0^\infty \frac{\cos bu\, du}{(2^2+u^2)(\mu^2+u^2)}$$

$$+ \frac{2}{\pi} 3\sin 3\omega \int_0^\infty \frac{\cos bu\, du}{(3^2+u^2)(\mu^2+u^2)} - \ldots\ldots$$

Digitized by Google

wobei man jedes einzelne Glied leicht integriren kann. Es ist nämlich

$$\int_0^\infty \frac{\cos bu\, du}{(n^2+u^2)(\mu^2+u^2)}$$

$$= \frac{1}{n^2-\mu^2} \int_0^\infty \left\{ \frac{1}{\mu^2+u^2} - \frac{1}{n^2+u^2} \right\} \cos bu\, du$$

$$= \frac{\pi}{2} \frac{1}{n^2-\mu^2} \left( \frac{1}{\mu} e^{-\mu b} - \frac{1}{n} e^{-nb} \right)$$

und mithin unter Berücksichtigung der vorhergehenden Schlüsse

$$\int_0^\infty \frac{e^{\omega u} - e^{-\omega u}}{e^{\pi u} - e^{-\pi u}} \frac{\cos bu}{\mu^2+u^2} du$$

$$= \frac{\sin \omega}{1^2-\mu^2} \left( \frac{1}{\mu} e^{-\mu b} - \frac{1}{1} e^{-b} \right) - \frac{2 \sin 2\omega}{2^2-\mu^2} \left( \frac{1}{\mu} e^{-\mu b} - \frac{1}{2} e^{-2b} \right) + \ldots.$$

und hier glückt es ebenfalls in den Fällen $\mu = 1$ und $\mu = \frac{1}{2}$ die Reihen rechts zu summiren. Zu den Resultaten, welche man auf diese Weise findet, kann man übrigens auch noch auf anderem Wege gelangen, indem man von den unter Nr. I entwickelten Formeln ausgeht. Sei nämlich

$$\int_0^\infty \frac{e^{\omega u} + e^{-\omega u}}{e^{\pi u} - e^{-\pi u}} \frac{\sin bu}{\mu^2+u^2} du = F(b, \omega)$$

so erhält man durch zwei Differenziationen, von denen die eine sich auf $b$ und die andere auf $\omega$ bezieht,

$$\int_0^\infty \frac{e^{\omega u} - e^{-\omega u}}{e^{\pi u} - e^{-\pi u}} \frac{u^2 \cos bu}{\mu^2+u^2} du = \frac{d^2 F(b, \omega)}{db\, d\omega}$$

Digitized by Google

oder wegen

$$\frac{u^2}{\mu^2+u^2} = 1 - \frac{\mu^2}{\mu^2+u^2}$$

durch Integration der einzelnen Theile

$$\int_0^\infty \frac{e^{\omega u} - e^{-\omega u}}{e^{\pi u} - e^{-\pi u}} \cos bu\, du - \mu^2 \int_0^\infty \frac{e^{\omega u} - e^{-\omega u}}{e^{\pi u} - e^{-\pi u}} \frac{\cos bu}{\mu^2+u^2}\, du$$

$$= \frac{d^2 F(b,\omega)}{db\, d\omega}.$$

Bestimmt man den Werth des ersten Integrales nach Formel (2), so wird jetzt nach Division mit $\mu^2$

$$\int_0^\infty \frac{e^{\omega u} - e^{-\omega u}}{e^{\pi u} - e^{-\pi u}} \frac{\cos bu}{\mu^2+u^2}\, du = \frac{1}{\mu^2} \frac{\sin\omega}{e^b + 2\cos\omega + e^{-b}} - \frac{1}{\mu^2} \cdot \frac{d^2 F(b,\omega)}{db\, d\omega}$$

wobei $\pi > \omega > -\pi$ sein muss. In den Fällen $\mu = 1$, $\mu = \frac{1}{2}$ lässt sich nun nach dem Früheren die Form von $F(b, \omega)$ angeben und also auch die Differenziation nach $b$ und $\omega$ ausführen. Man findet durch diese mehr langweilige als beschwerliche Rechnung für $\mu = 1$

$$\left.\begin{aligned} &\int_0^\infty \frac{e^{\omega u} - e^{-\omega u}}{e^{\pi u} - e^{-\pi u}} \frac{\cos bu}{1+u^2}\, du \\ &= \tfrac{1}{2}(b\sin\omega - \omega\cos\omega)\, e^{-b} \\ &\quad + \tfrac{1}{4}(e^b + e^{-b})\sin\omega \cdot l(1 + 2e^{-b}\cos\omega + e^{-2b}) \\ &\quad - \tfrac{1}{2}(e^b - e^{-b})\cos\omega \cdot Arctan \frac{\sin\omega}{e^b + \cos\omega} \\ &\qquad \pi > \omega > -\pi \end{aligned}\right\} \quad (16)$$

Digitized by Google

und für $\mu = \frac{1}{2}$

$$\left.\begin{aligned}
&\int_0^\infty \frac{e^{\omega u} - e^{-\omega u}}{e^{\frac{1}{2}\pi u} - e^{-\frac{1}{2}\pi u}} \frac{\cos bu}{1+u^2}\, du \\
&= \frac{\pi}{2} e^{-b} \sin\omega \\
&- \tfrac{1}{4}\left(e^{b} + e^{-b}\right)\cos\omega \,.\, l\left(\frac{e^{b} + 2\sin\omega + e^{-b}}{e^{b} - 2\sin\omega + e^{-b}}\right) \\
&+ \tfrac{1}{2}\left(e^{b} - e^{-b}\right)\sin\omega \,.\, Arctan\, \frac{2\cos\omega}{e^{b} - e^{-b}} \\
&\frac{\pi}{2} > \omega > -\frac{\pi}{2}.
\end{aligned}\right\} \quad (17)$$

Bemerkenswerth sind hier die Spezialisirungen $b = 0$, $\omega = \frac{\pi}{2}$ in (16) und $\omega = \frac{\pi}{4}$ in Nr. (17); man erhält durch sie

$$\int_0^\infty \frac{1}{e^{\frac{1}{2}\pi u} + e^{-\frac{1}{2}\pi u}} \frac{du}{1+u^2} = \tfrac{1}{4} l 2$$

$$\int_0^\infty \frac{1}{e^{\frac{1}{2}\pi u} + e^{-\frac{1}{2}\pi u}} \frac{du}{1+u^2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left\{\pi - l\left(\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}\right)\right\}.$$

## §. 20.

Kehren wir von dem reichen Detail analytischer Entwickelungen, welches die einfachsten Beispiele zu den Theoremen Fourier's darboten, wieder zu dem letzteren zurück, und fassen nur die allgemeine



Digitized by Google

Form desselben ins Auge, so finden wir das Eigenthümliche jener Sätze hauptsächlich darin, dass das Resultat zweier aufeinander folgenden und eine willkührliche Funktion enthaltenden Integrationen in einer sehr einfachen Weise mit eben jener beliebigen Funktion zusammenhängt, wodurch man in den Stand gesetzt wird, den Gesammteffekt jener Integrationen gleich im Voraus angeben zu können. Die analytischen Vortheile, welche sich an eine derartige Gleichung knüpfen, müssen uns nun, wenn wir die Sprache der Analysis recht verstehen, eine Aufforderung zur weiteren Untersuchung derartiger Beziehungen sein, und in der That ist auch das Theorem Fourier's nicht das einzige Beispiel, in welchem sich mehrfache Integrationen gegenseitig so weit, wenigstens theilweis, aufheben, dass man ihr Endresultat leicht a priori hinstellen kann. Von besonderem Interesse sind uns in dieser Rücksicht noch zwei Theoreme, von denen das eine gewissermassen ein Analogon zum Fourier'schen Satze bildet, und das andere sich durch seine algebraische Form auszeichnet. Auf das erste, mit welchem wir uns zunächst beschäftigen, kommt man durch den sehr naheliegenden Versuch, die Werthe der Integrale

$$\int_0^\infty \cos xu\, du \int_\alpha^\beta F(\vartheta) \sin u\vartheta\, d\vartheta \tag{1}$$

und

$$\int_0^\infty \sin xu\, du \int_\alpha^\beta F(\vartheta) \cos u\vartheta\, d\vartheta \tag{2}$$

welche den in §. 10 unter I und II betrachteten ganz analog gebildet sind, zu bestimmen. Es würde durchaus keine Schwierigkeiten machen, diesen Gedanken ganz in derselben Weise auszuführen, wie es in §. 10 mit den dortigen Formeln geschah; man brauchte zu diesem Zwecke die vorstehenden Integrale nur als die Gränzwerthe zu betrachten, welchen sich für unendlich wachsende $k$ die folgenden beiden:

Digitized by Google

$$\int_0^k \cos xu\, du \int_\alpha^\beta F(\vartheta) \sin u\vartheta\, d\vartheta$$

$$\int_0^k \sin xu\, du \int_\alpha^\beta F(\vartheta) \cos u\vartheta\, d\vartheta$$

nähern und in diesen die Ordnung der Integrationen umzukehren, worauf man zur Anwendung der Theoreme des §. 3 Gelegenheit finden würde; es giebt aber noch einen einfacheren Weg, der darin besteht, dass man die Funktionen $\sin u\vartheta$ und $\cos u\vartheta$ durch bestimmte Integrale ausdrückt, was mit Hülfe der Formeln (5) und (6) in §. 15 geschehen kann, wenn man statt $a$, $x$, $u$ darin $\vartheta$, $u$, $t$, also

$$\sin u\vartheta = \frac{2\vartheta}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cos ut}{\vartheta^2 - t^2}\, dt \tag{3}$$

$$\cos u\vartheta = -\frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{t \sin ut}{\vartheta^2 - t^2}\, dt \tag{4}$$

setzt, wo $\vartheta$ und $u$ constant in Bezug auf die Integration nach $t$ sind. Durch Substitution von (3) in (1) geht das fragliche Doppelintegral über in das dreifache

$$\int_0^\infty \cos xu\, du \int_\alpha^\beta F(\vartheta)\, d\vartheta \frac{2\vartheta}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cos ut}{\vartheta^2 - t^2}\, dt$$

welches sich durch Vertauschung der Integrationen nach $t$ und $\vartheta$ folgendermassen gestaltet:

$$\frac{2}{\pi} \int_0^\infty \cos xu\, du \int_0^\infty \cos ut\, dt \int_\alpha^\beta \frac{\vartheta F(\vartheta)}{\vartheta^2 - t^2}\, d\vartheta\,. \tag{5}$$

Setzen wir zur Abkürzung

$$\int_\alpha^\beta \frac{\vartheta F(\vartheta)}{\vartheta^2 - t^2}\, d\vartheta = f(t)$$

Digitized by Google

so ist nach dem Fourier'schen Theoreme das Integral in (5)

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \cos xu\, du \int_0^\infty \cos ut\, dt\, f(t) = f(x)$$

folglich wenn wir den Werth von $f(x)$ analog dem von $f(t)$ hinschreiben und das Endresultat mit der ursprünglichen Form (1) in eine Gleichung setzen

$$\int_\alpha^\beta \frac{\vartheta F(\vartheta)}{\vartheta^2 - x^2} d\vartheta = \int_0^\infty \cos xu\, du \int_\alpha^\beta F(\vartheta) \sin u\vartheta\, d\vartheta . \qquad (6)$$

Substituiren wir ebenso die Gleichung (4) in (2), so geht das letztere Doppelintegral über in

$$- \int_0^\infty \sin xu\, du \int_\alpha^\beta F(\vartheta)\, d\vartheta \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{t \sin ut}{\vartheta^2 - t^2} dt$$

$$= - \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \sin xu\, du \int_0^\infty \sin ut\, dt \int_\alpha^\beta \frac{t F(\vartheta)}{\vartheta^2 - t^2} d\vartheta$$

wo wir zur Abkürzung

$$\int_\alpha^\beta \frac{t F(\vartheta)}{\vartheta^2 - t^2} d\vartheta = f(t)$$

setzen wollen. Es ist dann

$$- \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \sin xu\, du \int_0^\infty \sin ut\, dt\, f(t) = - f(x)$$

$$= - \int_\alpha^\beta \frac{x F(\vartheta)}{\vartheta^2 - x^2} d\vartheta$$

Digitized by Google

und folglich mit Beziehung auf die ursprüngliche Form

$$-\int_{u}^{\beta}\frac{x\,F(\vartheta)}{\vartheta^2-x^2}\,d\vartheta = \int_{0}^{\infty} sin\,xu\,du \int_{\alpha}^{\beta} F(\vartheta)\,cos\,u\vartheta\,d\vartheta\,. \quad (6^*)$$

Schreibt man endlich in den Gleichungen (6) und (6*) $f$ und $t$ für $F$ und $\vartheta$, so wird

$$-\int_{\alpha}^{\beta}\frac{t\,f(t)}{x^2-t^2}\,dt = \int_{0}^{\infty} cos\,xu\,du \int_{\alpha}^{\beta} f(t)\,sin\,ut\,dt \quad (7)$$

$$\int_{\alpha}^{\beta}\frac{x\,f(t)}{x^2-t^2}\,dt = \int_{0}^{\infty} sin\,xu\,du \int_{\alpha}^{\beta} f(t)\,cos\,ut\,dt \quad (8)$$

und diess sind die beiden Formeln, welche einige Analogie zu den Fourier'schen Theoremen besitzen.

Zieht man die obere Gleichung von der unteren ab, so ergiebt sich noch

$$\int_{\alpha}^{\beta}\frac{f(t)}{x-t}\,dt = \int_{0}^{\infty} du \int_{\alpha}^{\beta} f(t)\,sin\,u(x-t)\,dt \quad (9)$$

und diese Formel kann in Verbindung mit dem Fourier'schen zur Verwerthung des doppelten Integrales

$$\int_{0}^{\infty} e^{xui}\,du \int_{\alpha}^{\beta} e^{-ut\,i} f(t)\,dt$$

worin $i=\sqrt{-1}$ ist, benutzt werden. Der vorstehende Ausdruck ist nämlich

$$= \int_{0}^{\infty} du \int_{\alpha}^{\beta} e^{u(x-t)\,i} f(t)\,dt$$

$$= \int_{0}^{\infty} du \int_{\alpha}^{\beta} cos\,u(x-t)\,f(t)\,dt$$

$$+\,i\int_{0}^{\infty} du \int_{\alpha}^{\beta} sin\,u(x-t)\,f(t)\,dt$$

Digitized by Google

und wenn man im ersten Integrale $\cos u(x-t)$ zerlegt und dabei den Fourier'schen Satz anwendet, so findet sich unter Berücksichtigung der Gleichung (9)

$$\left.\begin{aligned} &\int_0^\infty e^{xui}\,du \int_\alpha^\beta e^{-uti} f(t)\,dt \\ &= \pi f(x) + i\int_\alpha^\beta \frac{f(t)}{x-t}\,dt \end{aligned}\right\} \quad (10)$$

wobei aber $\beta > x > \alpha$ sein muss, weil sonst der reelle Bestandtheil sich annullirt, wie schon früher gezeigt wurde.

Eines der einfachsten Beispiele für die unter (7) und (8) ausgesprochenen Theoreme bildet die Annahme $f(x) = e^{-ax}$, es wird dann für $x = b$, $\alpha = 0$, $\beta = \infty$,

$$-\int_0^\infty \frac{t\,dt}{b^2-t^2} e^{-at} = \int_0^\infty \frac{u\cos bu}{a^2+u^2}\,du \quad (11)$$

$$\int_0^\infty \frac{b\,dt}{b^2-t^2} e^{-at} = \int_0^\infty \frac{a\sin bu}{a^2+u^2}\,du\,. \quad (12)$$

Die Integrale auf der linken Seite gehören unter die Zahl derjenigen, welche sich mit Hülfe des Integrallogarithmus verwerthen lassen; setzen wir nämlich in der Definition dieser Transscendenten:

$$\int_0^p \frac{dz}{lz} = li(p)$$

$p = e^{ab}$, $z = e^{a(b-t)}$, so wird $dz = -e^{a(b-t)}a\,dt$, $lz = a(b-t)$ und an die Stelle der Gränzen $z = p$, $z = 0$ treten in Bezug auf die neuen $t = 0$, $t = \infty$.

Hierdurch ergiebt sich:

Digitized by Google

$$- e^{ab} \int_{\infty}^{0} \frac{dt}{b-t} e^{-at} = li(e^{ab})$$

oder durch Vertauschung der Gränzen

$$\int_{0}^{\infty} \frac{dt}{b-t} e^{-at} = e^{-ab} li(e^{ab}). \qquad (13)$$

Substituirt man dagegen $p = e^{-ab}$ und $z = e^{-a(b+t)}$, so findet man ebenso leicht

$$e^{-ab} \int_{\infty}^{0} \frac{dt}{b+t} e^{-at} = li(e^{-ab})$$

oder

$$\int_{0}^{\infty} \frac{dt}{b+t} e^{-at} = - e^{ab} li(e^{-ab}). \qquad (14)$$

Die halbe Differenz und die halbe Summe der Gleichungen (13) und (14) geben:

$$\int_{0}^{\infty} \frac{b\,dt}{b^2-t^2} e^{-at} = \tfrac{1}{2}\left[e^{-ab} li(e^{ab}) - e^{ab} li(e^{-ab})\right] \qquad (15)$$

$$\int_{0}^{\infty} \frac{t\,dt}{b^2-t^2} e^{-at} = \tfrac{1}{2}\left[e^{-ab} li(e^{ab}) + e^{ab} li(e^{-ab})\right] \qquad (16)$$

und die Gleichungen (12) und (11) gehen jetzt in die folgenden über

$$\int_{0}^{\infty} \frac{a \sin bu}{a^2+u^2} du = \tfrac{1}{2}\left[e^{-ab} li(e^{ab}) - e^{ab} li(e^{-ab})\right] \qquad (17)$$

$$\int_{0}^{\infty} \frac{u \cos bu}{a^2+u^2} du = - \tfrac{1}{2}\left[e^{-ab} li(e^{ab}) + e^{ab} li(e^{-ab})\right] \qquad (18)$$

welche die Analoga zu den Formeln (1) und (2) des §. 14 bilden.

Digitized by Google

## §. 21.

Es giebt übrigens noch eine zweite Methode um die Gleichungen (17) und (18) aus den beiden vorhergehenden abzuleiten, und die, wenn auch auf einem sehr gewöhnlichen Kunstgriffe beruhend, doch dadurch bemerkenswerth ist, dass man sie zur Entdeckung ähnlicher Resultate benutzen kann.

Vertauscht man nämlich in der Gleichung (15) $a$ und $b$ gegeneinander, wodurch sich der Werth des Integrales nicht ändert, und bemerkt, dass

$$e^{-bt} = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{u \sin bu}{t^2+u^2}\,du$$

ist, so wird

$$\int_0^\infty \frac{a\,dt}{a^2-t^2}e^{-bt} = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{a\,dt}{a^2-t^2}\int_0^\infty \frac{u \sin bu}{t^2+u^2}\,du$$

und durch Umkehrung der Integrationsordnung

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^\infty au \sin bu\,du \int_0^\infty \frac{dt}{(a^2-t^2)(u^2+t^2)}.$$

Der Werth des nach $t$ genommenen Integrales ist aber

$$= \frac{\pi}{2u}\frac{1}{a^2+u^2}$$

mithin giebt das fragliche Integral in seiner ersten und letzten Form

$$\int_0^\infty \frac{a\,dt}{a^2-t^2}e^{-bt} = \int_0^\infty \frac{a \sin bu}{a^2+u^2}\,du \qquad (I)$$

was mit den Gleichungen (15) und (17) des vorigen Paragraphen

Digitized by Google

übereinstimmt. Beiderseitige Differenziation nach $b$ bringt noch die Gleichung

$$\int_0^\infty \frac{t\,dt}{a^2-t^2} = \int_0^\infty \frac{u\cos bu}{a^2+u^2}\,du \qquad (2)$$

zum Vorschein, die mit den Formeln (16) und (18) identisch ist. Weiter darf man aber mit der Differenziation nach $b$ nicht gehen, weil sonst die Integrale auf der rechten Seite unbestimmt werden.

Nimmt man dagegen in dem Integrale

$$\int_0^\infty \frac{a\,dt}{a^2-t^2}\,e^{-bt}$$

die Substitution

$$e^{-bt} = \frac{2t}{\pi}\int_0^\infty \frac{\cos bu}{t^2+u^2}\,du$$

vor, so verwandelt sich dasselbe der Reihe nach in

$$\frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{at\,dt}{a^2-t^2}\int_0^\infty \frac{\cos bu}{t^2+u^2}\,du$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^\infty a\cos bu\,du \int_0^\infty \frac{t\,dt}{(a^2-t^2)(u^2+t^2)}$$

wobei der Werth des nach $t$ genommenen Integrales

$$= l\left(\frac{a}{u}\right)\frac{1}{a^2+u^2}$$

ist; man erhält auf diese Weise

$$\int_0^\infty \frac{a\,dt}{a^2-t^2}\,e^{-bt} = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{a\cos bu}{a^2+u^2}\,l\left(\frac{a}{u}\right)du \qquad (3)$$



Digitized by Google

und durch Differenziation nach $b$

$$\int_0^\infty \frac{t\,dt}{a^2-t^2}\,e^{-bt} = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{u \sin bu}{a^2+u^2}\,l\left(\frac{a}{u}\right)du. \qquad (4)$$

Diese Formeln sind nicht weniger bemerkenswerth als die ihnen analogen in (1) und (2), weil man hier, wie dort, den Werth der jedesmaligen linken Seite mit Hülfe des Integrallogarithmus angeben kann.

Eine ganz ähnliche Reduktion lässt sich auf das Integral

$$\int_0^\infty \frac{a\,dt}{a^2+t^2}\,e^{-bt}$$

anwenden und führt zu ebenfalls interessanten Formeln. Vermöge der schon im Anfange dieses Paragraphen benutzten Substitution ist nämlich dasselbe

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{a\,dt}{a^2+t^2}\int_0^\infty \frac{u \sin bu}{t^2+u^2}\,du$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^\infty au \sin bu\,du \int_0^\infty \frac{dt}{(a^2+t^2)(u^2+t^2)}$$

wobei der Werth des nach $t$ genommenen Integrales

$$= \frac{\pi}{2}\frac{1}{u^2-a^2}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{u}\right) = \frac{\pi}{2au}\cdot\frac{1}{a+u}$$

ist; stellt man daher die erste und letzte Form des Integrales in eine Gleichung, so lautet dieselbe

$$\int_0^\infty \frac{a\,dt}{a^2+t^2}\,e^{-bt} = \int_0^\infty \frac{\sin bu}{a+u}\,du. \qquad (5)$$

Eine Differenziation nach $b$ darf hier nicht ausgeführt werden,

Digitized by Google

weil man dadurch auf das, keinen angebbaren Werth habende, Integral

$$\int_0^\infty \frac{u \cos bu}{a+u}\,du = \int_0^\infty \cos bu\,du - \int_0^\infty \frac{a \cos bu}{a+u}\,du$$

kommen würde.

Ferner ist vermöge der zweiten für $e^{-bt}$ getroffenen Substitution

$$\int_0^\infty \frac{a\,dt}{a^2+t^2} e^{-bt} = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{at\,dt}{a^2+t^2}\int_0^\infty \frac{\cos bu}{t^2+u^2}\,du$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^\infty a \cos bu\,du \int_0^\infty \frac{t\,dt}{(a^2+t^2)(u^2+t^2)}$$

oder

$$\int_0^\infty \frac{a\,dt}{a^2+t^2} e^{-bt} = -\frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{a \cos bu}{a^2-u^2} l\left(\frac{a}{u}\right) du \qquad (6)$$

und durch Differenziation nach $b$

$$\int_0^\infty \frac{t\,dt}{a^2+t^2} e^{-bt} = -\frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{u \sin bu}{a^2-u^2} l\left(\frac{a}{u}\right) du. \qquad (7)$$

Man übersieht nun auf der Stelle, dass die Werthe aller in den Gleichungen (5), (6) und (7) vorkommenden Integrale leicht anzugeben wären, wenn man den Werth von irgend einem derselben entwickeln könnte; diess auszuführen unterliegt aber durchaus keinen Schwierigkeiten, da das auf der rechten Seite von (5) vorkommende Integral so einfach ist, dass es sich leicht auf seine letzten Bestandtheile reduziren lässt. Diese letzten Bestandtheile sind zwei eigenthümliche Transscendenten, zu welchen man auf folgende Weise gelangt. Nach einer sehr bekannten Formel ist

$$li(e^w) = C + \tfrac{1}{2} l(w^2) + \tfrac{1}{1}\frac{w}{1} + \tfrac{1}{2}\frac{w^2}{1.2} + \ldots.$$

Digitized by Google

worin $C$ die von Mascheroni und Soldner zu 0.5772156 ... bestimmte Constante bedeutet. Führen wir jetzt eine neue Transscendente $Ei(w)$ der Art ein, dass

$$Ei(w) = C + \tfrac{1}{4} l(w^4) + \tfrac{1}{1}\frac{w}{1} + \tfrac{1}{2}\frac{w^2}{1.2} + \ldots . \qquad (8)$$

ist, so erhellt auf der Stelle, dass für alle reellen $w$ diese Transscendente mit $li(e^w)$ zusammenfällt, für imaginäre $w$ dagegen davon verschieden ist. Schreibt man z. B. $w\sqrt{-1}$ für $w$, so wird $\frac{1}{2} l(w^2)$ imaginär, während $\frac{1}{4} l(w^4)$ reell bleibt und

$$Ei(w\sqrt{-1}) = C + \tfrac{1}{4} l(w^4) - \tfrac{1}{2}\frac{w^2}{1.2} + \tfrac{1}{4}\frac{w^4}{1.2.3.4} - \ldots .$$

$$+ \sqrt{-1}\left[\tfrac{1}{1}\frac{w}{1} - \tfrac{1}{3}\frac{w^3}{1.2.3} + \tfrac{1}{5}\frac{w^5}{1.2..5} - \ldots .\right]$$

herauskommt. Setzen wir nun

$$Ci(w) = C + \tfrac{1}{4} l(w^4) - \tfrac{1}{2}\frac{w^2}{1.2} + \tfrac{1}{4}\frac{w^4}{1.2.3.4} - \ldots \qquad (9)$$

$$Si(w) = \tfrac{1}{1}\frac{w}{1} - \tfrac{1}{3}\frac{w^3}{1.2.3} + \tfrac{1}{5}\frac{w^5}{1.2..5} - \ldots \qquad (10)$$

so besteht zwischen unseren drei Transscendenten $Ei(w)$, $Ci(w)$ und $Si(w)$ die Relation

$$Ei(w\sqrt{-1}) = Ci(w) + \sqrt{-1}\, Si(w) \qquad (11)$$

welche der bekannten Gleichung

$$e^{w\sqrt{-1}} = \cos w + \sqrt{-1}\sin w$$

völlig analog ist und es rechtfertigen mag, wenn wir $Ei(w)$ die Integralexponentielle, $Ci(w)$ den Integralcosinus und $Si(w)$

Digitized by Google

den Integralsinus von $w$ nennen. Auf die letzten beiden Funktionen lässt sich nun das Integral

$$\int_0^\infty \frac{\sin \gamma x}{1+x}\, dx$$

welches von dem in Nr. (5) vorkommenden nur wenig differirt, mittelst folgender Schlüsse reduziren.

Man setze zunächst

$$x = \frac{z}{\gamma} - 1$$

so entsprechen den Werthen $x = 0$, $x = \infty$ die neuen Gränzen $z = \gamma$, $z = \infty$ und man erhält

$$\int_0^\infty \frac{\sin \gamma x}{1+x}\, dx = \int_\gamma^\infty \frac{\sin (z-\gamma)}{z} dz$$

$$= \cos\gamma \int_\gamma^\infty \frac{\sin z}{z} dz - \sin\gamma \int_\gamma^\infty \frac{\cos z}{z} dz, \quad (12)$$

Man hat nun weiter

$$\int_\gamma^\infty \frac{\sin z}{z} dz = \int_0^\infty \frac{\sin z}{z} dz - \int_0^\gamma \frac{\sin z}{z} dz$$

$$= \frac{\pi}{2} - \left(\frac{1}{1}\frac{\gamma}{1} - \frac{1}{3}\frac{\gamma^3}{1.2.3} + \frac{1}{5}\frac{\gamma^5}{1.2..5} - \ldots\right)$$

$$= \frac{\pi}{2} - Si(\gamma); \quad (13)$$

ferner:

$$\int_\gamma^\infty \frac{\cos z}{z} dz = \int_0^\infty \frac{\cos z}{z} dz - \int_0^\gamma \frac{\cos z}{z} dz$$

$$= \int_0^\infty \frac{\cos z}{z} dz - \int_0^\gamma \frac{dz}{z} + \int_0^\gamma \frac{1-\cos z}{z} dz$$

Digitized by Google

oder durch Zerlegung des Intervalles 0 bis $\gamma$ in 0 bis 1 und 1 bis $\gamma$ im zweiten Integrale

$$\int_\gamma^\infty \frac{\cos z}{z} dz = \int_0^\infty \frac{\cos z}{z} dz - \int_0^1 \frac{dz}{z}$$

$$- \int_1^\gamma \frac{dz}{z} + \int_0^\gamma \frac{1 - \cos z}{z} dz.$$

Die Differenz der ersten beiden Integrale ist nun offenbar eine blose Zahl, die wir $-K$ nennen wollen, der Werth des dritten Integrales ist $\frac{1}{2} l(\gamma^2)$ und der des vierten ergiebt sich durch Reihenverwandlung, so dass

$$\int_\gamma^\infty \frac{\cos z}{z} dz = -\left[K + \tfrac{1}{2} l(\gamma^2) - \tfrac{1}{2} \frac{\gamma^2}{1 \cdot 2} + \tfrac{1}{4} \frac{\gamma^4}{1 \cdot \cdot 4} - \ldots\right]. \quad (14)$$

Die bisher noch unbestimmt gebliebene Constante $K$ bestimmt sich sehr leicht dadurch, dass man in ihrer Definition

$$K = \int_0^1 dz \frac{1}{z} - \int_0^\infty \cos z \, dz \frac{1}{z}$$

statt $\frac{1}{z}$ das Integral $\int_0^\infty e^{-zt} dt$ substituirt; es wird dann

$$K = \int_0^1 dz \int_0^\infty e^{-zt} dt - \int_0^\infty \cos z \, dz \int_0^\infty e^{-zt} dt$$

und durch Umkehrung der Integrationsfolge

$$K = \int_0^\infty dt \int_0^1 e^{-tz} dz - \int_0^\infty dt \int_0^\infty e^{-tz} \cos z \, dz$$

$$= \int_0^\infty dt \frac{1 - e^{-t}}{t} - \int_0^\infty dt \frac{t}{1 + t^2}$$

Digitized by Google

wofür man auch schreiben kann

$$K = \int_0^\infty \left\{\frac{1}{1+t} - e^{-t}\right\}\frac{dt}{t}$$

$$+ \int_0^\infty \left\{\frac{1}{t} - \frac{1}{t(1+t)} - \frac{t}{1+t^2}\right\} dt$$

indem sich das erste Integral aus der ersten Parenthese gegen das zweite Integral der zweiten hebt. Der Werth der ersten Zeile ist aber der Theorie der Gammafunktionen zufolge $= C = 0.5772156\ldots$ die andere Zeile kann in der Form

$$\int_0^\infty \left\{\frac{1}{1+t} - \frac{t}{1+t^2}\right\} dt$$

dargestellt werden, woraus sich ihr Werth $= 0$ findet. Diess zusammen beweist, dass $K = C$, also vermöge der Gleichung (14) bei reellen $\gamma$

$$\int_\gamma^\infty \frac{\cos z}{z}\, dz = -\,Ci(\gamma) \qquad (15)$$

ist. Substituiren wir jetzt die unter (13) und (15) gefundenen Resultate in die Gleichung (12), so ergiebt sich

$$\int_0^\infty \frac{\sin \gamma x}{1+x}\, dx = \cos\gamma\left[\frac{\pi}{2} - Si(\gamma)\right] + \sin\gamma\, Ci(\gamma)$$

oder wenn man $\gamma = ab$, $x = \frac{u}{a}$ setzt

$$\left.\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{\sin bu}{a+u}\, du = {} & Ci(ab)\sin ab - Si(ab)\cos ab \\ & + \frac{\pi}{2}\cos ab\,.\end{aligned}\right\} \qquad (16)$$

Digitized by Google

Hieran knüpfen sich unmittelbar noch einige interessante Consequenzen. Berücksichtigt man nämlich, dass

$$\int_0^\infty \frac{a \sin bu}{a^2 - u^2}\, du = \int_0^\infty \frac{\sin bu}{a + u}\, du + \int_0^\infty \frac{u \sin bu}{a^2 - u^2}\, du$$

ist, wie man leicht durch Transposition des zweiten Integrales rechts findet und bestimmt die Werthe beider Integrale rechts, so wird

$$\int_0^\infty \frac{a \sin bu}{a^2 - u^2}\, du = Ci(ab) \sin ab - Si(ab) \cos ab . \qquad (17)$$

Eine Differenziation nach $b$ unter der Bemerkung ausgeführt, dass

$$\frac{d\, Ci(w)}{dw} = \frac{\cos w}{w}, \quad \frac{d\, Si(w)}{dw} = \frac{\sin w}{w}$$

ist, giebt jetzt noch

$$\int_0^\infty \frac{u \cos bu}{a^2 - u^2}\, du = Ci(ab) \cos ab + Si(ab) \sin ab . \qquad (18)$$

Vermöge der Gleichung (5) ist nun auch

$$\left.\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{a\, dt}{a^2 + t^2} e^{-bt} &= Ci(ab) \sin ab - Si(ab) \cos ab \\ &\quad + \frac{\pi}{2} \cos ab \end{aligned}\right\} \qquad (19)$$

und durch Differenziation nach $b$

$$\left.\begin{aligned} -\int_0^\infty \frac{t\, dt}{a^2 + t^2} e^{-bt} &= Ci(ab) \cos ab + Si(ab) \sin ab \\ &\quad - \frac{\pi}{2} \sin ab \end{aligned}\right\} \qquad (20)$$

womit zugleich die Werthe der in (6) und (7) vorkommenden Integrale gefunden sind.

Digitized by Google

Gruppiren wir jetzt zur leichteren Uebersicht diejenigen Formeln, welche aus den Schematen

$$\int_0^\infty \frac{a\,\varphi(u)}{a^2+u^2}\,du \quad \text{und} \quad \int_0^\infty \frac{a\,\varphi(u)}{a^2-u^2}\,du$$

entspringen, wenn man für $\varphi(u)$ der Reihe nach, $\cos bu$, $\sin bu$, $e^{-bu}$ setzt, so erhalten wir die folgenden sechs:

$$\int_0^\infty \frac{a\cos bu}{a^2+u^2}\,du = \frac{\pi}{2}\,e^{-ab}$$

$$\int_0^\infty \frac{a\sin bu}{a^2+u^2}\,du = \tfrac{1}{2}\left[Ei(ab)\,e^{-ab} - Ei(-ab)\,e^{ab}\right]$$

$$\int_0^\infty \frac{a\,du}{a^2+u^2}\,e^{-bu} = Ci(ab)\sin ab - Si(ab)\cos ab + \frac{\pi}{2}\cos ab$$

$$\int_0^\infty \frac{a\cos bu}{a^2-u^2}\,du = \frac{\pi}{2}\sin ab$$

$$\int_0^\infty \frac{a\sin bu}{a^2-u^2}\,du = Ci(ab)\sin ab - Si(ab)\cos ab$$

$$\int_0^\infty \frac{a\,du}{a^2-u^2}\,e^{-bu} = \tfrac{1}{2}\left[Ei(ab)\,e^{-ab} - Ei(-ab)\,e^{ab}\right].$$

Durch Differenziation nach $b$ ergeben sich hieraus noch die folgenden:



Digitized by Google

$$\int_0^\infty \frac{u \sin bu}{a^2+u^2}\,du = \frac{\pi}{2}\,e^{-ab}$$

$$\int_0^\infty \frac{u \cos bu}{a^2+u^2}\,du = -\tfrac{1}{2}\left[Ei(ab)\,e^{-ab} + Ei(-ab)\,e^{ab}\right]$$

$$\int_0^\infty \frac{u\,du}{a^2+u^2}\,e^{-bu} = -\left[Ci(ab)\cos ab + Si(ab)\sin ab\right] + \frac{\pi}{2}\sin ab$$

$$\int_0^\infty \frac{u \sin bu}{a^2-u^2}\,du = -\frac{\pi}{2}\cos ab$$

$$\int_0^\infty \frac{u \cos bu}{a^2-u^2}\,du = Ci(ab)\cos ab + Si(ab)\sin ab$$

$$\int_0^\infty \frac{u\,du}{a^2-u^2}\,e^{-bu} = \tfrac{1}{2}\left[Ei(ab)\,e^{-ab} + Ei(-ab)\,e^{ab}\right].$$

Endlich kann man vermöge der Gleichungen (3) und (4) noch hinzustellen:

$$\int_0^\infty \frac{a \cos bu}{a^2+u^2}\,l\left(\frac{a}{u}\right)du = \frac{\pi}{4}\left[Ei(ab)\,e^{-ab} - Ei(-ab)\,e^{ab}\right]$$

$$\int_0^\infty \frac{u \sin bu}{a^2+u^2}\,l\left(\frac{a}{u}\right)du = \frac{\pi}{4}\left[Ei(ab)\,e^{-ab} + Ei(-ab)\,e^{ab}\right]$$

ebenso wegen (6) und (7):

Digitized by Google

$$\int_0^\infty \frac{a\cos bu}{a^2-u^2} l\left(\frac{a}{u}\right) du = -\frac{\pi}{2}\left[Ci(ab)\sin ab - Si(ab)\cos ab\right] - \frac{\pi^2}{4}\cos ab$$

$$\int_0^\infty \frac{u\sin bu}{a^2-u^2} l\left(\frac{a}{u}\right) du = \frac{\pi}{2}\left[Ci(ab)\cos ab + Si(ab)\sin ab\right] - \frac{\pi^2}{4}\sin ab.$$

## §. 22.

Wir kommen nun unserem Versprechen der Entwickelung eines neuen Doppelintegrales für eine beliebige Funktion nach. Man gelangt zu dem fraglichen Theoreme leicht durch folgende Bemerkungen. Multiplizirt man die Gleichung

$$\int_0^\infty \frac{\cos nt\, dt}{u^2-t^2} = \frac{\pi}{2u}\sin nu$$

mit dem Faktor

$$\frac{u^2\, du}{u^2-a^2}$$

und integrirt darauf nach $u$ zwischen den Gränzen $u=0$, $u=\infty$, so wird

$$\int_0^\infty \frac{u^2\, du}{u^2-a^2}\int_0^\infty \frac{\cos nt\, dt}{u^2-t^2} = \frac{\pi}{2}\int_0^\infty \frac{u\sin nu}{u^2-a^2} du = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \cos na \qquad (1)$$

und man kommt also durch gewisse doppelte Integration des Cosinus wieder auf einen Cosinus zurück. Dieses Theorem lässt sich leicht verallgemeinern, wenn man voraussetzt, dass eine Funktion $f(x)$ bekannt sei, die sich für alle $x$ von $x=0$ bis $x=\infty$ in eine Reihe von der Form

$$f(x) = A\cos x + B\cos 2x + C\cos 3x + \ldots. \qquad (2)$$

Digitized by Google

verwandeln lässt; es ist nämlich unter dieser Voraussetzung

$$\int_0^\infty \frac{u^2\,du}{u^2-a^2}\int_0^\infty \frac{A\cos t + B\cos 2t + C\cos 3t + \ldots}{u^2-t^2}\,dt$$

$$= \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \left\{A\cos a + B\cos 2a + C\cos 3a + \ldots\right\}$$

wie man leicht durch Integration der einzelnen Glieder nach Nr. (1) für $n = 1, 2, 3, \ldots$ findet, und diese Gleichung reduzirt sich vermöge der Bedeutung von $f(x)$ auf

$$\int_0^\infty \frac{u^2\,du}{u^2-a^2}\int_0^\infty \frac{f(t)\,dt}{u^2-t^2} = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 f(a). \qquad (3)$$

Die Voraussetzung, dass die Gleichung (2) für alle $x$ gelten solle, ist aber eine sehr beschränkende, denn wir wissen aus den Untersuchungen des Cap. I, dass Gleichungen von jener Form gewöhnlich nur für das Intervall $x = 0$ bis $x = \pi$ Bestand haben, und es bleibt daher noch die Frage zu erledigen, ob das bemerkenswerthe Resultat, was sich in der Formel (3) ausspricht, nicht vielleicht allgemeinere Geltung hat und von dem Bestehen der Gleichung (2), die uns hier nur zum weiteren Fortkommen diente, ganz unabhängig ist. Diess entscheidet sich sehr leicht auf folgende Weise.

Jede Funktion $f(x)$ lässt sich, so lange sie endlich und stetig bleibt, unter der Form

$$f(x) = \int_0^\infty \cos x\,\omega\,d\omega\,\varphi(\omega) \qquad (4)$$

darstellen, denn zufolge des Fourier'schen Theoremes genügt es

$$\varphi(\omega) = \frac{2}{\pi}\int_\alpha^\beta f(\tau)\cos\omega\tau\,d\tau$$

zu nehmen, um sogleich die Richtigkeit jener Behauptung gerechtfertigt zu sehen. Substituiren wir demnach:

Digitized by Google

$$f(t) = \int_0^\infty \cos t\omega \, d\omega \, \varphi(\omega)$$

in das Doppelintegral

$$S = \int_0^\infty \frac{u^2 \, du}{u^2 - a^2} \int_0^\infty \frac{f(t) \, dt}{u^2 - t^2} \tag{5}$$

so geht dasselbe in das dreifache

$$S = \int_0^\infty \frac{u^2 \, du}{u^2 - a^2} \int_0^\infty \frac{dt}{u^2 - t^2} \int_0^\infty \varphi(\omega) \cos t\omega \, d\omega$$

über. Hier versparen wir die Integration nach $\omega$ bis zuletzt, ohne die Aufeinanderfolge der Integrationen in Bezug auf $t$ und $u$ zu stören, und schreiben also

$$S = \int_0^\infty \varphi(\omega) \, d\omega \int_0^\infty \frac{u^2 \, du}{u^2 - a^2} \int_0^\infty \frac{\cos \omega t \, dt}{u^2 - t^2}.$$

Aus Nr. (1) ergiebt sich nun für $n = \omega$, dass der Werth des nach $t$ und $u$ genommenen Doppelintegrales $= \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \cos a\omega$ ist, und demnach wird

$$S = \int_0^\infty \varphi(\omega) \, d\omega \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \cos a\omega$$

d. i. nach Nr. (4) für $x = a$,

$$S = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 f(a).$$

Vergleichen wir die erste und letzte Form von $S$ und schreiben $x$ für $a$, wobei die willkührliche Grösse $x$ als Constante für die beiden nach $u$ und $t$ zu verrichtenden Integrationen figurirt, so ist jetzt ganz allgemein:

Digitized by Google

$$\int_0^\infty \frac{u^2\,du}{u^2-x^2}\int_0^\infty \frac{f(t)\,dt}{u^2-t^2} = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 f(x) \qquad (6)$$

und $f(t)$ hier nur der einen Bedingung der Stetigkeit und Endlichkeit von $t=0$ bis $t=\infty$ unterworfen.

Es verdient noch besonders hervorgehoben zu werden, dass man in dem doppelten Integrale nach $t$ und $u$ die Reihenfolge der Integrationen nicht schlechthin umkehren darf, weil die Funktion von $t$ und $u$, auf welche sich beide Integrationen beziehen, nämlich

$$\frac{u^2 f(t)}{(u^2-x^2)(u^2-t^2)}$$

innerhalb der Integrationsintervalle $t=0$, $t=\infty$ und $u=0$, $u=\infty$ eine Unterbrechung der Continuität erleidet, und zwar für $t=u=x$, wobei sie zugleich unendlich wird. Die Umkehrung ist nur erlaubt, wenn man zu Dem, was dabei herauskommt, nämlich

$$\int_0^\infty f(t)\,dt\int_0^\infty \frac{u^2\,du}{(u^2-x^2)(u^2-t^2)} = 0$$

noch denjenigen singulären Werth des Integrales hinzufügt, welcher der Stelle $t=u=x$ entspricht, und dieser Werth ist eben $\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 f(x)$.

Nimmt man beispielsweis

$$f(t) = \frac{1}{1+t}$$

in dem Theoreme (6), so wird

$$\int_0^\infty \frac{f(t)\,dt}{u^2-t^2} = \frac{1}{1-u^2}\,l\left(\frac{1}{u}\right)$$

folglich:

Digitized by Google

$$\int_0^\infty \frac{l\left(\frac{1}{u}\right) du}{(u^2-x^2)(1-u^2)} = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \frac{1}{1+x}$$

wie man auch auf anderem Wege finden kann.

Die Formel (6) ist noch dadurch einer Erweiterung fähig, dass man beiderseits in Bezug auf $x^2$ als unabhängige Variable differenziren kann. Setzen wir nämlich für den Augenblick $x^2 = z$, so ergiebt sich durch $n$ malige Differenziation der Gleichung

$$\int_0^\infty \frac{u^2\,du}{u^2-z} \int_0^\infty \frac{f(t)\,dt}{u^2-t^2} = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 f(\sqrt{z})$$

leicht die folgende

$$1.2\ldots n \int_0^\infty \frac{u^2\,du}{(u^2-z)^{n+1}} \int_0^\infty \frac{f(t)\,dt}{u^2-t^2}$$

$$= \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \frac{1}{(2\sqrt{z})^n}\left[f^{(n)}(\sqrt{z}) - \frac{n(n-1)}{2}\frac{f^{(n-1)}(\sqrt{z})}{\sqrt{z}}\right.$$

$$\left. + \frac{(n+1)\,n(n-1)(n-2)}{2.4}\frac{f^{(n-2)}(\sqrt{z})}{(\sqrt{z})^2} - \ldots\right]$$

und wenn man für $z$ wieder seinen Werth $x^2$ einführt,

$$\left.\begin{aligned} &\int_0^\infty \frac{u^2\,du}{(u^2-x^2)^{n+1}} \int_0^\infty \frac{f(t)\,dt}{u^2-t^2} \\ &= \frac{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2}{n!\,(2x)^n}\left[f^{(n)}(x) - \frac{n(n-1)}{2}\frac{f^{(n-1)}(x)}{x}\right. \\ &\left. + \frac{(n+1)\,n(n-1)(n-2)}{2.4}\frac{f^{(n-2)}(x)}{x^2} - \ldots\right] \end{aligned}\right\} (7)$$

Digitized by Google

worin $n'$ zur Abkürzung für $1.2..n$ dient. Eines der einfachsten Beispiele hierzu bildet die Annahme $f(x) = e^{-x}$, wobei man den Werth des nach $t$ genommenen Integrales leicht dadurch findet, dass man erst $t = u\tau$ setzt und dann die Formel

$$\int_0^\infty \frac{d\tau}{1-\tau^2} e^{-u\tau} = \tfrac{1}{2}\left[e^{-u} li(e^u) - e^u li(e^{-u})\right]$$

in Anwendung bringt.

## §. 23.

Der letzte endlich und vielleicht grossartigste Gebrauch, den man von den Fourier'schen Formeln in der Gestalt, wie wir sie in den Sätzen (9) und (13) des 10. Paragraphen ausgesprochen haben, machen kann, besteht darin, dass man mit ihrer Hülfe eine Reihe vielfacher Integrale von sehr allgemeiner Form auf einfache oder höchstens doppelte Integrale zu reduziren im Stande ist. Nach den in §. 10 entwickelten Lehren bildet nämlich das Integral

$$\frac{2}{\pi}\int_0^\infty \cos\sigma u\, du \int_\lambda^\varkappa f(t)\cos ut\, dt$$

eine unstetige Funktion der Grösse $\sigma$, da der Werth desselben $f(\sigma)$ oder Null ist, je nachdem $\sigma$ innerhalb oder ausserhalb des Intervalles $\lambda$ bis $\varkappa$ liegt, so dass also

$$\frac{2}{\pi f(\sigma)}\int_0^\infty \cos\sigma u\, du \int_\lambda^\varkappa f(t)\cos ut\, dt$$

$$= 1 \text{ ist für } \varkappa > \sigma > \lambda$$

und $$= 0, \quad \text{für } \sigma > \varkappa \text{ oder } \sigma < \lambda.$$

Es kann daher das vorstehende Integral als allgemeinen Diskonti-

Digitized by Google

nuitätsfaktor dienen, und wenn wir schon im ersten Theile die Vortheile kennen gelernt haben, welche der einfachste aller derartigen Faktoren

$$\int_0^\infty \frac{\sin u}{u} \cos \sigma u \, du$$

der sich für $f(\sigma)=1$, $\lambda=0$, $\varkappa=1$ aus dem Vorigen ergiebt, für die Reduktion vielfacher Integrale darbot, so dürfen wir hoffen, dass hier die Ausbeute noch viel reicher ausfallen werde. In der That scheint auch die Dirichlet'sche Integrationsmethode in Verbindung mit dem Fourier'schen Theoreme der mächtigste Hebel für die Bewältigung der Schwierigkeiten zu sein, welche der Reduktion vielfacher Integrale von allgemeinen Formen bisher entgegenstanden. Die Leichtigkeit und Eleganz, mit welcher dieses Verfahren zum Ziele führt, wird man aus den folgenden Beispielen ersehen.

Wir betrachten zunächst das vielfache Integral

$$S = \iiint .. x^{l-1} y^{m-1} .. e^{-(\alpha x+\beta y+..)} F(x+y+..)\, dx\, dy \ldots \quad (1)$$

in welchem $\alpha$, $\beta$, $\gamma$, ... positive Constanten bedeuten, von denen, im Falle sie imaginär sind, wenigstens der reelle Bestandtheil als positiv vorausgesetzt wird, und sich die Integrationen auf alle diejenigen lediglich positiven $x$, $y$, $z$, ... beziehen, welche der Bedingung

$$\varkappa \geqq x + y + z + \ldots \geqq \lambda$$

Genüge leisten. Bezeichnen wir zunächst $x+y+\ldots$ zur Abkürzung mit $s$, so können wir statt der in (1) vorkommenden Funktion $F(s)$ das Integral

$$\frac{2}{\pi} \int_0^\infty \cos su \, du \int_\lambda^\varkappa F(t) \cos ut \, dt$$

substituiren, wofür wir passender:



Digitized by Google

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ui}\,du \int_{\lambda}^{x} F(t)\cos ut\,dt$$

nehmen wollen, da eine Zerlegung des letzteren in zwei andere von $u=-\infty$ bis $u=0$ und $u=0$ bis $u=\infty$ leicht die Identität desselben mit dem vorhergehenden erkennen lässt. Es ist jetzt

$$S=\frac{1}{\pi}\iint..x^{l-1}y^{m-1}..e^{-(\alpha x+\beta y+..)}\,dx\,dy\,\ldots$$

$$\ldots\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ui}\,du\int_{\lambda}^{x} F(t)\cos ut\,dt$$

und hier können wir die Integrationen von $x=0$ bis $x=\infty$, $y=0$ bis $y=\infty$ u. s. f. ausdehnen, weil der für $F(s)$ substituirte Faktor sich annullirt, wenn nicht $x>s>\lambda$ ist, also ganz von selbst die Elemente des vielfachen Integrales aussondert, welche jener, den Integrationen auferlegten Bedingung nicht genügen. Kehren wir zugleich die Integrationsordnung so um, dass wir zuerst nach $x$, $y$, $z$, ... und erst am Ende nach $u$ und $t$ integriren, so wird

$$S=\frac{1}{\pi}\int_{\lambda}^{x} F(t)\,dt\int_{0}^{\infty}\cos tu\,du$$

$$\iint_{0}^{\infty}\int..x^{l-1}y^{m-1}..e^{-(\alpha x+\beta y+..)}e^{-ui}\,dx\,dy\,..$$

Setzt man für $s$ seinen Werth, so zerfällt die Integration nach $x$, $y$, $z$, .. in das blose Produkt der Integrale

$$\int_{0}^{\infty}x^{l-1}e^{-(\alpha+ui)x}\,dx,\quad\int_{0}^{\infty}y^{m-1}e^{-(\beta+ui)y}\,dy,\ \ldots$$

von denen jedes einzelne nach der Formel:

Digitized by Google

$$\int_0^\infty x^{\mu-1} e^{-(k+ui)x}\, dx = \frac{\Gamma(\mu)}{(k+ui)^\mu}$$

bestimmt werden kann. Es wird jetzt

$$S = \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,..}{\pi} \int_\lambda^\varkappa F(t)\,dt \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos tu\, du}{(\alpha+ui)^l (\beta+ui)^m\,..} \qquad (2)$$

und hiermit ist das vielfache Integral (1) auf ein doppeltes reduzirt.

Es knüpft sich hieran noch eine bemerkenswerthe Consequenz. Schreibt man nämlich in der so eben entwickelten Gleichung

$$\int\int .. x^{l-1} y^{m-1} .. e^{-(\alpha x+\beta y+..)} F(s)\,dx\,dy\,..$$

$$= \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,..}{\pi} \int_\lambda^\varkappa F(t)\,dt \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos tu\, du}{(\alpha+ui)^l (\beta+ui)^m\,..}$$

$\alpha\omega$, $\beta\omega$, .. für $\alpha$, $\beta$, .. und setzt $u = \omega v$, so wird

$$\int\int .. x^{l-1} y^{m-1} .. e^{-(\alpha x+\beta y+..)\omega} F(s)\,dx\,dy\,..$$

$$= \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,..}{\pi} \int_\lambda^\varkappa F(t)\,dt \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dv}{(\alpha+vi)^l (\beta+vi)^m\,..} \frac{\cos \omega lv}{\omega^{l+m+..-1}}.$$

Diese Gleichung multipliziren wir mit

$$\omega^{l+m+..-1} e^{-\vartheta\omega}\, d\omega$$

und integriren darauf nach $\omega$ zwischen den Gränzen $\omega = 0$ und

Digitized by Google

$\omega = \infty$; da auf der linken Seite $\omega$ nur in der Exponentialgrösse vorkommt, so erhalten wir dort ausser den Integrationen nach $x$, $y$, etc. noch das Integral

$$\int_0 \omega^{l+m+..-1} e^{-(\vartheta+ax+\beta y+..)\omega} d\omega$$

$$= \frac{\Gamma(l+m+...)}{(\vartheta+ax+\beta y+...)^{l+m+..}}.$$

Auf die rechte Seite dagegen kommt in Bezug auf $\omega$ noch das Integral

$$\int_0^\infty e^{-\vartheta\omega} \cos vt\omega \, d\omega = \frac{\vartheta}{\vartheta^2+(vt)^2}$$

zu stehen, so dass jetzt die Gleichung

$$\left.\begin{aligned} &\Gamma(l+m+..) \iiint .. \frac{x^{l-1} y^{m-1} .. F(s)\, dx\, dy\, ..}{(\vartheta+ax+\beta y+..)^{l+m+..}} \\ &= \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)..}{\pi} \int_\lambda^\chi F(t)\, dt \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dv}{(\alpha+vi)^l (\beta+vi)^m ..} \frac{\vartheta}{\vartheta^2+(vt)^2} \end{aligned}\right\} (3)$$

zum Vorschein kommt. Schreibt man das Doppelintegral rechts, abgesehen von seinem Coeffizienten, in der Form

$$\vartheta \int_\lambda^\chi F(t) \frac{dt}{t^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dv}{\left(\frac{\vartheta}{t}\right)^2+v^2} \cdot \frac{1}{(\alpha+vi)^l (\beta+vi)^m ..}$$

so erkennt man sogleich, dass sich hier die Integration in Bezug

Digitized by Google

auf $v$ ausführen lässt, wenn man die Formel (7) des §. 17 für $h=0$, $k=\frac{\vartheta}{t}$ in Anwendung bringt. Das Integral geht nämlich in

$$\int_{\lambda}^{x} F(t)\frac{dt}{t^{\varepsilon}}\cdot\frac{nt}{\left(\alpha+\frac{\vartheta}{t}\right)^{l}\left(\beta+\frac{\vartheta}{t}\right)^{m}\ldots}$$

über. Schafft man die Brüche im Nenner weg, so folgt jetzt aus Nr. (3) für $x>x+y+\ldots>\lambda$

$$\left.\begin{aligned}&\int\int\ldots\frac{x^{l-1}y^{m-1}\ldots F(x+y+\ldots)}{(\vartheta+ax+\beta y+\ldots)^{l+m+\ldots}}dx\,dy\ldots\\&=\frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\ldots}{\Gamma(l+m+\ldots)}\int_{\lambda}^{x}\frac{t^{l+m+\ldots-1}F(t)\,dt}{(\vartheta+\alpha t)^{l}(\vartheta+\beta t)^{m}\ldots.}\end{aligned}\right\}\quad(4)$$

Diese bemerkenswerthe Formel enthält unter Anderem das in §. 19 entwickelte Theorem von Liouville, in so fern es für $\lambda=0$, $x=1$ und $\vartheta=1$, $\alpha=\beta\ldots=0$, oder $\vartheta=\alpha=\beta\ldots=1$ und $F(t)=(1+t)^{l+m+\ldots}$ dasselbe zum Vorschein bringt.

Es lässt sich aus der obigen Gleichung noch eine zweite ableiten, in welcher eine ganz beliebige Potenz der Grösse $\vartheta+ax+\beta y+\ldots$ vorkommt. Setzen wir nämlich $\vartheta+\tau$ an die Stelle von $\vartheta$ und zur Abkürzung

$$\vartheta+ax+\beta y+\ldots=\sigma$$
$$l+m+n+\ldots=k$$

multipliziren darauf beiderseits mit $\tau^{k-\mu-1}d\tau$ und integriren nach $\tau$ zwischen den Gränzen $\tau=0$, $\tau=\infty$, so kommt auf die linke Seite,

Digitized by Google

ausser den Integrationen nach $x$, $y$, ..., noch die folgende zu stehen:

$$\int_0^\infty \frac{\tau^{k-\mu-1}\, d\tau}{(\sigma+\tau)^k}$$

die sich leicht ausführen lässt, wenn man $\tau = \sigma t$ setzt, wodurch dasselbe in

$$\frac{1}{\sigma^\mu}\int_0^\infty \frac{t^{k-\mu-1}\, dt}{(1+t)^k} = \frac{\Gamma(k-\mu)\,\Gamma(\mu)}{\Gamma(k)}$$

übergeht, vorausgesetzt, dass $\mu < k$ ist, weil ausserdem das Integral unendlich werden würde. Substituiren wir diess und nehmen auf der rechten Seite von (4) die angedeuteten Operationen ebenfalls vor, so wird vermöge der Bedeutung von $\sigma$

$$\left.\begin{aligned} &\iiint \ldots \frac{x^{l-1} y^{m-1} \ldots F(x+y+..)\, dx\, dy}{(\vartheta+\alpha x+\beta y+\ldots)^\mu} \\ &= \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\ldots}{\Gamma(\mu)\,\Gamma(k-\mu)} \int_0^\infty \tau^{k-\mu-1}\, d\tau \int_\lambda^\varkappa \frac{t^{k-1} F(t)\, dt}{(\vartheta+\tau+\alpha t)^l (\vartheta+\tau+\beta t)^m \ldots} \end{aligned}\right\} \quad (5)$$

womit jene vielfache, auf alle, der Bedingung $\varkappa > x+y+z+\ldots > \lambda$ genügenden, positiven $x$, $y$, $z$, ... sich beziehende Integration auf eine zweifache, zwischen constanten Gränzen vorzunehmende, reduzirt ist.

Man kann diese Theoreme noch dadurch etwas erweitern, dass man, wie schon im §. 19, an die Stelle von $x$, $y$, $z$, ... setzt: $\left(\frac{x}{a}\right)^p$, $\left(\frac{y}{b}\right)^q$, .. ferner $\frac{l}{p}$, $\frac{m}{q}$, .. für $l$, $m$, ... und $a^p\alpha$, $b^q\beta$, .. für $\alpha$, $\beta$, etc. So erhält man z. B. für $F(t) = Const. = 1$ aus (4):

Digitized by Google

$$\iiint \cdots \frac{x^{l-1} y^{m-1} \cdots dx\, dy \cdots}{(\vartheta + ax^p + \beta y^q + \cdots)^{\frac{l}{p}+\frac{m}{q}+\cdots}}$$

$$= \frac{\Gamma(\frac{l}{p})\,\Gamma(\frac{m}{q}) \cdots}{\Gamma(\frac{l}{p}+\frac{m}{q}+\cdots)} \frac{a^l b^m \cdots}{pq\cdots} \int_\lambda^\varkappa \frac{t^{\frac{l}{p}+\frac{m}{q}+\cdots-1}\, dt}{(\vartheta + a^p at)^{\frac{l}{p}} (\vartheta + b^q \beta t)^{\frac{m}{q}} \cdots}$$

wobei sich die Integrationen links auf alle diejenigen lediglich positiven $x, y, z, \ldots$ erstrecken, welche der Bedingung

$$\varkappa > \left(\frac{x}{a}\right)^p + \left(\frac{y}{b}\right)^q + \left(\frac{z}{c}\right)^r + \cdots > \lambda$$

Genüge leisten. Als spezieller Fall ist bemerkenswerth $l = m = n = 1$, $p = q = r = 2$, $\alpha = \beta = \gamma = 1$, wobei wir nur eine dreifache Integration voraussetzen; es wird nämlich

$$\iiint \frac{dx\, dy\, dz}{(\vartheta + x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{[\Gamma(\frac{1}{2})]^3}{\Gamma(\frac{3}{2})} \frac{abc}{8} \int_\lambda^\varkappa \frac{\sqrt{t}\; dt}{\sqrt{(\vartheta + a^2 t)(\vartheta + b^2 t)(\vartheta + c^2 t)}}.$$

Substituirt man die bekannten Werthe von $\Gamma(\frac{1}{2})$ und $\Gamma(\frac{3}{2})$, setzt ferner $t = u^2$ und schreibt $\lambda^2$, $\varkappa^2$ für $\lambda$, $\varkappa$, so wird

$$\left.\begin{aligned} &\iiint \frac{dx\, dy\, dz}{(\vartheta + x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{\pi}{2} abc \int_\lambda^\varkappa \frac{u^2\, du}{\sqrt{(\vartheta + a^2 u^2)(\vartheta + b^2 u^2)(\vartheta + c^2 u^2)}} \end{aligned}\right\} \quad (6)$$

Digitized by Google

wobei sich links die Integrationen auf alle die positiven $x$, $y$, $z$ beziehen, welche der Bedingung

$$\varkappa^2 \geqq \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 \geqq \lambda^2$$

genügen. Die Formel (6) dient übrigens unmittelbar zur Lösung einer physikalischen Aufgabe. Denkt man sich nämlich zwei concentrische und ähnliche Ellipsoide, von denen das eine die Achsen $a\lambda$, $b\lambda$, $c\lambda$ und das zweite grössere die Achsen $a\varkappa$, $b\varkappa$, $c\varkappa$ hat, so sind die Gleichungen ihrer Oberflächen:

$$\varkappa^2 = \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2$$

$$\lambda^2 = \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2.$$

Sind ferner $x$, $y$, $z$ die Coordinaten irgend eines Punktes innerhalb der von beiden Ellipsoiden begränzten Schicht, so ist $dx\,dy\,dz$ das entsprechende Volumenelement und, wenn $\Delta$ die Dichtigkeit im Punkte $xyz$ bezeichnet, $\Delta\,dx\,dy\,dz$ das Massenelement. Aendert sich die Dichtigkeit von Punkt zu Punkt, so muss $\Delta$ als Funktion von $x$, $y$, $z$ gegeben sein, und das Einfachste ist, $\Delta$ als Funktion der Entfernung $\varrho$ des Punktes $xyz$ vom Mittelpunkte der Ellipsoide anzusehen. Diese Entfernung wird bekanntlich durch $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ausgedrückt, so dass also

$$\Delta = f(\varrho) = f\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)$$

eine bekannte Funktion sein muss. Nehmen wir beispielsweis

$$\Delta = f(\varrho) = \frac{1}{(\vartheta+\varrho^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{(\vartheta+x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

so dass also im Mittelpunkte die Dichtigkeit $\frac{1}{\vartheta^{\frac{3}{2}}}$ stattfinden würde und sie von da an nach aussen zu abnimmt, so ist jetzt:

Digitized by Google

$$\frac{dx\,dy\,dz}{(\vartheta + x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

das Massenelement der ellipsoidischen Schicht. Die ganze Masse der letzteren erhalten wir jetzt durch dreifache Integration dieses Ausdrucks, wobei sich aber die Integrationen nur auf alle diejenigen positiven und negativen $x$, $y$, $z$ beziehen dürfen, welche die Ungleichung

$$\varkappa^2 \geqq \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 \geqq \lambda^2$$

erfüllen, denn nur die der genannten Bedingung genügenden Coordinaten geben Elemente im Innern der fraglichen Schicht. Dehnen wir dagegen die Integrationen nur auf alle positiven, die obige Ungleichung befriedigenden $x$, $y$, $z$ aus, so erhalten wir offenbar den zwischen den positiven Theilen der Coordinatenachsen liegenden Octanten des in Rede stehenden Körpers. Hier können wir nun die Formel (6) in Anwendung bringen und nehmen wir dann das Achtfache davon, so ist jetzt die Masse der ellipsoidischen Schicht:

$$4\pi abc \int_{\lambda}^{\varkappa} \frac{u^2\,du}{\sqrt{(\vartheta + a^2u^2)(\vartheta + b^2u^2)(\vartheta + c^2u^2)}}$$

und somit das Problem auf eine Quadratur zurückgeführt.

Bemerkenswerth ist der Fall $\vartheta = 0$, wo die Dichtigkeit nach der dritten Potenz von $\varrho$ nach Aussen zu abnimmt. Es wird dann sehr einfach die Masse

$$4\pi l\left(\frac{\varkappa}{\lambda}\right).$$

Für $\lambda = 0$, $\varkappa = 1$ giebt der obige Ausdruck die Masse eines mit den Achsen $a$, $b$, $c$ beschriebenen Ellipsoids, natürlich darf man in diesem Falle $\vartheta$ nicht $= 0$ setzen, weil sonst die Dichtigkeit im Mittelpunkte unendlich und folglich auch die Gesammtmasse unendlich werden würde.



Digitized by Google

## §. 24.

Nicht ohne Interesse ist vielleicht das folgende Beispiel wegen der mehrfacheren Rücksichten, die man hier zu nehmen hat. Es sei nämlich das vielfache Integral zu reduziren

$$S = \iiint .. F\left[\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{a}{x}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{\beta}{y}\right)^2 + ..\right] dx\, dy \ldots \quad (1)$$

worin die Integrationen sich auf alle die wesentlich positiven $x$, $y$, $z$, .. beziehen mögen, die der Bedingung

$$\varkappa > \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{a}{x}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{\beta}{y}\right)^2 + \ldots\ldots > \lambda$$

Genüge leisten. Setzen wir zur Abkürzung

$$s = \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{a}{x}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{\beta}{y}\right)^2 + \ldots\ldots \quad (2)$$

und statt $F(s)$ das bestimmte Doppelintegral

$$\frac{2}{\pi}\int_0^\infty \cos su\, du \int_\lambda^\varkappa F(t) \cos ut\, dt$$

welches für alle $s > \varkappa$ oder $< \lambda$ verschwindet, so tritt an die Stelle der Gleichung

$$S = \iiint .. F(s)\, dx\, dy\, dz \ldots\ldots, \quad \varkappa > s > \lambda$$

die folgende

$$S = \int\int\int .. dx\, dy\, dz .. \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \cos su\, du \int_\lambda^\varkappa F(t) \cos ut\, dt \quad (3)$$

wobei die Integrationen auf alle positiven $x$, $y$, $z$, ... ausgedehnt

Digitized by Google

worden sind. Statt dieses Integrales betrachten wir das nachstehende

$$S_1 = \frac{2}{\pi} \int\int_0^\infty \int .. \, dx\, dy\, dz \, .. \int_0^\infty e^{sui}\, du \int_\lambda^\varkappa F(t) \cos ut \, dt$$

von welchem $S$ den reellen Bestandtheil ausmacht. Durch Umkehrung der Integrationsfolge wird nun

$$S_1 = \frac{2}{\pi} \int_\lambda^\varkappa F(t)\, dt \int_0^\infty \cos tu \, du \int\int_0^\infty \int .. e^{sui}\, dx\, dy\, dz \, ... \quad (4)$$

und wenn man sich an den Werth von $s$ erinnert, so zerfällt das vielfache nach $x$, $y$, $z$, .. genommene Integral in ein bloses Produkt aus den Faktoren

$$\int_0^\infty e^{\left[\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{a}{x}\right)^2\right] ui} dx, \quad \int_0^\infty e^{\left[\left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{\beta}{y}\right)^2\right] ui} dy, \ \ldots$$

deren Werthe leicht auf folgende Weise zu finden sind. In dem allgemeinen Theoreme

$$\int_0^\infty f\left[h^2 x^2 + \frac{k^2}{x^2}\right] dx = \frac{1}{h} \int_0^\infty f(2hk + x^2)\, dx$$

welches in §. 16 mitgetheilt worden ist, setze man

$$h = \frac{1}{a}, \quad k = a, \quad f(v) = e^{vui}$$

so ergiebt sich

$$\int_0^\infty e^{\left[\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{a}{x}\right)^2\right] ui} dx = a \int_0^\infty e^{\left(\frac{2a}{a} + x^2\right) ui} dx$$

$$= a\, e^{\frac{2a}{a} ui} \, \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{u}} e^{\frac{\pi}{4} i}$$

Digitized by Google

indem man rechts eine schon im ersten Theile dieser Schrift vielfach benutzte Formel in Anwendung bringt. Ist nun $n$ die Anzahl der Variablen $x, y, z, \ldots$ so wird das Produkt aus $n$ Faktoren von obiger Form

$$= \frac{abc \ldots}{2^n} \left(\frac{\pi}{u}\right)^{\frac{n}{2}} e^{\left(\frac{n\pi}{4} + \varrho u\right) i}$$

wobei zur Abkürzung

$$\varrho = \frac{2\alpha}{a} + \frac{2\beta}{b} + \frac{2\gamma}{c} + \ldots \tag{5}$$

gesetzt worden ist. Nach Nr. (4) haben wir nun weiter

$$S_1 = \frac{abc \ldots}{2^n} \pi^{\frac{n}{2}} \frac{2}{\pi} \int_\lambda^\infty F(t)\, dt \int_0^\infty \cos tu\, du \, \frac{1}{u^{\frac{n}{2}}} e^{\left(\frac{n\pi}{4} + \varrho u\right) i}$$

und da $S$ hiervon die reelle Partie ausmacht

$$S = \frac{abc \ldots}{2^n} \pi^{\frac{n}{2}} \frac{2}{\pi} \int_\lambda^\infty F(t)\, dt \int_0^\infty \frac{\cos tu}{u^{\frac{n}{2}}} \cos\left(\frac{n\pi}{4} + \varrho u\right) du$$

oder kürzer

$$S = \frac{abc \ldots}{2^n} \pi^{\frac{n}{2}} \int_\lambda^\infty F(t)\, dt\, T \tag{6}$$

wobei die Bedeutung von $T$ durch die Gleichung

$$T = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cos tu}{u^{\frac{n}{2}}} \cos\left(\frac{n\pi}{4} + \varrho u\right) du$$

Digitized by Google

bestimmt wird. Es ist nun nichts leichter als den Werth von $T$ zu finden; man hat nämlich zuvörderst

$$T = \frac{\cos\frac{n\pi}{4}}{\pi}\int_0^\infty \frac{2\cos tu\cos\varrho u}{u^{\frac{n}{2}}}\,du \;-\; \frac{\sin\frac{n\pi}{4}}{\pi}\int_0^\infty \frac{2\cos tu\sin\varrho u}{u^{\frac{n}{2}}}\,du$$

und für $t > \varrho$ wird man hier

$$2\cos tu\cos\varrho u = \cos(t+\varrho)u + \cos(t-\varrho)u$$
$$2\cos tu\sin\varrho u = \sin(t+\varrho)u - \sin(t-\varrho)u$$

dagegen für $t < \varrho$

$$2\cos tu\cos\varrho u = \cos(\varrho+t)u + \cos(\varrho-t)u$$
$$2\cos tu\sin\varrho u = \sin(\varrho+t)u + \sin(\varrho-t)u$$

setzen und dann die einzelnen Glieder nach den für lediglich positive $r$ geltenden Formeln

$$\int_0^\infty \frac{\cos ru}{u^\mu}\,du = \frac{\pi\, r^{\mu-1}}{2\,\Gamma(\mu)\cos\frac{1}{2}\mu\pi}$$

$$\int_0^\infty \frac{\sin ru}{u^\mu}\,du = \frac{\pi\, r^{\mu-1}}{2\,\Gamma(\mu)\sin\frac{1}{2}\mu\pi}$$

integriren. Man erhält so, ohne die mindeste Schwierigkeit,

$$T = 0, \quad \text{für } t < \varrho$$
$$= \frac{(t-\varrho)^{\frac{n}{2}-1}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \quad \text{für } t > \varrho.$$

Wollen wir diess in die Gleichung (6) substituiren, so sind drei Fälle zu unterscheiden, ob nämlich $\varrho > x$ ist, oder $\varrho$ zwischen $x$

Digitized by Google

und $\lambda$ liegt, oder endlich $\varrho < \lambda$ ist. Im ersten Falle hat man wegen $t < \varkappa$ um so mehr $t < \varrho$, mithin $T = 0$, und

$$S = 0, \quad \text{für} \quad \varrho > \varkappa \tag{7}$$

im zweiten zerlege man das Intervall von $\varkappa$ bis herab zu $\lambda$ in zwei andere von $\varkappa$ bis $\varrho$ und $\varrho$ bis $\lambda$; dann ist im ersten Intervalle $t > \varrho$ und im zweiten $t < \varrho$, mithin verschwindet der letztere Bestandtheil des Integrales in (6) und es bleibt

$$S = \frac{abc\,..}{2^n} \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \int_{\varrho}^{\varkappa} F(t)\,(t-\varrho)^{\frac{n}{2}-1}\,dt, \quad \varkappa > \varrho > \lambda. \tag{8}$$

Ist endlich $\varrho < \lambda$, so ist wegen $t > \lambda$ um so mehr $t > \varrho$, folglich

$$S = \frac{abc\,..}{2^n} \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \int_{\lambda}^{\varkappa} F(t)\,(t-\varrho)^{\frac{n}{2}-1}\,dt, \quad \varrho > \lambda, \tag{9}$$

und so ist in jedem Falle das vielfache Integral (1) auf ein einfaches reduzirt.

Nehmen wir beispielsweis $n = 3$, $F(t) = 1$, $\varkappa = 1$, $\lambda = 0$, so wird für

$$1 > \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{a}{x}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{\beta}{y}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 + \left(\frac{\gamma}{z}\right)^2 > 0$$

$$\iiint dx\,dy\,dz = 0, \quad \text{für} \quad \varrho > 1$$

$$= \frac{\pi}{6} abc\,(1-\varrho)^{\frac{3}{2}}, \quad \text{für} \quad 1 > \varrho > 0\ ^*),$$

---

*) Der dritte Fall $\varrho < \lambda$, d. i. $\varrho < 0$, kann hier nicht eintreten, weil die Gleichung unserer Fläche für negative $a$, $b$, .. $\alpha$, $\beta$, .. die nämliche bleibt, wie für positive Werthe dieser Constanten, und man folglich $a$, $b$, $c$, .. $\alpha$, $\beta$, $\gamma$, .. nur als positiv und $\varrho$ daher nicht als negativ ansehen kann.

Digitized by Google

und diess ist ein Octant desjenigen Volumens, welches von der durch die Gleichung

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{a}{x}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{\beta}{y}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 + \left(\frac{\gamma}{z}\right)^2 = 1$$

charakterisirten Fläche umschlossen wird. Für $a=0$, $\beta=0$, $\gamma=0$ wird $\varrho=0$ und man kommt dann auf die Cubatur des Ellipsoids zurück.

## §. 25.

Ein paar andere Reduktionen vielfacher Integrale ergeben sich nach derselben Methode auf folgende Weise.

I. Sei zunächst

$$S = \iiint \ldots e^{-(\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 + \ldots)} F(x+y+\ldots)\, dx\, dy \ldots \qquad (1)$$

und die Bedingung gestellt, dass die Integrationen sich auf alle diejenigen positiven und negativen $x$, $y$, $z$, .. erstrecken, welche der Ungleichung

$$\varkappa > x + y + z + \ldots > \lambda$$

genügen. Bezeichnen wir wieder $x+y+\ldots$ mit $s$, so ist ganz ähnlich, wie früher

$$S = \iiint \ldots e^{-(\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 + \ldots)}\, dx\, dy \ldots$$

$$\ldots \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-su i}\, du \int_{\lambda}^{\varkappa} F(t) \cos ut\, dt$$

und da das letzte Doppelintegral immer verschwindet, wenn nicht $\varkappa > s > \lambda$ ist, so können wir jetzt die Integrationen nach $x$, $y$, $z$, ..

Digitized by Google

auf das Intervall $-\infty$ bis $+\infty$ ausdehnen. Kehren wir zugleich die Integrationsordnung um, so wird

$$S = \frac{1}{\pi}\int_{\lambda}^{\infty} F(t)\,dt \int_{-\infty}^{\infty} \cos tu\,du \ \ldots$$

$$\ldots \int\int_{-\infty}^{\infty}\int \ldots e^{-(\alpha^2x^2+\beta^2y^2+\ldots)}\, e^{-ui}\, dx\,dy \ \ldots \quad (2)$$

Vermöge des Werthes von $s$ zerfällt die vielfache Integration nach $x$, $y$, $z$, .. in das Produkt der Integrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha^2x^2}\, e^{-ux\,i}\, dx\,, \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta^2y^2}\, e^{-uy\,i}\, dy\,, \ \ldots$$

Es ist aber, wie man leicht übersieht,

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-k^2\tau^2}\, e^{-u\tau\,i}\, d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-k^2\tau^2} \cos u\tau\, d\tau = \frac{\sqrt{\pi}}{k}\, e^{-\left(\frac{u}{2k}\right)^2}$$

und folglich wird das Produkt jener nach $x$, $y$, $z$, .. genommenen Integrale

$$= \frac{\sqrt{\pi}}{\alpha}\, e^{-\left(\frac{u}{2\alpha}\right)^2} \frac{\sqrt{\pi}}{\beta}\, e^{-\left(\frac{u}{2\beta}\right)^2} \ \ldots.$$

d. i. wenn wir voraussetzen, dass die Anzahl der Variablen $x$, $y$, $z$, ... durch $n$ ausgedrückt wird

$$= \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\alpha\beta\gamma\,..}\, e^{-\frac{1}{4}\left(\frac{1}{\alpha^2}+\frac{1}{\beta^2}+\frac{1}{\gamma^2}+\ldots\right)u^2}$$

wo zur Abkürzung:

Digitized by Google

$$\varrho^2 = \frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} + \frac{1}{\gamma^2} + \ldots . \qquad (3)$$

sein möge. Die Gleichung (2) giebt dann:

$$S = \frac{\pi^{\frac{n}{2}-1}}{\alpha\beta\gamma\ldots} \int_\lambda^\varkappa F(t)\,dt \int_{-\infty}^{\infty} \cos tu\,du\, e^{-\frac{1}{4}\varrho^2 u^2} .$$

Hier lässt sich wieder die Integration nach $u$ ausführen und giebt

$$\frac{2\sqrt{\pi}}{\varrho} e^{-\left(\frac{t}{\varrho}\right)^2}$$

folglich, wenn wir die erste und letzte Form von $S$ vergleichen,

$$\left.\begin{aligned} &\iiint \ldots e^{-(\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 + \ldots)} F(x+y+\ldots)\,dx\,dy\ldots \\ &= \frac{2\,\pi^{\frac{n-1}{2}}}{\alpha\beta\gamma\ldots} \frac{1}{\varrho} \int_\lambda^\varkappa F(t)\, e^{-\left(\frac{t}{\varrho}\right)^2} dt \end{aligned}\right\} \qquad (4)$$

wobei die Integrationen links sich auf alle die positiven und negativen $x$ beziehen, für welche $\varkappa > x+y+\ldots > \lambda$ ist.

Man kann hieraus gleich noch ein zweites bemerkenswerthes Theorem ableiten, worin statt der Exponentialgrösse ein algebraischer Ausdruck vorkommt. Schreibt man nämlich $\alpha\sqrt{\omega}$, $\beta\sqrt{\omega}$, .. für $\alpha$, $\beta$, .., so tritt $\frac{\varrho}{\sqrt{\omega}}$ an die Stelle von $\varrho$ und es wird

$$\iiint \ldots e^{-(\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 + \ldots)\omega} F(x+y+\ldots)\,dx\,dy\ldots$$

$$= \frac{2\,\pi^{\frac{n-1}{2}}}{\alpha\beta\gamma\ldots} \frac{1}{\varrho} \frac{\sqrt{\omega}}{(\sqrt{\omega})^n} \int_\lambda^\varkappa F(t)\, e^{-\left(\frac{t}{\varrho}\right)^2 \omega} dt .$$



Digitized by Google

Diese Gleichung werde mit

$$\omega^{\mu-1} e^{-\omega}\, d\omega$$

multiplizirt und zwischen den Gränzen $\omega = 0$, $\omega = \infty$ integrirt. Auf der linken Seite erscheint dann ausser den Integrationen nach $x$, $y$, $z$, .. noch die folgende

$$\int_0^\infty \omega^{\mu-1} e^{-(1+\alpha^2 x^2+\beta^2 y^2+..)\omega}\, d\omega$$

$$= \frac{\Gamma(\mu)}{(1+\alpha^2 x^2+\beta^2 y^2+\ldots)^\mu}$$

und auf der rechten Seite tritt zu der Integration in Bezug auf $t$ noch diese hinzu

$$\int_0^\infty \omega^{\mu-\frac{n-1}{2}-1} e^{-\left(1+\frac{t^2}{\varrho^2}\right)\omega}\, d\omega$$

$$= \frac{\Gamma\left(\mu-\frac{n-1}{2}\right)}{\left(1+\frac{t^2}{\varrho^2}\right)^{\mu-\frac{n-1}{2}}}.$$

Man gelangt so zu der Gleichung

$$\Gamma(\mu) \iiint .. \frac{F(x+y+..)\, dx\, dy\, ..}{(1+\alpha^2 x^2+\beta^2 y^2+..)^\mu}$$

$$= \frac{2\pi^{\frac{n-1}{2}}}{\alpha\beta\gamma\, ..} \frac{\Gamma\left(\mu-\frac{n-1}{2}\right)}{\varrho} \int_\lambda^\infty \frac{F(t)\, dt}{\left(1+\frac{t^2}{\varrho^2}\right)^{\mu-\frac{n-1}{2}}}$$

Digitized by Google

die sich in die folgende elegante Gestalt bringen lässt:

$$\left.\begin{aligned} &\iiint \cdot\cdot \frac{F(x+y+..)\,dx\,dy\,..}{(1+\alpha^2x^2+\beta^2y^2+..)^{\mu}} \\ &= \frac{2\pi^{\frac{n-1}{2}}\varrho^{2\mu-n}}{\alpha\beta\gamma\,\ldots}\,\frac{\Gamma\left(\mu-\frac{n-1}{2}\right)}{\Gamma(\mu)}\int_{\lambda}^{\varkappa}\frac{F(t)\,dt}{(\varrho^2+t^2)^{\mu-\frac{n-1}{2}}} \end{aligned}\right\} \quad (5)$$

wobei $\varrho$ seine frühere, durch Nr. (3) festgestellte Bedeutung hat und hinsichtlich der positiven und negativen $x$, $y$, $z$, .. die Bedingung $\varkappa > x+y+..> \lambda$ stattfinden muss.

II. Sei für ein zweites Beispiel

$$S = \iiint \cdot\cdot \frac{F(x+y+..)\,dx\,dy\,..}{(\alpha^2+x^2)\,(\beta^2+y^2)\,\ldots.} \quad (6)$$

worin sich die Integrationen, wie unter I., auf alle die positiven oder negativen $x$, $y$, $z$, .. erstrecken sollen, welche der Ungleichung $\varkappa > x+y+..> \lambda$ Genüge leisten. Berücksichtigt man, dass für $x+y+..=s$ der reelle Bestandtheil von

$$\frac{2}{\pi}\int_0^{\infty} e^{\varepsilon u i}\,du \int_{\lambda}^{\varkappa} F(t)\cos ut\,dt$$

$= F(s)$ oder $= 0$ ist, je nachdem $s$ innerhalb oder ausserhalb des Intervalles $\lambda$ bis $\varkappa$ liegt, so kann man $S$ als die reelle Partie von

$$\iiint \cdot\cdot \frac{dx\,dy\,..}{(\alpha^2+x^2)\,(\beta^2+y^2)\,..}\,\frac{2}{\pi}\int_0^{\infty} e^{\varepsilon u i}\,du \int_{\lambda}^{\varkappa} F(t)\cos ut\,dt$$

ansehen und hier die Integrationen von $x=-\infty$ bis $x=+\infty$, $y=-\infty$ bis $y=+\infty$ etc. ausdehnen.

Digitized by Google

Bei gleichzeitiger Aenderung der Integrationsfolge geht das vorstehende Integral über in

$$\frac{2}{\pi}\int_{\lambda}^{\varkappa} F(t)\,dt \int_{0}^{\infty} \cos tu\,du \int\int_{-\infty}^{\infty}\int \cdot\cdot \frac{e^{xui}\,dx\,dy\,..}{(\alpha^2+x^2)(\beta^2+y^2)\,..}\cdot$$

Vermöge der Bedeutung von $s$ reduziren sich die Integrationen nach $x$, $y$, $z$, .. auf das Produkt der Integrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{uxi}\,dx}{\alpha^2+x^2}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{uyi}\,dy}{\beta^2+y^2}, \ldots$$

und dieses Produkt ist

$$\frac{\pi}{\alpha}e^{-\alpha u}\cdot\frac{\pi}{\beta}e^{-\beta u}\cdot\frac{\pi}{\gamma}e^{-\gamma u}\ldots$$

$$=\frac{\pi^n}{\alpha\beta\gamma\,..}e^{-(\alpha+\beta+\gamma+..)u}$$

wo $n$ die Anzahl der Variablen $x$, $y$, $z$ bezeichnet. Das vorige vielfache Integral wird jetzt

$$\frac{2\pi^{n-1}}{\alpha\beta\gamma\,..}\int_{\lambda}^{\varkappa} F(t)\,dt \int_{0}^{\infty} \cos tu\,du\,e^{-(\alpha+\beta+\gamma+..)u}$$

oder wenn zur Abkürzung

$$\alpha+\beta+\gamma+\ldots=\varrho \tag{7}$$

gesetzt wird

$$=\frac{2\pi^{n-1}}{\alpha\beta\gamma\,..}\int_{\lambda}^{\varkappa} F(t)\,dt\,\frac{\varrho}{\varrho^2+t^2}\cdot$$

Digitized by Google

Der reelle Theil hiervon würde $S$ sein, da aber das vorstehende Integral gar keine imaginäre Partie besitzt, so ist

$$\left.\begin{aligned}\int\int\int \ldots \frac{F(x+y+..)\,dx\,dy\,..}{(\alpha^2+x^2)(\beta^2+y^2)\ldots.} \\ = \frac{2\pi^{n-1}\varrho}{\alpha\beta\gamma\,..}\int_{\lambda}^{\varkappa}\frac{F(t)}{\varrho^2+t^2}\,dt\,.\end{aligned}\right\} \quad (8)$$

Für alle Formeln dieses Paragraphen ist übrigens zu bemerken, dass man sie nicht in dem Falle, wo nur eine Variable vorkommt, brauchen darf. Die Integrationen zwischen den Gränzen $-\infty$ und $+\infty$ setzen nämlich voraus, dass es auch möglich sei $x$, $y$, .. negativ zu nehmen, diess kann aber, wenn nur $x$ allein vorhanden ist bei positiven $\lambda$ und $\varkappa$, wegen der Bedingung $\varkappa > x > \lambda$ nicht geschehen. Natürlich vermindert diese Beschränkung den Werth unserer Formeln nicht, da man sie für $n=1$ ohnehin nicht benutzen wird.

## §. 26.

Die Integrale, welche wir bisher betrachtet haben, boten für die Anwendung des Fourier'schen Theoremes und der Dirichlet'schen Integrationsmethode den besonderen Vortheil dar, dass die Grösse, welche in der Bedingungsungleichung die mittelste Stelle einnimmt, zugleich die Variable der willkührlichen, im Integrale vorkommenden Funktion ausmacht; dieser Umstand erlaubte den Diskontinuitätsfaktor mit dem Doppelintegrale, in welches die beliebige Funktion verwandelt wird, zu verschmelzen. Findet dagegen jener günstige Fall nicht statt, so bedarf es ausser der Substitution für die Funktion noch eines besonderen Diskontinuitätsfaktors, so dass also zu den vorhandenen Integrationen noch drei neue hinzutreten. Wir wollen diess an dem folgenden Beispiele zeigen.

Es sei das zu reduzirende $n$ Variable enthaltende Integral:

Digitized by Google

$$S = \iiint .. F(x+y+z+..)\,dx\,dy\,dz\,.. \qquad (1)$$

mit der Bedingung gegeben, die Integrationen auf alle diejenigen positiven und negativen $x$, $y$, $z$, .. auszudehnen, welche der Bedingung

$$1 > \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 + \ldots\ldots > 0$$

Genüge leisten. Bezeichnen wir hier $x+y+z+\ldots$ mit $s$, $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 + ..$ mit $\sigma$, und erinnern uns, dass der reelle Bestandtheil von

$$\frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega}\, e^{\sigma\omega i}\, d\omega$$

$= 1$ oder $= 0$ ist, je nachdem $\sigma$ innerhalb oder ausserhalb des Intervalles 0 bis 1 liegt, so können wir $S$ als die reelle Partie von

$$S' = \iiint .. F(s)\,dx\,dy\,.. \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega}\, e^{\sigma\omega i}\, d\omega$$

ansehen und hier die Integrationen auf die Gränzen $-\infty + \infty$ ausdehnen. Nach Umkehrung der Integrationsfolge wird das vorstehende Integral

$$S' = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega}\, d\omega \int\int_{-\infty}^{\infty} .. F(s)\, e^{\sigma\omega i}\, dx\,dy\,\ldots$$

Da sich hier die Integrationen nach $x$, $y$, $z$, .. noch nicht ausführen lassen, so benutzen wir noch die Formel

$$F(s) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} du \int_{-\infty}^{\infty} e^{(s-t)ui}\, F(t)\, dt$$

Digitized by Google

wodurch jetzt $S'$ die Form

$$S' = \frac{1}{\pi^3}\int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega}\,d\omega \int\int\int_{-\infty}^{\infty} .. \,dx\,dy \ldots e^{\sigma\omega i}$$

$$\ldots \int_{-\infty}^{\infty} du \int_{-\infty}^{\infty} e^{(s-t)ui} F(t)\,dt$$

annimmt. Durch Umkehrung der Integrationsordnung wird hieraus

$$S' = \frac{1}{\pi^3}\int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega}\,d\omega \int_{-\infty}^{\infty} F(t)\,dt \ldots$$

$$\ldots \int_{-\infty}^{\infty} e^{-tui}\,du \int\int\int_{-\infty}^{\infty} .. \,e^{(\sigma\omega+su)i}\,dx\,dy \ldots$$

Setzt man für $\sigma$ und $s$ ihre Werthe, so zerlegt sich die vielfache Integration nach $x$, $y$, $z$, .. und das Produkt der $n$ Integrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{\left[\left(\frac{x}{a}\right)^2\omega + xu\right]i}\,dx, \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{\left[\left(\frac{y}{b}\right)^2\omega + yu\right]i}\,dy, \ldots$$

deren Werthe leicht anzugeben sind; dieselben heissen nämlich

$$\frac{\sqrt{\pi}\,a}{\sqrt{\omega}} e^{\frac{1}{4}\pi i - \frac{1}{4}\frac{a^2}{\omega}u^2}, \quad \frac{\sqrt{\pi}\,b}{\sqrt{\omega}} e^{\frac{1}{4}\pi i - \frac{1}{4}\frac{b^2}{\omega}u^2}, \ldots$$

und ihr Produkt ist

$$\frac{\pi^{\frac{n}{2}}\,a\,b\,c\,\ldots}{\omega^{\frac{n}{2}}} e^{\frac{1}{4}n\pi i - \frac{1}{4}\frac{r^2}{\omega}u^2}$$

wobei zur Abkürzung

$$r^2 = a^2 + b^2 + c^2 + \ldots \qquad (2)$$

Digitized by Google

gesetzt wurde. Durch Substitution jenes Werthes wird nun

$$S = \pi^{\frac{n-4}{4}} e^{\frac{1}{4}n\pi i} abc \ldots$$

$$\ldots \int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega^{\frac{n}{2}+1}} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} F(t)\,dt \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(\frac{1}{4}\frac{r^2}{\omega}u^2 + tu\right)i} du .$$

Die Ausführung der Integrationen nach $u$ verwandelt dieses dreifache Integral in das doppelte

$$S = 2\pi^{\frac{n-3}{2}} e^{\frac{n-1}{4}\pi i} \frac{abc\,..}{r} \int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega^{\frac{n+1}{2}}} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} F(t)\, e^{\frac{\omega t^2}{r^2} i}\, dt$$

oder

$$S = 2\pi^{\frac{n-3}{2}} e^{\frac{n-1}{4}\pi i} \frac{abc\,..}{r} \int_{-\infty}^{\infty} F(t)\,dt \int_0^\infty \frac{\sin\omega}{\omega^{\frac{n+1}{2}}} e^{\frac{t^2}{r^2}\omega i} d\omega .$$

Die reelle Partie hiervon ist

$$S = \pi^{\frac{n-3}{2}} \frac{abc\,..}{r} \ldots .$$

$$\ldots . \int_{-\infty}^{\infty} F(t)\,dt \int_0^\infty \frac{d\omega}{\omega^{\frac{n+1}{2}}} 2\sin\omega\cos\left(\frac{n-1}{4}\pi + \frac{t^2}{r^2}\omega\right) .$$

Der Werth des nach $\omega$ genommenen Integrales kann leicht dadurch entwickelt werden, dass man den Cosinus auflöst und das Integral in vier andere zerlegt, deren Werthe nach den Formeln:

Digitized by Google

$$\int_0^\infty \frac{\sin k\omega}{\omega^\mu}\, d\omega = \frac{\pi\, k^{\mu-1}}{2\,\Gamma(\mu)\sin\frac{1}{2}\mu\pi}$$

$$\int_0^\infty \frac{\cos k\omega}{\omega^\mu}\, d\omega = \frac{\pi\, k^{\mu-1}}{2\,\Gamma(\mu)\cos\frac{1}{2}\mu\pi}$$

bestimmbar sind. Da hier aber $k$ als lediglich positiv vorausgesetzt wird, so muss man die Fälle unterscheiden, in welchen $1-\frac{t^2}{r^2}$ positiv oder negativ ist, und im letzteren $-\left(\frac{t^2}{r^2}-1\right)$ dafür schreiben. Man findet auf diese Weise ohne Schwierigkeit, dass der Werth des in Rede stehenden Integrales

$$= \frac{\pi}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}\left(1-\frac{t^2}{r^2}\right)^{\frac{n-1}{2}}, \quad \text{oder} = 0$$

ist, je nachdem $1-\frac{t^2}{r^2}$ positiv oder negativ ausfällt, oder was auf das Nämliche hinauskommt, je nachdem $t$ innerhalb oder ausserhalb des Intervalles $-r$ bis $+r$ liegt.

Zerlegt man nun das nach $t$ genommene Integral in drei andere

von $-\infty$ bis $-r$, $-r$ bis $+r$, $+r$ bis $+\infty$

so ist im ersten und letzten Integrale $1-\frac{t^2}{r^2}$ negativ und folglich verschwinden beide Integrale; demnach bleibt blos das mittelste stehen, in welchem $1-\frac{t^2}{r^2}$ positiv ist, und es wird

$$S = \pi^{\frac{n-3}{2}}\,\frac{abc\,..}{r}\int_{-r}^{+r} F(t)\,dt\cdot\frac{\pi}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}\left(1-\frac{t^2}{r^2}\right)^{\frac{n-1}{2}}$$



Digitized by Google

wo man noch $t = r\tau$ setzen kann. Vermöge des ursprünglichen Werthes von $S$ ergiebt sich nun, dass für positive und negative, die Bedingung

$$1 > \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 + \ldots\ldots > 0$$

erfüllende $x, y, z, \ldots$ die Gleichung besteht:

$$\left.\begin{aligned} &\iiint \ldots F(x+y+z+\ldots)\,dx\,dy\,dz\,\ldots \\ &= \frac{\pi^{\frac{n-1}{2}}\,abc\,\ldots}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)} \int_{-1}^{+1} F(r\tau)\,(1-\tau^2)^{\frac{n-1}{2}}\,d\tau\,. \end{aligned}\right\} \quad (3)$$

Diese Formel löst unter Anderem die Aufgabe, die Masse eines dreiachsigen Ellipsoids zu bestimmen, in welchem die Dichtigkeit von Punkt zu Punkt veränderlich und zwar als Funktion der Coordinatensumme jener Punkte gegeben ist.

## §. 27.

Von besonderem Interesse ist noch die Thatsache, dass sich durch einen sehr einfachen Mechanismus aus jeder Reduktionsformel für ein vielfaches Integral eine unzählige Menge anderweiter Formeln derselben Art herleiten lassen, deren Allgemeinheit nicht geringer ist, als der bisher aufgestellten. Das Verfahren selbst wird aus der folgenden Betrachtung erhellen.

Wir setzen voraus, man kenne den Werth eines vielfachen Integrales bereits, und es sei etwa

$$U = \iiint \ldots \Phi(x, y, z, \ldots)\,dx\,dy\,dz\,\ldots \qquad (1)$$

Digitized by Google

Hierbei mögen die Integrationen sich auf alle diejenigen wesentlich positiven $x$, $y$, $z$, .. beziehen, welche der Bedingung

$$1 > \varphi(u, x, y, z, \ldots) > 0 \qquad (2)$$

genügen, in derselben soll $u$ eine willkührliche Constante bezeichnen, von der wir jedoch voraussetzen, dass sie nicht in $\Phi$ vorkomme. Vermöge des Dirichlet'schen Diskontinuitätsfaktors sind wir berechtigt, das Integral $U$ als den reellen Bestandtheil des folgenden anzusehen

$$\iiint \ldots \Phi(x, y, ..)\, dx\, dy \, \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin \omega}{\omega} e^{\varphi(u, x, y, ..)\omega i}\, d\omega$$

und in dem letzteren die Integrationen nach $x$, $y$, $z$, .. auf das Intervall 0 bis $\infty$ auszudehnen. In so fern $U$ von $u$ abhängt — denn die letztere Grösse hilft in (1) die Integrationsgränzen bestimmen — so können wir auch beiderseits nach $u$ differenziren und integriren, und es wäre z. B.

$$\int_\varepsilon^\eta u \frac{dU}{du} du \quad \text{oder} \quad \int_\varepsilon^\eta u\, d_u\, U$$

offenbar gleich dem reellen Bestandtheile von

$$\int_\varepsilon^\eta u\, d_u \left\{ \int \int_0^\infty \int \ldots \Phi(x, y, ..)\, dx\, dy \ldots \right.$$

$$\left. \ldots \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin \omega}{\omega} e^{\varphi(u, x, y, ..)\omega i}\, d\omega \right\}.$$

Da sich aber die angedeutete Differenziation und Integration nur auf $u$ bezieht und diese Grösse erst in dem nach $\omega$ genommenen Integrale vorkommt, so ist der obige Ausdruck auch:

Digitized by Google

$$= \int\int_0^\infty \int \ldots \Phi(x, y, \ldots)\, dx\, dy \ldots$$

$$\ldots \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin \omega}{\omega}\, d\omega \int_\varepsilon^\eta u\, d\, e^{\varphi(u, x, y, \ldots)\, \omega i}$$

wobei wir das Doppelintegral nach $u$ und $\omega$ mit $R$ bezeichnen wollen. Führen wir statt $u$ eine neue Variable $v$ der Art ein, dass

$$\varphi(u, x, y, \ldots) = v \tag{3}$$

so ist offenbar umgekehrt auch $u$ eine Funktion von $v$, etwa

$$u = \psi(v, x, y, \ldots) \tag{4}$$

wenn ferner $u$ die Werthe $\varepsilon$ und $\eta$ angenommen hat, ist $v = \varphi(\varepsilon, x, y, \ldots)$ und $v = \varphi(\eta, x, y, \ldots)$ geworden. Das Doppelintegral $R$ geht jetzt in das folgende über:

$$\frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin \omega}{\omega}\, d\omega \int_{\varphi(\varepsilon, x, y, \ldots)}^{\varphi(\eta, x, y, \ldots)} \psi(v, x, y, \ldots)\, d\, e^{v\omega i}$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \sin \omega\, d\omega \int_{\varphi(\varepsilon, x, y, \ldots)}^{\varphi(\eta, x, y, \ldots)} \psi(v, x, y, \ldots)\, i\, e^{\omega v i}\, dv .$$

Hiervon ist die reelle Partie, die wir allein brauchen

$$-\frac{2}{\pi} \int_0^\infty \sin \omega\, d\omega \int_{\varphi(\varepsilon, x, y, \ldots)}^{\varphi(\eta, x, y, \ldots)} \psi(v, x, y, \ldots) \sin \omega v\, dv$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \sin \omega\, d\omega \int_{\varphi(\eta, x, y, \ldots)}^{\varphi(\varepsilon, x, y, \ldots)} \psi(v, x, y, \ldots) \sin \omega v\, dv .$$

Digitized by Google

Zufolge des Fourier'schen Theoremes ist der Werth dieses Doppelintegrales

$$= \psi(1, x, y, ..), \text{ wenn } \varphi(\varepsilon, x, y, ..) > 1 > \varphi(\eta, x, y, ..)$$
$$= 0 \quad , \text{ wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist.}$$

Substituiren wir diess, so folgt jetzt

$$\int_{\varepsilon}^{\eta} u\, d_u U = \int\int_{0}^{\infty}\int .. \Phi(x, y, ..) R\, dx\, dy \ ...$$

wo für $R$ entweder $\psi(1, x, y, ..)$ oder Null zu setzen ist, je nachdem die obengenannte Bedingung erfüllt oder nicht erfüllt ist. Denken wir uns das Integral nach $x$, $y$, $z$, .. in seine Elemente zerlegt, so scheidet der Faktor $R$ alle diejenigen Elemente aus, für welche nicht $\varphi(\varepsilon, x, y, ..) > 1 > \varphi(\eta, x, y, ..)$ ist, und wir können demnach die Gleichung

$$\int_{\varepsilon}^{\eta} u\, d_u U = \iiint .. \Phi(x, y, ..)\, \psi(1, x, y, ..)\, dx\, dy .. \quad (5)$$

mit der Bedingung aufstellen, dass sich die Integrationen rechts nur auf die $x$, $y$, $z$, .. beziehen sollen, welche der Ungleichung

$$\varphi(\varepsilon, x, y, ..) > 1 > \varphi(\eta, x, y, ..) \quad (6)$$

Genüge leisten.

Mit welcher Leichtigkeit dieses Theorem zu neuen und sehr allgemeinen Reduktionsformeln führt, wird das folgende Beispiel zeigen. Wenn sich die Integrationen nach $x$, $y$, $z$, .. auf alle positiven, der Bedingung

$$1 > \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} + \ldots > 0$$

genügenden Werthe jener Variablen beziehen, so ist

$$\iiint .. x^{l-1} y^{m-1} .. dx\, dy .. = \frac{\Gamma(l).\Gamma(m) \ldots}{\Gamma(1+l+m+..)} a^{l} b^{m} \ldots$$

Digitized by Google

Setzen wir

$$a = \frac{f(u)-1}{f(u)-\alpha}, \quad b = \frac{f(u)-1}{f(u)-\beta}, \ldots.$$

so wird

$$\iiint \ldots x^{l-1} y^{m-1} z^{n-1} \ldots dx\,dy\,dz \ldots$$

$$= \frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,\ldots}{\Gamma(1+l+m+\ldots)} \left(\frac{f(u)-1}{f(u)-\alpha}\right)^{l} \left(\frac{f(u)-1}{f(u)-\beta}\right)^{m} \ldots.$$

und wenn wir diess mit der früheren Bezeichnung zusammenhalten wollen, so müssen wir die rechte Seite dieser Gleichung $U$ nennen und

$$\varphi(u, x, y, \ldots) = \frac{f(u)-\alpha}{f(u)-1}x + \frac{f(u)-\beta}{f(u)-1}y + \ldots = v$$

setzen. Daraus ergiebt sich zunächst

$$f(u) = \frac{v-\alpha x-\beta y-\ldots}{v-x-y-\ldots.}$$

und auch $u$ selbst, wenn wir $F$ die Umkehrung von $f$ nennen, so dass aus einer Gleichung, wie $f(p)=q$, $p=F(q)$ folgt; es wird nämlich

$$u = F\left(\frac{v-\alpha x-\beta y-\ldots}{v-x-y-\ldots}\right)$$

und diess ist zugleich das frühere $\Psi(v, x, y, \ldots)$. Vermöge dieses Werthes und der Bedeutung von $U$ und $\Phi(x, y, \ldots) = x^{l-1} y^{m-1} \ldots$ ergiebt sich jetzt nach Nr. (5):

Digitized by Google

$$\left.\begin{aligned}&\frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,..}{\Gamma(1+l+m+..)}\int_{\varepsilon}^{\eta} u\,d\Big[\Big(\frac{f(u)-1}{f(u)-\alpha}\Big)^{l}\Big(\frac{f(u)-1}{f(u)-\beta}\Big)^{m}\ldots.\Big]\\ &=\iiint..x^{l-1}y^{m-1}..\,F\Big(\frac{1-\alpha x-\beta y-\ldots}{1-x-y-\ldots}\Big)\,dx\,dy\,\ldots\end{aligned}\right\}\quad(7)$$

wobei sich die Integrationen auf alle diejenigen positiven $x, y, z, ..$ erstrecken, welche der Bedingung

$$\left.\begin{aligned}&\frac{f(\varepsilon)-\alpha}{f(\varepsilon)-1}x+\frac{f(\varepsilon)-\beta}{f(\varepsilon)-1}y+\ldots\ldots>1\\ 1>&\frac{f(\eta)-\alpha}{f(\eta)-1}x+\frac{f(\eta)-\beta}{f(\eta)-1}y+\ldots\ldots\end{aligned}\right\}\quad(8)$$

Genüge leisten. Das Integral auf der linken Seite ist noch einer einfachen Transformation fähig; führen wir nämlich statt $u$ eine neue Variable $t$ der Art ein, dass $f(u)=t$, folglich nach der Bedeutung von $F$ umgekehrt $u=F(t)$ ist, so nimmt $t$ die Werthe $f(\varepsilon)$ und $f(\eta)$ an, wenn $u=\varepsilon$ und $u=\eta$ geworden ist, und wir erhalten statt der linken Seite von (7)

$$K\int_{f(\varepsilon)}^{f(\eta)}F(t)\,d\Big[\Big(\frac{t-1}{t-\alpha}\Big)^{l}\Big(\frac{t-1}{t-\beta}\Big)^{m}\ldots.\Big]$$

wobei $K$ zur Abkürzung dient, nämlich

$$K=\frac{\Gamma(l)\,\Gamma(m)\,\Gamma(n)\,\ldots}{\Gamma(1+l+m+n+\ldots)}.\qquad(9)$$

Die noch auszuführende Differenziation nach $t$ hat durchaus keine Schwierigkeiten und wird sehr leicht, wenn man dazu die Formeln $dw=w\,dlw$ benutzt. Nimmt man noch $f(\varepsilon)=\lambda$, $f(\eta)=\varkappa$, wo $\lambda$

Digitized by Google

und $\varkappa$ ganz beliebig sind, weil $\varepsilon$ und $\eta$ es waren, so gelangen wir zu der Gleichung

$$\left.\begin{aligned}&\iiint \ldots x^{l-1} y^{m-1} \ldots F\left(\frac{1-ax-\beta y-\ldots}{1-x-y-\ldots}\right) dx\, dy \ldots \\ &= K \int_{\lambda}^{\varkappa} \frac{(t-1)^{l+m+\ldots-1}}{(t-\alpha)^{l}\,(t-\beta)^{m}\ldots} \left[\frac{1-\alpha}{t-\alpha} l + \frac{1-\beta}{t-\beta} m + \ldots\right] F(t)\, dt\end{aligned}\right\} \quad (10)$$

in welcher sich die Integrationen links auf alle diejenigen wesentlich positiven $x, y, z, \ldots$ beziehen, welche der Ungleichung

$$\frac{\lambda-\alpha}{\lambda-1} x + \frac{\lambda-\beta}{\lambda-1} y + \ldots > 1 > \frac{\varkappa-\alpha}{\varkappa-1} x + \frac{\varkappa-\beta}{\varkappa-1} y + \ldots$$

Genüge leisten. Hier ist ein besonderer Fall noch bemerkenswerth; setzen wir nämlich $\lambda = 1$, $\varkappa = \infty$, und nehmen an, dass $\lambda = 1 < \alpha$, ebenso $1 > \beta$ etc. sei, so geht unsere Bedingung in

$$\infty > 1 > x + y + z + \ldots$$

über, deren erster Theil von selbst erfüllt ist. Rechnen wir hierzu, dass wegen der positiven $x, y, \ldots$ immer $x + y + \ldots > 0$ sein muss, so haben wir jetzt das Theorem

$$\left.\begin{aligned}&\iiint \ldots x^{l-1} y^{m-1} \ldots F\left(\frac{1-ax-\beta y-\ldots}{1-x-y-\ldots}\right) dx\, dy \ldots \\ &= K \int_{1}^{\infty} \frac{(t-1)^{l+m+\ldots-1}}{(t-\alpha)^{l}\,(t-\beta)^{m}\ldots} \left[\frac{1-\alpha}{t-\alpha} l + \frac{1-\beta}{t-\beta} m + \ldots\right] F(t)\, dt\end{aligned}\right\} \quad (11)$$

wobei $\alpha < 1$, $\beta < 1$, $\ldots$ und hinsichtlich der auf blos positive Werthe von $x, y, \ldots$ sich erstreckenden Integration die Bedingung

$$1 > x + y + z + \ldots > 0 \quad (12)$$

erfüllt sein muss. Etwas allgemeiner wird dieses Theorem dadurch,

Digitized by Google

dass man $x^p$, $y^q$, ... an die Stelle von $x$, $y$, ... ferner $\frac{l}{p}$, $\frac{m}{q}$, .. für $l$, $m$, .. und zur Abkürzung

$$M = \frac{1}{pq..} \frac{\Gamma\left(\frac{l}{p}\right)\Gamma\left(\frac{m}{q}\right)..}{\Gamma\left(1+\frac{l}{p}+\frac{m}{q}+..\right)} \tag{12}$$

$$k = \frac{l}{p} + \frac{m}{q} + \frac{n}{r} + \ldots - 1 \tag{13}$$

setzt. Es wird dann

$$\left.\begin{aligned} &\int\int\int .. x^{l-1} y^{m-1} .. F\left(\frac{1-\alpha x^p - \beta y^q - ..}{1-x^p-y^q-\ldots}\right) dx\, dy\, .. \\ &= M \int_1^\infty \frac{(t-1)^k F(t)\, dt}{(t-\alpha)^{\frac{l}{p}} (t-\beta)^{\frac{m}{q}} \ldots} \left[\frac{l}{p}\frac{1-\alpha}{t-\alpha} + \frac{m}{q}\frac{1-\beta}{t-\beta} + ..\right] \end{aligned}\right\} \tag{14}$$

wobei sich die Integrationen links auf alle positiven, der Ungleichung

$$1 > x^p + y^q + z^r + \ldots > 0 \tag{15}$$

Genüge leistenden $x$, $y$, $z$, .. beziehen. Zu bemerken ist noch, dass man in dieser Formel $F(t)$ nicht constant nehmen darf, weil $F(t)$ die Umkehrung einer anderen Funktion ($f$) war.

Eine interessante Anwendung der Formel (14) ist die Complanation des dreiachsigen Ellipsoids, wenn man für dieselbe von der bekannten Formel

$$S = \int\int dx\, dy \sqrt{1 + \left(\frac{dz}{dx}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dy}\right)^2}$$



Digitized by Google

ausgeht. Die Gleichung der Oberfläche des Ellipsoids ist nämlich

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1$$

und wenn man hier $\left(\frac{dz}{dx}\right)$ und $\left(\frac{dz}{dy}\right)$ entwickelt, so wird

$$S = \iint dx\,dy \sqrt{\frac{1 - \left(1 - \frac{c^2}{a^2}\right)\frac{x^2}{a^2} - \left(1 - \frac{c^2}{b^2}\right)\frac{y^2}{b^2}}{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}}$$

und hier müssen die Integrationen auf alle die positiven und negativen $x$ und $y$ bezogen werden, welche der Bedingung

$$1 \geqq \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 \geqq 0$$

erfüllen. Beschränken wir uns auf blos positive $x$ und $y$, so erhalten wir den Octanten der Oberfläche des Ellipsoids. Ausserdem können wir $ax$ und $by$ für $x$ und $y$ setzen und zur Abkürzung

$$1 - \frac{c^2}{a^2} \text{ und } 1 - \frac{c^2}{b^2} \text{ mit } \varepsilon^2 \text{ und } \eta^2$$

bezeichnen, wo $\varepsilon$ und $\eta$ die beiden Excentricitäten des Ellipsoids sind. Die ganze Oberfläche des in Rede stehenden Körpers wird jetzt durch

$$8 \iint dx\,dy \sqrt{\frac{1 - \varepsilon^2 x^2 - \eta^2 y^2}{1 - x^2 - y^2}}$$

ausgedrückt, wobei sich die Integrationen auf alle positiven, der Bedingung

$$1 \geqq x^2 + y^2 \geqq 0$$

unterworfenen $x$ und $y$ beziehen. Diese Integration lässt sich nach

Digitized by Google

der Formel (15) ausführen, wenn man $F(t) = \sqrt{t}$, $l = m = 1$, $p = q = 2$, $\alpha = \varepsilon^2$, $\beta = \eta^2$ setzt und nur zwei Variable zulässt. Der Werth von $M$ ist dann

$$\frac{1}{2.2} \cdot \frac{[\Gamma(\frac{1}{2})]^2}{\Gamma(2)} = \tfrac{1}{4}\pi$$

und der von $k = 0$, mithin die gesuchte Oberfläche,

$$8 \cdot \tfrac{1}{4}\pi \int_1^\infty \frac{\sqrt{t}\ dt}{\sqrt{(t-\varepsilon^2)(t-\eta^2)}} \left\{ \tfrac{1}{2} \frac{1-\varepsilon^2}{t-\varepsilon^2} + \tfrac{1}{2} \frac{1-\eta^2}{t-\eta^2} \right\}$$

oder wenn man $t^2$ für $t$ setzt

$$2\pi \int_1^\infty \frac{t^2\, dt}{\sqrt{(t^2-\varepsilon^2)(t^2-\eta^2)}} \left\{ \frac{1-\varepsilon^2}{t^2-\varepsilon^2} + \frac{1-\eta^2}{t^2-\eta^2} \right\}.$$

Hierbei muss noch $\varepsilon^2 < 1$ und $\eta^2 < 1$ sein (wie früher $\alpha$ und $\beta$), was aber der Allgemeinheit keinen Eintrag thut, da man nur für $c$ die kleinste der drei Achsen des Ellipsoids zu nehmen braucht, um sogleich jene Bedingung zu erfüllen.

Ueberblicken wir am Schlusse noch einmal die gewonnenen Resultate und beachten vorzüglich die Allgemeinheit der Formen, durch die sie sich besonders auszeichnen, so kann wohl kein Zweifel darüber sein, dass hier noch ein grosses Feld der Thätigkeit gewandter Analytiker offen liegt. Möge der geneigte Leser, welcher uns bis an diese Stelle zu folgen die Güte gehabt hat, sich zur Bearbeitung desselben aufgelegt fühlen!

Digitized by Google

# Anhang.

Um die numerische Berechnung derjenigen Integrale zu erleichtern, welche auf eine der transscendenten Funktionen $Ei(x)$, $Ci(x)$ und $Si(x)$ führen (§. 21), theilen wir eine von Herrn Professor Bretschneider in Gotha berechnete kleine Tafel dieser Transscendenten mit:

| $x$ | $Ei(x)$ |
|---|---|
| 1 | + 1,89511 78163 55936 75546 |
| 2 | + 4,95423 43560 01890 16337 |
| 3 | + 9,93383 25706 25416 55800 |
| 4 | + 19,63087 44700 56220 02264 |
| 5 | + 40,18527 53558 03177 45509 |
| 6 | + 85,98976 21424 39204 80358 |
| 7 | + 191,50474 33355 01395 95306 |
| 8 | + 440,37989 95348 38268 99742 |
| 9 | + 1037,87829 07170 89587 65757 |
| 10 | + 2492,22897 62418 77759 13844 |

| $x$ | $Ei(-x)$ |
|---|---|
| 1 | — 0,21938 39343 95520 27367 |
| 2 | — 0,04890 05107 08061 11956 |
| 3 | — 0,01304 83810 94197 03741 |
| 4 | — 0,00377 93524 09848 90647 |
| 5 | — 0,00144 82955 91257 32579 |
| 6 | — 0,00036 00824 52162 65865 |
| 7 | — 0,00011 54817 31610 33821 |
| 8 | — 0,00003 76656 22843 92490 |
| 9 | — 0,00001 24473 54178 00627 |
| 10 | — 0,00000 41569 68929 68532 |

Digitized by Google

| $x$ | $Ci(x)$ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | 0,33740 | 39229 | 00968 | 13466 |
| 2 | + | 0,42298 | 08287 | 74864 | 99569 |
| 3 | + | 0,11962 | 97860 | 08000 | 32762 |
| 4 | — | 0,14098 | 16978 | 86930 | 41163 |
| 5 | — | 0,19002 | 97496 | 56643 | 87861 |
| 6 | — | 0,06805 | 72438 | 93247 | 12620 |
| 7 | + | 0,07669 | 52784 | 82184 | 51838 |
| 8 | + | 0,12243 | 38825 | 32009 | 55729 |
| 9 | + | 0,05534 | 75313 | 33133 | 60708 |
| 10 | — | 0,04545 | 64330 | 04455 | 37263 |

| $x$ | $Si(x)$ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | 0,94608 | 30703 | 67183 | 01494 |
| 2 | + | 1,60541 | 29768 | 02694 | 84857 |
| 3 | + | 1,84865 | 25279 | 99468 | 25639 |
| 4 | + | 1,75820 | 31389 | 49053 | 05810 |
| 5 | + | 1,54993 | 12449 | 44674 | 13727 |
| 6 | + | 1,42468 | 75512 | 80506 | 53576 |
| 7 | + | 1,45459 | 66142 | 48093 | 59061 |
| 8 | + | 1,57418 | 68217 | 06942 | 05208 |
| 9 | + | 1,66504 | 00758 | 29602 | 49510 |
| 10 | + | 1,65834 | 75942 | 18874 | 04933 |

Digitized by Google

Druck der Philipp Reclam'schen Officin in Leipzig.

Digitized by Google

UNIVERSITY OF MICHIGAN

Digitized by Google

Date Due

Digitized by Google

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 06458 2508

Math.-Econ.
QA
351
.S35
Schlömilch, O.X.
Analytische
Studien. 1848

Digitized by Google